

Tableau 6-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2015[#], pour 41 départements[†]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7	4,1	10	2,1	13,3	8	7,5
	55-59 ans	8,8	6,6	11,5	9,7	8,7	5,8	12
	60-64 ans	8,2	8,2	8,2	9,1	,	8	9,4
	65-69 ans	9,1	9,8	8,1	11,1	10	9,6	7,8
	70-74 ans	8,4	9,6	6,3	11,9	,	9,2	7,2
	50-74 ans	8,5	8,6	8,4	8,7	7,1	8,6	8,7
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,1	38,6	27	34	34,6	47,8	21,6
	55-59 ans	33,3	35,2	31	39,3	19	34,2	33,7
	60-64 ans	33,6	34,8	31	25	30	37,4	31,2
	65-69 ans	30,7	30,6	30,9	27,1	29,6	31,1	31,1
	70-74 ans	31,5	34,4	26,4	21,6	29,2	36,2	26
	50-74 ans	32,1	33,7	29,5	28,6	28,8	34,9	29,6
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,9	61,4	73	66	65,4	52,2	78,4
	55-59 ans	66,7	64,8	69	60,7	81	65,8	66,3
	60-64 ans	66,4	65,2	69	75	70	62,6	68,8
	65-69 ans	69,3	69,4	69,1	72,9	70,4	68,9	68,9
	70-74 ans	68,5	65,6	73,6	78,4	70,8	63,8	74
	50-74 ans	67,9	66,3	70,5	71,4	71,2	65,1	70,4
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	55,1	53,5	56,5	61,3	52,9	33,3	58,6
	55-59 ans	44,8	44,6	45	23,5	35,3	49,3	47,6
	60-64 ans	46	48,7	41	44,4	28,6	50	43
	65-69 ans	51,7	51,9	51,3	57,1	47,4	51	51,9
	70-74 ans	39,2	39,9	38,2	41,4	23,5	39,6	40,4
	50-74 ans	46,5	47,2	45,4	47,8	38,1	47	46,8
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,2	11,6	10,9	3,2	17,6	33,3	6,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/2

02/02/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,8	20,7	18,8	29,4	17,6	18,7	19
	60-64 ans	22,1	20,6	25	22,2	21,4	20,1	25,6
	65-69 ans	21,1	20,6	22	17,1	21,1	21,2	22,1
	70-74 ans	25,2	23,2	28,2	27,6	23,5	22,5	28,9
	50-74 ans	21,5	20,8	22,7	19,1	20,2	21,2	23,2
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*								
	50-54 ans	24,7	27,9	21,7	25,8	29,4	33,3	17,2
	55-59 ans	23,8	27,2	20	29,4	11,8	26,7	22,2
	60-64 ans	21,8	20,1	25	20	35,7	20,1	23,3
	65-69 ans	18,6	17,7	20	14,3	26,3	18,3	19,1
	70-74 ans	24	24,2	23,7	20,7	35,3	24,9	21,9
	50-74 ans	21,9	21,7	22,1	21	27,4	21,9	21
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*								
	50-54 ans	9	7	10,9	9,7	,	,	17,2
	55-59 ans	11,6	7,6	16,3	17,6	35,3	5,3	11,1
	60-64 ans	10	10,6	9	13,3	14,3	9,7	8,1
	65-69 ans	8,7	9,9	6,7	11,4	5,3	9,6	6,9
	70-74 ans	11,6	12,6	9,9	10,3	17,6	13	8,8
	50-74 ans	10,1	10,3	9,9	12,1	14,3	9,9	9

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

‡ Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire