Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 398	12 270	14 128	7 967	8 663	4 303	5 465
	55-59 ans	26 760	11 585	15 175	2 081	2 341	9 504	12 834
	60-64 ans	30 273	13 010	17 263	1 996	2 055	11 014	15 208
	65-69 ans	33 119	14 471	18 648	1 682	1 661	12 789	16 987
	70-74 ans	24 321	10 978	13 343	924	1 015	10 054	12 328
	50-74 ans	140 871	62 314	78 557	14 650	15 735	47 664	62 822
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	1 696	791	905	545	604	246	301
	55-59 ans	1 684	755	929	167	162	588	767
	60-64 ans	1 891	782	1 109	138	157	644	952
	65-69 ans	2 033	837	1 196	120	142	717	1 054
	70-74 ans	1 928	843	1 085	99	108	744	977
	50-74 ans	9 232	4 008	5 224	1 069	1 173	2 939	4 051
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable	50.54	050	450	500	005	000	405	400
suite à un test NA	50-54 ans	956	450	506	285	308	165	198
	55-59 ans	1 024	465	559	82	73	383	486
	60-64 ans	1 143	487	656	73	62	414	594
	65-69 ans	1 254	523	731	57	62	466	669
	70-74 ans	1 109	488	621	49	44	439	577
AGA Nagalaga da agraga agrada agrada (agrada)	50-74 ans	5 486	2 413	3 073	546	549	1 867	2 524
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	740	341	399	260	296	81	103
	55-59 ans	660	290	370	85	89	205	281
	60-64 ans	748	295	453	65	95	230	358
	65-69 ans	779	314	465	63	80	251	385
	70-74 ans	819	355	464	50	64	305	400
AOC. Nambra da namana dámistá sa farra um trat	50-74 ans	3 746	1 595	2 151	523	624	1 072	1 527
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25 658	11 929	13 729	7 707	8 367	4 222	5 362
anaiysabiej	50-54 ans 55-59 ans	26 100	11 295	13 729	1 996	2 252	9 299	12 553
	60-64 ans	29 525	12 715	16 810	1 931	1 960	10 784	14 850

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015 Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	32 340	14 157	18 183	1 619	1 581	12 538	16 602	
	70-74 ans	23 502	10 623	12 879	874	951	9 749	11 928	
	50-74 ans	137 125	60 719	76 406	14 127	15 111	46 592	61 295	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	829	439	390	294	235	145	155	
	55-59 ans	975	526	449	111	68	415	381	
	60-64 ans	1 256	679	577	130	78	549	499	
	65-69 ans	1 551	896	655	126	78	770	577	
	70-74 ans	1 322	727	595	76	52	651	543	
	50-74 ans	5 933	3 267	2 666	737	511	2 530	2 155	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour									
la coloscopie	50-54 ans	820	435	385	291	233	144	152	
	55-59 ans	968	524	444	110	68	414	376	
	60-64 ans	1 242	670	572	128	77	542	495	
	65-69 ans	1 531	885	646	122	76	763	570	
	70-74 ans	1 295	714	581	72	51	642	530	
	50-74 ans	5 856	3 228	2 628	723	505	2 505	2 123	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	736	385	351	253	211	132	140	
	55-59 ans	882	489	393	95	54	394	339	
	60-64 ans	1 167	627	540	116	70	511	470	
	65-69 ans	1 424	813	611	98	73	715	538	
	70-74 ans	1 196	656	540	64	47	592	493	
	50-74 ans	5 405	2 970	2 435	626	455	2 344	1 980	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50.54	700	070	000	0.11	000	100	100	
complète	50-54 ans	706	370	336	241	200	129	136	
	55-59 ans	857	475	382	91	52	384	330	
	60-64 ans	1 116	602	514	109	67	493	447	
	65-69 ans	1 340	777	563	90	64	687	499	
	70-74 ans	1 127	610	517	57	46	553	471	
	50-74 ans	5 146	2 834	2 312	588	429	2 246	1 883	
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou									
à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2	

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
	50-74 ans	31	19	12	4	1	15	11
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	730	381	349	251	209	130	140
	55-59 ans	878	486	392	94	54	392	338
	60-64 ans	1 151	620	531	115	69	505	462
	65-69 ans	1 395	803	592	95	71	708	521
	70-74 ans	1 176	644	532	63	47	581	485
	50-74 ans	5 330	2 934	2 396	618	450	2 316	1 946
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et								
une autre exploration colique	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	16	7	9	1	1	6	8
	65-69 ans	29	10	19	3	2	7	17
	70-74 ans	20	12	8	1	0	11	8
	50-74 ans	75	36	39	8	5	28	34
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration		_		_			_	
colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	9	4	5	2	1	2	4
	70-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
	50-74 ans	23	8	15	5	2	3	13

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,4	6,4	6,8	7	5,7	5,5
	55-59 ans	6,3	6,5	6,1	8	6,9	6,2	6
	60-64 ans	6,2	6	6,4	6,9	7,6	5,8	6,3
	65-69 ans	6,1	5,8	6,4	7,1	8,5	5,6	6,2
	70-74 ans	7,9	7,7	8,1	10,7	10,6	7,4	7,9
	50-74 ans	6,6	6,4	6,6	7,3	7,5	6,2	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	3,3	3,4	1,9	1,9
	55-59 ans	2,5	2,5	2,4	4,1	3,8	2,2	2,2
	60-64 ans	2,5	2,3	2,6	3,3	4,6	2,1	2,4
	65-69 ans	2,4	2,2	2,5	3,7	4,8	2	2,3
	70-74 ans	3,4	3,2	3,5	5,4	6,3	3	3,2
	50-74 ans	2,7	2,6	2,7	3,6	4	2,2	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un	50.54 and	50.4	50.0	55.0	50.0	54	07.4	05.0
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,4	56,9	55,9	52,3	51	67,1	65,8
	55-59 ans	60,8	61,6	60,2	49,1	45,1	65,1	63,4
	60-64 ans	60,4	62,3	59,2	52,9	39,5	64,3	62,4
	65-69 ans	61,7	62,5	61,1	47,5	43,7	65	63,5
	70-74 ans	57,5	57,9	57,2	49,5	40,7	59	59,1
DOA. Town do no reconstruction test a call'it a consider	50-74 ans	59,4	60,2	58,8	51,1	46,8	63,5	62,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,7	2,8	3,8	2,8	3,4	2,9
personnes ayant fait un test analysable (70)	55-59 ans	3,7	3,7 4,7	3	5,6	3	3,4 4,5	2,9
	60-64 ans	4,3	5,3	3,4	6,7	4	5,1	3,4
	65-69 ans	4,8	6,3	3, 4 3,6	7,8	4,9	6,1	3, 4 3,5
	70-74 ans	4,6 5,6	6,8	3,6 4,6	7,0 8,7	4,9 5,5	6,7	3,5 4,6
	50-74 ans	4,3	5,4	3,5	5,2	3,4	5,4	3,5
	50-74 ans **	4,3 4,2	5, 4 5,1		5,2	3,4	5,4	3,3
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et	JU-14 all5	4,2	3,1	3,4	-	-	-	-
étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	99,1	98,7	99	99,1	99,3	98,1

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,3	99,6	98,9	99,1	100	99,8	98,7
	60-64 ans	98,9	98,7	99,1	98,5	98,7	98,7	99,2
	65-69 ans	98,7	98,8	98,6	96,8	97,4	99,1	98,8
	70-74 ans	98	98,2	97,6	94,7	98,1	98,6	97,6
	50-74 ans	98,7	98,8	98,6	98,1	98,8	99	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la								
coloscopie)	50-54 ans	89,8	88,5	91,2	86,9	90,6	91,7	92,1
	55-59 ans	91,1	93,3	88,5	86,4	79,4	95,2	90,2
	60-64 ans	94	93,6	94,4	90,6	90,9	94,3	94,9
	65-69 ans	93	91,9	94,6	80,3	96,1	93,7	94,4
	70-74 ans	92,4	91,9	92,9	88,9	92,2	92,2	93
	50-74 ans	92,3	92	92,7	86,6	90,1	93,6	93,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	95,9	96,1	95,7	95,3	94,8	97,7	97,1
	55-59 ans	97,2	97,1	97,2	95,8	96,3	97,5	97,3
	60-64 ans	95,6	96	95,2	94	95,7	96,5	95,1
	65-69 ans	94,1	95,6	92,1	91,8	87,7	96,1	92,8
	70-74 ans	94,2	93	95,7	89,1	97,9	93,4	95,5
	50-74 ans	95,2	95,4	94,9	93,9	94,3	95,8	95,1

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)