Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27 724	12 735	14 989	7 693	8 521	5 042	6 468
	55-59 ans	29 133	12 736	16 397	2 043	2 343	10 693	14 054
	60-64 ans	34 442	15 526	18 916	1 827	1 946	13 699	16 970
	65-69 ans	35 437	16 402	19 035	1 417	1 463	14 985	17 572
	70-74 ans	19 129	9 002	10 127	574	671	8 428	9 456
	50-74 ans	145 865	66 401	79 464	13 554	14 944	52 847	64 520
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	1 469	664	805	444	505	220	300
	55-59 ans	1 410	581	829	107	142	474	687
	60-64 ans	1 748	768	980	110	108	658	872
	65-69 ans	1 837	788	1 049	93	101	695	948
	70-74 ans	1 279	589	690	51	54	538	636
	50-74 ans	7 743	3 390	4 353	805	910	2 585	3 443
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable								
suite à un test NA	50-54 ans	722	315	407	196	228	119	179
	55-59 ans	730	291	439	37	50	254	389
	60-64 ans	1 019	459	560	48	56	411	504
	65-69 ans	1 115	490	625	43	43	447	582
	70-74 ans	711	329	382	20	17	309	365
	50-74 ans	4 297	1 884	2 413	344	394	1 540	2 019
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	747	349	398	248	277	101	121
	55-59 ans	680	290	390	70	92	220	298
	60-64 ans	729	309	420	62	52	247	368
	65-69 ans	722	298	424	50	58	248	366
	70-74 ans	568	260	308	31	37	229	271
	50-74 ans	3 446	1 506	1 940	461	516	1 045	1 424
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test				==:				
analysable)	50-54 ans	26 977	12 386	14 591	7 445	8 244	4 941	6 347
	55-59 ans	28 453	12 446	16 007	1 973	2 251	10 473	13 756
	60-64 ans	33 713	15 217	18 496	1 765	1 894	13 452	16 602

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015 Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	34 715	16 104	18 611	1 367	1 405	14 737	17 206
	70-74 ans	18 561	8 742	9 819	543	634	8 199	9 185
	50-74 ans	142 419	64 895	77 524	13 093	14 428	51 802	63 096
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	992	544	448	316	261	228	187
	55-59 ans	1 208	673	535	127	88	546	447
	60-64 ans	1 708	1 003	705	165	110	838	595
	65-69 ans	1 825	1 124	701	126	69	998	632
	70-74 ans	1 240	736	504	48	37	688	467
	50-74 ans	6 973	4 080	2 893	782	565	3 298	2 328
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour								
la coloscopie	50-54 ans	985	541	444	314	259	227	185
	55-59 ans	1 191	661	530	126	88	535	442
	60-64 ans	1 687	986	701	163	109	823	592
	65-69 ans	1 802	1 112	690	126	68	986	622
	70-74 ans	1 220	724	496	47	36	677	460
	50-74 ans	6 885	4 024	2 861	776	560	3 248	2 301
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	853	464	389	259	221	205	168
	55-59 ans	1 055	581	474	96	79	485	395
	60-64 ans	1 515	894	621	140	91	754	530
	65-69 ans	1 628	1 007	621	101	58	906	563
	70-74 ans	1 066	638	428	37	28	601	400
	50-74 ans	6 117	3 584	2 533	633	477	2 951	2 056
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50.54	200	450	000	054	0.17	400	405
complète	50-54 ans	832	450	382	254	217	196	165
	55-59 ans	1 032	567	465	93	77	474	388
	60-64 ans	1 466	862	604	135	88	727	516
	65-69 ans	1 581	988	593	99	54	889	539
	70-74 ans	1 028	617	411	35	26	582	385
	50-74 ans	5 939	3 484	2 455	616	462	2 868	1 993
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou								
à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	9	7	2	3	0	4	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	23	19	4	5	0	14	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	841	457	384	257	218	200	166
	55-59 ans	1 042	574	468	94	77	480	391
	60-64 ans	1 496	884	612	138	89	746	523
	65-69 ans	1 608	996	612	100	57	896	555
	70-74 ans	1 046	629	417	37	28	592	389
	50-74 ans	6 033	3 540	2 493	626	469	2 914	2 024
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et			_	_	_	_	_	
une autre exploration colique	50-54 ans	12	7	5	2	3	5	2
	55-59 ans	13	7	6	2	2	5	4
	60-64 ans	19	10	9	2	2	8	7
	65-69 ans	20	11	9	1	1	10	8
	70-74 ans	20	9	11	0	0	9	11
	50-74 ans	84	44	40	7	8	37	32
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration	50.54	0	4	4	4	0	0	4
colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	10	4	6	0	1	4	5
	50-74 ans	29	17	12	1	2	16	10

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décemb	ore 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,2	5,4	5,8	5,9	4,4	4,6
	55-59 ans	4,8	4,6	5,1	5,2	6,1	4,4	4,9
	60-64 ans	5,1	4,9	5,2	6	5,5	4,8	5,1
	65-69 ans	5,2	4,8	5,5	6,6	6,9	4,6	5,4
	70-74 ans	6,7	6,5	6,8	8,9	8	6,4	6,7
	50-74 ans	5,3	5,1	5,5	5,9	6,1	4,9	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,7	2,7	3,2	3,3	2	1,9
	55-59 ans	2,3	2,3	2,4	3,4	3,9	2,1	2,1
	60-64 ans	2,1	2	2,2	3,4	2,7	1,8	2,2
	65-69 ans	2	1,8	2,2	3,5	4	1,7	2,1
	70-74 ans	3	2,9	3	5,4	5,5	2,7	2,9
	50-74 ans	2,4	2,3	2,4	3,4	3,5	2	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un	50.54	40.4	47.4	50.0	44.4	45.4	- 4 4	50.7
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	49,1	47,4	50,6	44,1	45,1	54,1	59,7
	55-59 ans	51,8	50,1	53	34,6	35,2	53,6	56,6
	60-64 ans	58,3	59,8	57,1	43,6	51,9	62,5	57,8
	65-69 ans	60,7	62,2	59,6	46,2	42,6	64,3	61,4
	70-74 ans	55,6	55,9	55,4	39,2	31,5	57,4	57,4
	50-74 ans	55,5	55,6	55,4	42,7	43,3	59,6	58,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les	F0 F4 one	2.7	4.4	2.4	4.0	2.2	4.6	2.0
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,4	3,1	4,2	3,2	4,6	2,9
	55-59 ans	4,2	5,4	3,3	6,4	3,9	5,2	3,2
	60-64 ans	5,1	6,6	3,8	9,3	5,8	6,2	3,6
	65-69 ans	5,3	7	3,8	9,2	4,9	6,8	3,7
	70-74 ans	6,7	8,4	5,1	8,8	5,8	8,4	5,1
	50-74 ans	4,9	6,3	3,7	6	3,9	6,4	3,7
DOE Doursenters de personnes quent qui un test sessificat	50-74 ans **	4,8	6	3,7	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,4	99,1	99,4	99,2	99,6	98,9

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total			e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,6	98,2	99,1	99,2	100	98	98,9
	60-64 ans	98,8	98,3	99,4	98,8	99,1	98,2	99,5
	65-69 ans	98,7	98,9	98,4	100	98,6	98,8	98,4
	70-74 ans	98,4	98,4	98,4	97,9	97,3	98,4	98,5
	50-74 ans	98,7	98,6	98,9	99,2	99,1	98,5	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la								
coloscopie)	50-54 ans	86,6	85,8	87,6	82,5	85,3	90,3	90,8
	55-59 ans	88,6	87,9	89,4	76,2	89,8	90,7	89,4
	60-64 ans	89,8	90,7	88,6	85,9	83,5	91,6	89,5
	65-69 ans	90,3	90,6	90	80,2	85,3	91,9	90,5
	70-74 ans	87,4	88,1	86,3	78,7	77,8	88,8	87
	50-74 ans	88,8	89,1	88,5	81,6	85,2	90,9	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	97,5	97	98,2	98,1	98,2	95,6	98,2
	55-59 ans	97,8	97,6	98,1	96,9	97,5	97,7	98,2
	60-64 ans	96,8	96,4	97,3	96,4	96,7	96,4	97,4
	65-69 ans	97,1	98,1	95,5	98	93,1	98,1	95,7
	70-74 ans	96,4	96,7	96	94,6	92,9	96,8	96,3
	50-74 ans	97,1	97,2	96,9	97,3	96,9	97,2	96,9

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)