

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 531	1 197	1 334	705	739	492	595
	55-59 ans	2 599	1 174	1 425	150	162	1 024	1 263
	60-64 ans	3 145	1 388	1 757	153	168	1 235	1 589
	65-69 ans	3 335	1 608	1 727	138	95	1 470	1 632
	70-74 ans	2 238	1 098	1 140	63	50	1 035	1 090
	50-74 ans	13 848	6 465	7 383	1 209	1 214	5 256	6 169
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	130	60	70	41	44	19	26
	55-59 ans	131	61	70	10	12	51	58
	60-64 ans	152	58	94	4	11	54	83
	65-69 ans	168	73	95	5	7	68	88
	70-74 ans	154	75	79	4	4	71	75
	50-74 ans	735	327	408	64	78	263	330
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	91	42	49	26	31	16	18
	55-59 ans	95	41	54	5	6	36	48
	60-64 ans	119	45	74	3	5	42	69
	65-69 ans	145	63	82	4	5	59	77
	70-74 ans	125	62	63	1	3	61	60
	50-74 ans	575	253	322	39	50	214	272
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	39	18	21	15	13	3	8
	55-59 ans	36	20	16	5	6	15	10
	60-64 ans	33	13	20	1	6	12	14
	65-69 ans	23	10	13	1	2	9	11
	70-74 ans	29	13	16	3	1	10	15
	50-74 ans	160	74	86	25	28	49	58
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 492	1 179	1 313	690	726	489	587
	55-59 ans	2 563	1 154	1 409	145	156	1 009	1 253
	60-64 ans	3 112	1 375	1 737	152	162	1 223	1 575
	65-69 ans	3 312	1 598	1 714	137	93	1 461	1 621
	70-74 ans	2 209	1 085	1 124	60	49	1 025	1 075
	50-74 ans	13 688	6 391	7 297	1 184	1 186	5 207	6 111
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	94	55	39	33	20	22	19
	55-59 ans	109	73	36	17	6	56	30
	60-64 ans	115	73	42	9	7	64	35
	65-69 ans	162	101	61	11	3	90	58
	70-74 ans	103	69	34	5	2	64	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	583	371	212	75	38	296	174
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	94	55	39	33	20	22	19
55-59 ans	108	72	36	17	6	55	30
60-64 ans	114	72	42	9	7	63	35
65-69 ans	161	100	61	11	3	89	58
70-74 ans	99	67	32	5	2	62	30
50-74 ans	576	366	210	75	38	291	172
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	88	51	37	29	18	22	19
55-59 ans	98	67	31	15	6	52	25
60-64 ans	104	67	37	8	6	59	31
65-69 ans	156	95	61	11	3	84	58
70-74 ans	94	64	30	4	2	60	28
50-74 ans	540	344	196	67	35	277	161
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	86	49	37	27	18	22	19
55-59 ans	91	64	27	14	4	50	23
60-64 ans	93	61	32	7	6	54	26
65-69 ans	145	89	56	10	2	79	54
70-74 ans	87	59	28	4	2	55	26
50-74 ans	502	322	180	62	32	260	148
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	88	51	37	29	18	22	19
55-59 ans	97	67	30	15	5	52	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	102	66	36	8	5	58	31
	65-69 ans	155	94	61	11	3	83	58
	70-74 ans	92	64	28	4	2	60	26
	50-74 ans	534	342	192	67	33	275	159
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	87	50	37	28	18	22	19
	55-59 ans	98	67	31	15	6	52	25
	60-64 ans	101	66	35	8	6	58	29
	65-69 ans	154	94	60	10	3	84	57
	70-74 ans	94	64	30	4	2	60	28
	50-74 ans	534	341	193	65	35	276	158
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	88	51	37	29	18	22	19
	55-59 ans	98	67	31	15	6	52	25
	60-64 ans	104	67	37	8	6	59	31
	65-69 ans	156	95	61	11	3	84	58
	70-74 ans	95	64	31	4	2	60	29
	50-74 ans	541	344	197	67	35	277	162
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	20	7	13	4	7	3	6
	55-59 ans	32	17	15	4	2	13	13
	60-64 ans	28	16	12	0	0	16	12
	65-69 ans	44	19	25	1	1	18	24
	70-74 ans	20	14	6	1	0	13	6
	50-74 ans	144	73	71	10	10	63	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	9	8	1	1	0	7	1
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	26	16	10	4	4	12	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	19	15	4	9	2	6	2
	55-59 ans	21	13	8	3	1	10	7
	60-64 ans	14	8	6	0	2	8	4
	65-69 ans	29	20	9	2	0	18	9
	70-74 ans	19	9	10	0	2	9	8
	50-74 ans	102	65	37	14	7	51	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	29	18	11	9	5	9	6
	55-59 ans	26	23	3	4	2	19	1
	60-64 ans	41	31	10	5	2	26	8
	65-69 ans	65	47	18	6	2	41	16
	70-74 ans	31	21	10	0	0	21	10
	50-74 ans	192	140	52	24	11	116	41
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	16	14	2	3	0	11	2
	50-74 ans	46	34	12	7	1	27	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	48	33	15	18	7	15	8
	55-59 ans	47	36	11	7	3	29	8
	60-64 ans	55	39	16	5	4	34	12
	65-69 ans	94	67	27	8	2	59	25
	70-74 ans	50	30	20	0	2	30	18
	50-74 ans	294	205	89	38	18	167	71
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	29	18	11	9	5	9	6
	55-59 ans	26	23	3	4	2	19	1
	60-64 ans	41	31	10	5	2	26	8
	65-69 ans	65	47	18	6	2	41	16
	70-74 ans	31	21	10	0	0	21	10
	50-74 ans	192	140	52	24	11	116	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	28	18	10	9	4	9	6
	55-59 ans	25	22	3	4	2	18	1
	60-64 ans	39	29	10	4	2	25	8
	65-69 ans	61	44	17	6	2	38	15
	70-74 ans	30	20	10	0	0	20	10
	50-74 ans	183	133	50	23	10	110	40
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	31	20	11	10	5	10	6
	55-59 ans	29	26	3	5	2	21	1
	60-64 ans	44	34	10	5	2	29	8
	65-69 ans	67	50	17	6	2	44	15
	70-74 ans	36	21	15	0	2	21	13
	50-74 ans	207	151	56	26	13	125	43
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	16	14	2	3	0	11	2
	50-74 ans	46	34	12	7	1	27	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	12	8	4	1	0	7	4
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	15	13	2	3	0	10	2
	50-74 ans	42	30	12	6	1	24	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	27	18	9	3	0	15	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	7	7	0	2	0	5	0
	50-74 ans	15	12	3	3	1	9	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	11	9	2	3	0	6	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 79 - Deux-Sèvres

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	9	6	3	0	0	6	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	31	21	10	4	1	17	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	20	13	7	6	2	7	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5	5,2	5,8	6	3,9	4,4
	55-59 ans	5	5,2	4,9	6,7	7,4	5	4,6
	60-64 ans	4,8	4,2	5,4	2,6	6,5	4,4	5,2
	65-69 ans	5	4,5	5,5	3,6	7,4	4,6	5,4
	70-74 ans	6,9	6,8	6,9	6,3	8	6,9	6,9
	50-74 ans	5,3	5,1	5,5	5,3	6,4	5	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,6	2,1	1,8	0,6	1,3
	55-59 ans	1,4	1,7	1,1	3,3	3,7	1,5	0,8
	60-64 ans	1	0,9	1,1	0,7	3,6	1	0,9
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,7	2,1	0,6	0,7
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	4,8	2	1	1,4
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,1	2,3	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70	70	70	63,4	70,5	84,2	69,2
	55-59 ans	72,5	67,2	77,1	50	50	70,6	82,8
	60-64 ans	78,3	77,6	78,7	75	45,5	77,8	83,1
	65-69 ans	86,3	86,3	86,3	80	71,4	86,8	87,5
	70-74 ans	81,2	82,7	79,7	25	75	85,9	80
	50-74 ans	78,2	77,4	78,9	60,9	64,1	81,4	82,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,7	3	4,8	2,8	4,5	3,2
	55-59 ans	4,3	6,3	2,6	11,7	3,8	5,6	2,4
	60-64 ans	3,7	5,3	2,4	5,9	4,3	5,2	2,2
	65-69 ans	4,9	6,3	3,6	8	3,2	6,2	3,6
	70-74 ans	4,7	6,4	3	8,3	4,1	6,2	3
	50-74 ans	4,3	5,8	2,9	6,3	3,2	5,7	2,8
50-74 ans **	4,2	5,7	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	98,6	100	100	100	98,2	100
	60-64 ans	99,1	98,6	100	100	100	98,4	100
	65-69 ans	99,4	99	100	100	100	98,9	100
	70-74 ans	96,1	97,1	94,1	100	100	96,9	93,8
	50-74 ans	98,8	98,7	99,1	100	100	98,3	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,6	92,7	94,9	87,9	90	100	100
	55-59 ans	90,7	93,1	86,1	88,2	100	94,5	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	91,2	93,1	88,1	88,9	85,7	93,7	88,6
65-69 ans	96,9	95	100	100	100	94,4	100
70-74 ans	94,9	95,5	93,8	80	100	96,8	93,3
50-74 ans	93,8	94	93,3	89,3	92,1	95,2	93,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	97,7	96,1	100	93,1	100	100	100
55-59 ans	92,9	95,5	87,1	93,3	66,7	96,2	92
60-64 ans	89,4	91	86,5	87,5	100	91,5	83,9
65-69 ans	92,9	93,7	91,8	90,9	66,7	94	93,1
70-74 ans	92,6	92,2	93,3	100	100	91,7	92,9
50-74 ans	93	93,6	91,8	92,5	91,4	93,9	91,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
65-69 ans	4	4	4	3	5	4	3
70-74 ans	3	4	3	4	3	3	3
50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	103	104	103	92	100	119	105
55-59 ans	91	89	96	104	128	84	90
60-64 ans	116	116	118	173	161	108	109
65-69 ans	110	116	101	151	98	111	102
70-74 ans	103	97	117	126	107	95	117
50-74 ans	106	105	106	117	115	103	104
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	89 (70-121)	88 (76-113)	100 (68-122)	83 (76,5-108)	94 (66-120)	99 (70-138)	100 (75-124)
55-59 ans	84 (59-120)	80 (56-122)	87,5 (70-120)	99 (65-128)	76 (75-197)	78 (53,5-111,5)	88 (70-113)
60-64 ans	99 (68-131)	100 (64-123)	98 (73,5-139)	126 (104-170,5)	149 (97-194)	96 (61-122)	93,5 (71-131)
65-69 ans	96 (75-128,5)	100 (83-134)	89 (74-124)	96 (63-190)	81 (54-158)	100,5 (83,5-131)	89 (74-124)
70-74 ans	95 (60-123)	92 (56-118)	107,5 (60-136)	114 (96,5-155)	107 (59-155)	90 (55-117)	107,5 (61-129,5)
50-74 ans	95 (68-125)	94,5 (66-125)	96 (70-125)	96,5 (77-130)	100,5 (67-151)	94 (64,5-122,5)	96 (70,5-124)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	4,3	5,5	2,6	9,1	5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	5,5	4,1	8,3	11,8	0	1,8	10
60-64 ans	4,3	4,1	4,8	11,1	14,3	3,1	2,9
65-69 ans	1,9	3	0	0	0	3,3	0
70-74 ans	1,9	1,4	2,9	0	0	1,6	3,1
50-74 ans	3,4	3,5	3,3	8	5,3	2,4	2,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	98,9	98	100	96,6	100	100	100
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	97,1	98,5	94,6	100	100	98,3	93,5
65-69 ans	98,7	98,9	98,4	90,9	100	100	98,3
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
50-74 ans	98,9	99,1	98,5	97	100	99,6	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	22,7	13,7	35,1	13,8	38,9	13,6	31,6
55-59 ans	32,7	25,4	48,4	26,7	33,3	25	52
60-64 ans	26,9	23,9	32,4	0	0	27,1	38,7
65-69 ans	28,2	20	41	9,1	33,3	21,4	41,4
70-74 ans	21,1	21,9	19,4	25	0	21,7	20,7
50-74 ans	26,6	21,2	36	14,9	28,6	22,7	37,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	6,8	5,9	8,1	6,9	11,1	4,5	5,3
55-59 ans	9,2	11,9	3,2	6,7	0	13,5	4
60-64 ans	3,8	3	5,4	12,5	33,3	1,7	0
65-69 ans	1,3	0	3,3	0	0	0	3,4
70-74 ans	5,3	4,7	6,5	0	0	5	6,9
50-74 ans	4,8	4,7	5,1	6	11,4	4,3	3,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	1,1	0	2,7	0	0	0	5,3
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,2	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0	0	0,4	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	21,6	29,4	10,8	31	11,1	27,3	10,5
55-59 ans	21,4	19,4	25,8	20	16,7	19,2	28
60-64 ans	13,5	11,9	16,2	0	33,3	13,6	12,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	18,6	21,1	14,8	18,2	0	21,4	15,5
	70-74 ans	20	14,1	32,3	0	100	15	27,6
	50-74 ans	18,9	18,9	18,8	20,9	20	18,4	18,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33	35,3	29,7	31	27,8	40,9	31,6
	55-59 ans	26,5	34,3	9,7	26,7	33,3	36,5	4
	60-64 ans	39,4	46,3	27	62,5	33,3	44,1	25,8
	65-69 ans	41,7	49,5	29,5	54,5	66,7	48,8	27,6
	70-74 ans	32,6	32,8	32,3	0	0	35	34,5
	50-74 ans	35,5	40,7	26,4	35,8	31,4	41,9	25,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	5,9	8,1	6,9	5,6	4,5	10,5
	55-59 ans	4,1	4,5	3,2	0	0	5,8	4
	60-64 ans	11,5	11,9	10,8	12,5	0	11,9	12,9
	65-69 ans	5,1	6,3	3,3	9,1	0	6	3,4
	70-74 ans	16,8	21,9	6,5	75	0	18,3	6,9
	50-74 ans	8,5	9,9	6,1	10,4	2,9	9,7	6,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	2	2,7	3,4	5,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,7	0	0	0	3,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,3	1	1,5	2,9	0	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	0	2,7	0	0	0	5,3
	55-59 ans	3,1	1,5	6,5	6,7	16,7	0	4
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,9	1,1	3,3	0	0	1,2	3,4
	70-74 ans	1,1	1,6	0	0	0	1,7	0
	50-74 ans	1,5	0,9	2,5	1,5	2,9	0,7	2,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	2	0	3,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,9	1,5	5,4	0	0	1,7	6,5
	65-69 ans	1,9	1,1	3,3	9,1	0	0	3,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	0,9	2	3	0	0,4	2,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	19,3	28	11,4	26,1	9,6	30,7	13,6
	55-59 ans	18,3	31,2	7,8	48,3	19,2	28,7	6,4
	60-64 ans	17,7	28,4	9,2	32,9	24,7	27,8	7,6
	65-69 ans	28,4	41,9	15,8	58,4	21,5	40,4	15,4
	70-74 ans	22,6	27,6	17,8	0	40,8	29,3	16,7
	50-74 ans	21,5	32,1	12,2	32,1	15,2	32,1	11,6
	50-74 ans **	20,9	30,9	11,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,6	15,3	8,4	13	6,9	18,4	10,2
	55-59 ans	10,1	19,9	2,1	27,6	12,8	18,8	0,8
	60-64 ans	13,2	22,5	5,8	32,9	12,3	21,3	5,1
	65-69 ans	19,6	29,4	10,5	43,8	21,5	28,1	9,9
	70-74 ans	14	19,4	8,9	0	0	20,5	9,3
	50-74 ans	14	21,9	7,1	20,3	9,3	22,3	6,7
	50-74 ans **	13,4	20,6	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	15,3	7,6	13	5,5	18,4	10,2
	55-59 ans	9,8	19,1	2,1	27,6	12,8	17,8	0,8
	60-64 ans	12,5	21,1	5,8	26,3	12,3	20,4	5,1
	65-69 ans	18,4	27,5	9,9	43,8	21,5	26	9,3
	70-74 ans	13,6	18,4	8,9	0	0	19,5	9,3
	50-74 ans	13,4	20,8	6,9	19,4	8,4	21,1	6,5
	50-74 ans **	12,8	19,7	6,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	17	8,4	14,5	6,9	20,4	10,2
	55-59 ans	11,3	22,5	2,1	34,5	12,8	20,8	0,8
	60-64 ans	14,1	24,7	5,8	32,9	12,3	23,7	5,1
	65-69 ans	20,2	31,3	9,9	43,8	21,5	30,1	9,3
	70-74 ans	16,3	19,4	13,3	0	40,8	20,5	12,1
	50-74 ans	15,1	23,6	7,7	22	11	24	7
	50-74 ans **	14,6	22,5	7,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	2,9	1,4	2	3,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 79 - Deux-Sèvres

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	1,6	2,6	0,7	0	0	3	0,8	
60-64 ans	3,9	5,8	2,3	6,6	0	5,7	2,5	
65-69 ans	2,4	3,8	1,2	7,3	0	3,4	1,2	
70-74 ans	7,2	12,9	1,8	50	0	10,7	1,9	
50-74 ans	3,4	5,3	1,6	5,9	0,8	5,2	1,8	
50-74 ans **	3,2	4,8	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	80	100	66,7	100	0	100	100	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	83,3	75	100	100	0	71,4	100	
65-69 ans	62,5	66,7	50	0	0	80	50	
70-74 ans	53,3	46,2	100	33,3	0	50	100	
50-74 ans	64,3	60	75	50	0	62,5	81,8	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)