

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 326	1 571	1 755	1 088	1 150	483	605
	55-59 ans	3 318	1 469	1 849	294	366	1 175	1 483
	60-64 ans	3 631	1 801	1 830	280	306	1 521	1 524
	65-69 ans	3 144	1 731	1 413	171	236	1 560	1 177
	70-74 ans	1 826	1 083	743	86	111	997	632
	50-74 ans	15 245	7 655	7 590	1 919	2 169	5 736	5 421
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	160	66	94	51	70	15	24
	55-59 ans	156	62	94	14	18	48	76
	60-64 ans	225	95	130	13	28	82	102
	65-69 ans	190	103	87	15	28	88	59
	70-74 ans	140	82	58	10	11	72	47
	50-74 ans	871	408	463	103	155	305	308
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	74	32	42	23	30	9	12
	55-59 ans	70	29	41	4	6	25	35
	60-64 ans	127	63	64	5	10	58	54
	65-69 ans	99	60	39	9	4	51	35
	70-74 ans	63	36	27	2	2	34	25
	50-74 ans	433	220	213	43	52	177	161
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	86	34	52	28	40	6	12
	55-59 ans	86	33	53	10	12	23	41
	60-64 ans	98	32	66	8	18	24	48
	65-69 ans	91	43	48	6	24	37	24
	70-74 ans	77	46	31	8	9	38	22
	50-74 ans	438	188	250	60	103	128	147
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 240	1 537	1 703	1 060	1 110	477	593
	55-59 ans	3 232	1 436	1 796	284	354	1 152	1 442
	60-64 ans	3 533	1 769	1 764	272	288	1 497	1 476
	65-69 ans	3 053	1 688	1 365	165	212	1 523	1 153
	70-74 ans	1 749	1 037	712	78	102	959	610
	50-74 ans	14 807	7 467	7 340	1 859	2 066	5 608	5 274
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	115	60	55	45	40	15	15
	55-59 ans	134	66	68	8	20	58	48
	60-64 ans	188	114	74	19	20	95	54
	65-69 ans	155	109	46	8	12	101	34
	70-74 ans	121	79	42	4	5	75	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	713	428	285	84	97	344	188
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	114	60	54	45	40	15	14
	55-59 ans	134	66	68	8	20	58	48
	60-64 ans	187	114	73	19	20	95	53
	65-69 ans	155	109	46	8	12	101	34
	70-74 ans	119	79	40	4	5	75	35
	50-74 ans	709	428	281	84	97	344	184
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	102	55	47	40	34	15	13
	55-59 ans	116	59	57	4	17	55	40
	60-64 ans	173	106	67	17	17	89	50
	65-69 ans	141	102	39	8	10	94	29
	70-74 ans	109	72	37	3	4	69	33
	50-74 ans	641	394	247	72	82	322	165
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	101	54	47	40	34	14	13
	55-59 ans	113	58	55	4	16	54	39
	60-64 ans	170	105	65	17	16	88	49
	65-69 ans	137	100	37	8	9	92	28
	70-74 ans	106	72	34	3	4	69	30
	50-74 ans	627	389	238	72	79	317	159
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	101	54	47	40	34	14	13
	55-59 ans	114	58	56	3	16	55	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	172	106	66	17	16	89	50	
65-69 ans	138	100	38	8	10	92	28	
70-74 ans	108	72	36	3	4	69	32	
50-74 ans	633	390	243	71	80	319	163	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0	
55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	
60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1	
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1	
65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1	
70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2	
50-74 ans	6	0	6	0	1	0	5	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	101	54	47	40	34	14	13	
55-59 ans	115	58	57	3	17	55	40	
60-64 ans	172	106	66	17	16	89	50	
65-69 ans	141	102	39	8	10	94	29	
70-74 ans	107	72	35	3	4	69	31	
50-74 ans	636	392	244	71	81	321	163	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
50-54 ans	103	55	48	40	34	15	14	
55-59 ans	116	59	57	4	17	55	40	
60-64 ans	174	106	68	17	17	89	51	
65-69 ans	143	102	41	8	11	94	30	
70-74 ans	111	72	39	3	4	69	35	
50-74 ans	647	394	253	72	83	322	170	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	44	17	27	12	20	5	7	
55-59 ans	31	13	18	1	3	12	15	
60-64 ans	48	26	22	4	5	22	17	
65-69 ans	40	26	14	3	6	23	8	
70-74 ans	33	17	16	1	1	16	15	
50-74 ans	196	99	97	21	35	78	62	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	10	3	7	3	3	0
	55-59 ans	20	9	11	0	4	9	7
	60-64 ans	20	10	10	1	2	9	8
	65-69 ans	14	11	3	0	0	11	3
	70-74 ans	10	8	2	1	1	7	1
	50-74 ans	77	48	29	9	10	39	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	1	2	6	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	10	2	7	1	3	1
	55-59 ans	26	15	11	1	4	14	7
	60-64 ans	39	29	10	6	2	23	8
	65-69 ans	25	18	7	0	1	18	6
	70-74 ans	23	14	9	1	1	13	8
	50-74 ans	125	86	39	15	9	71	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	23	11	12	9	7	2	5
	55-59 ans	29	19	10	2	3	17	7
	60-64 ans	48	27	21	5	7	22	14
	65-69 ans	46	32	14	3	2	29	12
	70-74 ans	32	25	7	0	1	25	6
	50-74 ans	178	114	64	19	20	95	44
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	14	12	2	1	0	11	2
	65-69 ans	9	7	2	0	1	7	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	35	22	13	1	1	21	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	3	2	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	13	10	3	2	3	8	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	21	14	16	8	5	6
	55-59 ans	55	34	21	3	7	31	14
	60-64 ans	87	56	31	11	9	45	22
	65-69 ans	71	50	21	3	3	47	18
	70-74 ans	55	39	16	1	2	38	14
	50-74 ans	303	200	103	34	29	166	74
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	11	12	9	7	2	5
	55-59 ans	29	19	10	2	3	17	7
	60-64 ans	48	27	21	5	7	22	14
	65-69 ans	46	32	14	3	2	29	12
	70-74 ans	32	25	7	0	1	25	6
	50-74 ans	178	114	64	19	20	95	44

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	7	12	5	7	2	5
	55-59 ans	27	17	10	1	3	16	7
	60-64 ans	37	20	17	2	7	18	10
	65-69 ans	39	26	13	2	2	24	11
	70-74 ans	27	20	7	0	1	20	6
	50-74 ans	149	90	59	10	20	80	39
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	11	12	8	7	3	5
	55-59 ans	32	20	12	1	3	19	9
	60-64 ans	51	30	21	6	7	24	14
	65-69 ans	49	34	15	3	2	31	13
	70-74 ans	34	25	9	0	1	25	8
	50-74 ans	189	120	69	18	20	102	49
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	14	12	2	1	0	11	2
	65-69 ans	10	7	3	0	2	7	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	36	22	14	1	2	21	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	13	11	2	1	0	10	2
	65-69 ans	10	7	3	0	2	7	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	35	21	14	1	2	20	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	10	2	0	0	10	2
	65-69 ans	7	5	2	0	2	5	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	30	17	13	0	2	17	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	6	6	0	0	0	6	0
	65-69 ans	7	5	2	0	2	5	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	22	12	10	0	2	12	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	12	10	2	0	0	10	2
	65-69 ans	7	5	2	0	2	5	0
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	31	18	13	0	2	18	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	6	0	6	0	1	0	5
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	15	5	10	1	2	4	8

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,2	5,4	4,7	6,1	3,1	4
	55-59 ans	4,7	4,2	5,1	4,8	4,9	4,1	5,1
	60-64 ans	6,2	5,3	7,1	4,6	9,2	5,4	6,7
	65-69 ans	6	6	6,2	8,8	11,9	5,6	5
	70-74 ans	7,7	7,6	7,8	11,6	9,9	7,2	7,4
	50-74 ans	5,7	5,3	6,1	5,4	7,1	5,3	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,2	3	2,6	3,5	1,2	2
	55-59 ans	2,6	2,2	2,9	3,4	3,3	2	2,8
	60-64 ans	2,7	1,8	3,6	2,9	5,9	1,6	3,1
	65-69 ans	2,9	2,5	3,4	3,5	10,2	2,4	2
	70-74 ans	4,2	4,2	4,2	9,3	8,1	3,8	3,5
	50-74 ans	2,9	2,5	3,3	3,1	4,7	2,2	2,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	46,3	48,5	44,7	45,1	42,9	60	50
	55-59 ans	44,9	46,8	43,6	28,6	33,3	52,1	46,1
	60-64 ans	56,4	66,3	49,2	38,5	35,7	70,7	52,9
	65-69 ans	52,1	58,3	44,8	60	14,3	58	59,3
	70-74 ans	45	43,9	46,6	20	18,2	47,2	53,2
	50-74 ans	49,7	53,9	46	41,7	33,5	58	52,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	3,9	3,2	4,2	3,6	3,1	2,5
	55-59 ans	4,1	4,6	3,8	2,8	5,6	5	3,3
	60-64 ans	5,3	6,4	4,2	7	6,9	6,3	3,7
	65-69 ans	5,1	6,5	3,4	4,8	5,7	6,6	2,9
	70-74 ans	6,9	7,6	5,9	5,1	4,9	7,8	6,1
	50-74 ans	4,8	5,7	3,9	4,5	4,7	6,1	3,6
50-74 ans **	4,7	5,5	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	100	98,2	100	100	100	93,3
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	100	98,6	100	100	100	98,1
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	100	95,2	100	100	100	94,6
	50-74 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	91,7	87	88,9	85	100	92,9
	55-59 ans	86,6	89,4	83,8	50	85	94,8	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,5	93	91,8	89,5	85	93,7	94,3
	65-69 ans	91	93,6	84,8	100	83,3	93,1	85,3
	70-74 ans	91,6	91,1	92,5	75	80	92	94,3
	50-74 ans	90,4	92,1	87,9	85,7	84,5	93,6	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	98,2	100	100	100	93,3	100
	55-59 ans	97,4	98,3	96,5	100	94,1	98,2	97,5
	60-64 ans	98,3	99,1	97	100	94,1	98,9	98
	65-69 ans	97,2	98	94,9	100	90	97,9	96,6
	70-74 ans	97,2	100	91,9	100	100	100	90,9
	50-74 ans	97,8	98,7	96,4	100	96,3	98,4	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	4	5	4	5	4	4
	55-59 ans	5	5	4	8	6	4	4
	60-64 ans	5	5	5	7	9	5	4
	65-69 ans	5	5	5	4	7	5	5
	70-74 ans	5	5	5	7	12	5	4
	50-74 ans	5	5	5	5	6	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	128	131	125	137	140	116	86
	55-59 ans	117	121	112	105	110	122	113
	60-64 ans	104	103	104	105	116	103	100
	65-69 ans	109	108	110	61	126	112	105
	70-74 ans	118	114	125	79	105	115	127
	50-74 ans	113	113	114	117	125	112	108
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	108,5 (62-158)	105 (61-160)	117 (69-158)	99,5 (61,5-162)	128,5 (81-173)	105 (57-157)	102 (61-106)
	55-59 ans	102 (67-142,5)	110 (71-157)	99 (58-137)	96 (77,5-131,5)	98 (85-139)	116 (71-157)	101,5 (54,5-131)
	60-64 ans	96 (69-131)	96 (64-132)	98 (70-129)	117 (54-140)	99 (75-131)	93 (69-129)	92 (69-127)
	65-69 ans	95 (65-145)	101 (68-151)	91 (63-133)	66,5 (36-80)	95,5 (62-178)	107,5 (70-151)	91 (65-132)
	70-74 ans	103 (74-135)	107,5 (77-135,5)	96 (71-133)	74 (67-95)	92 (83,5-126,5)	112 (81-136)	98 (69-133)
	50-74 ans	100 (69-139)	103 (69-142)	99 (68-135)	91 (61,5-146)	108 (79-151)	105 (72-139)	95 (66-128)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,7	1,7	1,8	2,2	0	0	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	4,5	0	8,8	0	5	0	10,4
60-64 ans	1,6	1,8	1,4	0	5	2,1	0
65-69 ans	1,3	0,9	2,2	0	0	1	2,9
70-74 ans	1,7	1,3	2,4	0	0	1,3	2,7
50-74 ans	2,1	1,2	3,5	1,2	2,1	1,2	4,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	99	98,2	100	100	100	93,3	100
55-59 ans	99,1	98,3	100	75	100	100	100
60-64 ans	99,4	100	98,5	100	94,1	100	100
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	98,2	100	94,6	100	100	100	93,9
50-74 ans	99,2	99,5	98,8	98,6	98,8	99,7	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	42,7	30,9	56,3	30	58,8	33,3	50
55-59 ans	26,7	22	31,6	25	17,6	21,8	37,5
60-64 ans	27,6	24,5	32,4	23,5	29,4	24,7	33,3
65-69 ans	28	25,5	34,1	37,5	54,5	24,5	26,7
70-74 ans	29,7	23,6	41	33,3	25	23,2	42,9
50-74 ans	30,3	25,1	38,3	29,2	42,2	24,2	36,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	12,6	18,2	6,3	17,5	8,8	20	0
55-59 ans	17,2	15,3	19,3	0	23,5	16,4	17,5
60-64 ans	11,5	9,4	14,7	5,9	11,8	10,1	15,7
65-69 ans	9,8	10,8	7,3	0	0	11,7	10
70-74 ans	9	11,1	5,1	33,3	25	10,1	2,9
50-74 ans	11,9	12,2	11,5	12,5	12	12,1	11,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	1	1,8	0	0	0	6,7	0
55-59 ans	2,6	1,7	3,5	0	11,8	1,8	0
60-64 ans	1,1	1,9	0	0	0	2,2	0
65-69 ans	1,4	2	0	12,5	0	1,1	0
70-74 ans	0,9	1,4	0	0	0	1,4	0
50-74 ans	1,4	1,8	0,8	1,4	2,4	1,9	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	11,7	18,2	4,2	17,5	2,9	20	7,1
55-59 ans	22,4	25,4	19,3	25	23,5	25,5	17,5
60-64 ans	22,4	27,4	14,7	35,3	11,8	25,8	15,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,5	17,6	17,1	0	9,1	19,1	20
	70-74 ans	20,7	19,4	23,1	33,3	25	18,8	22,9
	50-74 ans	19,3	21,8	15,4	20,8	10,8	22	17,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,3	20	25	22,5	20,6	13,3	35,7
	55-59 ans	25	32,2	17,5	50	17,6	30,9	17,5
	60-64 ans	27,6	25,5	30,9	29,4	41,2	24,7	27,5
	65-69 ans	32,2	31,4	34,1	37,5	18,2	30,9	40
	70-74 ans	28,8	34,7	17,9	0	25	36,2	17,1
	50-74 ans	27,5	28,9	25,3	26,4	24,1	29,5	25,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1	0	2,1	0	0	0	7,1
	55-59 ans	3,4	0	7	0	0	0	10
	60-64 ans	8	11,3	2,9	5,9	0	12,4	3,9
	65-69 ans	6,3	6,9	4,9	0	9,1	7,4	3,3
	70-74 ans	6,3	4,2	10,3	0	0	4,3	11,4
	50-74 ans	5,4	5,6	5,1	1,4	1,2	6,5	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,9	5,5	2,1	7,5	2,9	0	0
	55-59 ans	1,7	1,7	1,8	0	5,9	1,8	0
	60-64 ans	0,6	0	1,5	0	0	0	2
	65-69 ans	0,7	1	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	4,2	2,4	0,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	1,8	2,1	2,5	2,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,5	0	5,9	0	0
	65-69 ans	4,2	4,9	2,4	12,5	9,1	4,3	0
	70-74 ans	3,6	5,6	0	0	0	5,8	0
	50-74 ans	2	2,5	1,2	2,8	3,6	2,5	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,9	0	2,6	0	0	2,9
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,8	13,7	8,2	15,1	7,2	10,1
	55-59 ans	17	23,7	11,7	10,6	19,8	9,7
	60-64 ans	24,6	31,7	17,6	40,4	31,3	14,9
	65-69 ans	23,3	29,6	15,4	18,2	14,2	15,6
	70-74 ans	31,4	37,6	22,5	12,8	19,6	23
	50-74 ans	20,5	26,8	14	18,3	14	14
	50-74 ans **	19,7	25,6	14,3	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	7,2	7	8,5	6,3	8,4
	55-59 ans	9	13,2	5,6	7	8,5	4,9
	60-64 ans	13,6	15,3	11,9	18,4	24,3	9,5
	65-69 ans	15,1	19	10,3	18,2	9,4	10,4
	70-74 ans	18,3	24,1	9,8	0	9,8	9,8
	50-74 ans	12	15,3	8,7	10,2	9,7	8,3
	50-74 ans **	11,4	14,4	8,6	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	4,6	7	4,7	6,3	8,4
	55-59 ans	8,4	11,8	5,6	3,5	8,5	4,9
	60-64 ans	10,5	11,3	9,6	7,4	24,3	6,8
	65-69 ans	12,8	15,4	9,5	12,1	9,4	9,5
	70-74 ans	15,4	19,3	9,8	0	9,8	9,8
	50-74 ans	10,1	12,1	8	5,4	9,7	7,4
	50-74 ans **	9,7	11,4	8	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	7,2	7	7,5	6,3	8,4
	55-59 ans	9,9	13,9	6,7	3,5	8,5	6,2
	60-64 ans	14,4	17	11,9	22,1	24,3	9,5
	65-69 ans	16	20,1	11	18,2	9,4	11,3
	70-74 ans	19,4	24,1	12,6	0	9,8	13,1
	50-74 ans	12,8	16,1	9,4	9,7	9,7	9,3
	50-74 ans **	12,2	15,2	9,4	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,6	0	0	1,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,2	0	2,2	0	0	0	2,8
60-64 ans	4	6,8	1,1	3,7	0	7,3	1,4
65-69 ans	3,3	4,1	2,2	0	9,4	4,6	0,9
70-74 ans	4	2,9	5,6	0	0	3,1	6,6
50-74 ans	2,4	2,9	1,9	0,5	1	3,7	2,3
50-74 ans **	2,3	2,5	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	7,7	9,1	0	100	0	0	0
65-69 ans	30	28,6	33,3	0	0	28,6	100
70-74 ans	14,3	33,3	0	0	0	33,3	0
50-74 ans	14,3	19	7,1	100	0	15	8,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)