

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 6 940 | 3 026 | 3 914 | 1 954 | 2 284 | 1 072 | 1 630 |
| | 55-59 ans | 6 940 | 2 884 | 4 056 | 411 | 503 | 2 473 | 3 553 |
| | 60-64 ans | 7 493 | 3 132 | 4 361 | 329 | 333 | 2 803 | 4 028 |
| | 65-69 ans | 7 489 | 3 252 | 4 237 | 255 | 205 | 2 997 | 4 032 |
| | 70-74 ans | 5 465 | 2 372 | 3 093 | 147 | 123 | 2 225 | 2 970 |
| | 50-74 ans | 34 327 | 14 666 | 19 661 | 3 096 | 3 448 | 11 570 | 16 213 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 208 | 77 | 131 | 59 | 81 | 18 | 50 |
| | 55-59 ans | 228 | 84 | 144 | 16 | 23 | 68 | 121 |
| | 60-64 ans | 272 | 104 | 168 | 12 | 19 | 92 | 149 |
| | 65-69 ans | 269 | 107 | 162 | 9 | 8 | 98 | 154 |
| | 70-74 ans | 292 | 123 | 169 | 9 | 6 | 114 | 163 |
| | 50-74 ans | 1 269 | 495 | 774 | 105 | 137 | 390 | 637 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 166 | 63 | 103 | 45 | 57 | 18 | 46 |
| | 55-59 ans | 192 | 72 | 120 | 15 | 15 | 57 | 105 |
| | 60-64 ans | 229 | 93 | 136 | 8 | 11 | 85 | 125 |
| | 65-69 ans | 234 | 98 | 136 | 6 | 2 | 92 | 134 |
| | 70-74 ans | 210 | 86 | 124 | 4 | 4 | 82 | 120 |
| | 50-74 ans | 1 031 | 412 | 619 | 78 | 89 | 334 | 530 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 42 | 14 | 28 | 14 | 24 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 36 | 12 | 24 | 1 | 8 | 11 | 16 |
| | 60-64 ans | 43 | 11 | 32 | 4 | 8 | 7 | 24 |
| | 65-69 ans | 35 | 9 | 26 | 3 | 6 | 6 | 20 |
| | 70-74 ans | 82 | 37 | 45 | 5 | 2 | 32 | 43 |
| | 50-74 ans | 238 | 83 | 155 | 27 | 48 | 56 | 107 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 6 898 | 3 012 | 3 886 | 1 940 | 2 260 | 1 072 | 1 626 |
| | 55-59 ans | 6 904 | 2 872 | 4 032 | 410 | 495 | 2 462 | 3 537 |
| | 60-64 ans | 7 450 | 3 121 | 4 329 | 325 | 325 | 2 796 | 4 004 |
| | 65-69 ans | 7 454 | 3 243 | 4 211 | 252 | 199 | 2 991 | 4 012 |
| | 70-74 ans | 5 383 | 2 335 | 3 048 | 142 | 121 | 2 193 | 2 927 |
| | 50-74 ans | 34 089 | 14 583 | 19 506 | 3 069 | 3 400 | 11 514 | 16 106 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 208 | 95 | 113 | 64 | 60 | 31 | 53 |
| | 55-59 ans | 261 | 133 | 128 | 22 | 15 | 111 | 113 |
| | 60-64 ans | 304 | 157 | 147 | 16 | 15 | 141 | 132 |
| | 65-69 ans | 387 | 230 | 157 | 27 | 8 | 203 | 149 |
| | 70-74 ans | 307 | 150 | 157 | 19 | 8 | 131 | 149 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 1 467 | 765 | 702 | 148 | 106 | 617 | 596 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 202 | 91 | 111 | 61 | 59 | 30 | 52 |
| | 55-59 ans | 259 | 133 | 126 | 22 | 15 | 111 | 111 |
| | 60-64 ans | 300 | 153 | 147 | 15 | 15 | 138 | 132 |
| | 65-69 ans | 378 | 224 | 154 | 25 | 7 | 199 | 147 |
| | 70-74 ans | 295 | 145 | 150 | 17 | 8 | 128 | 142 |
| | 50-74 ans | 1 434 | 746 | 688 | 140 | 104 | 606 | 584 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 184 | 81 | 103 | 52 | 52 | 29 | 51 |
| | 55-59 ans | 238 | 124 | 114 | 19 | 12 | 105 | 102 |
| | 60-64 ans | 282 | 143 | 139 | 13 | 13 | 130 | 126 |
| | 65-69 ans | 356 | 209 | 147 | 21 | 7 | 188 | 140 |
| | 70-74 ans | 275 | 135 | 140 | 13 | 8 | 122 | 132 |
| | 50-74 ans | 1 335 | 692 | 643 | 118 | 92 | 574 | 551 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 178 | 76 | 102 | 48 | 52 | 28 | 50 |
| | 55-59 ans | 236 | 123 | 113 | 19 | 12 | 104 | 101 |
| | 60-64 ans | 271 | 135 | 136 | 12 | 13 | 123 | 123 |
| | 65-69 ans | 338 | 202 | 136 | 19 | 7 | 183 | 129 |
| | 70-74 ans | 261 | 124 | 137 | 12 | 8 | 112 | 129 |
| | 50-74 ans | 1 284 | 660 | 624 | 110 | 92 | 550 | 532 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 21 | 13 | 8 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 183 | 80 | 103 | 51 | 52 | 29 | 51 |
| | 55-59 ans | 238 | 124 | 114 | 19 | 12 | 105 | 102 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|--------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 60-64 ans | 278 | 140 | 138 | 13 | 13 | 127 | 125 |
| 65-69 ans | 353 | 209 | 144 | 21 | 7 | 188 | 137 |
| 70-74 ans | 269 | 131 | 138 | 13 | 8 | 118 | 130 |
| 50-74 ans | 1 321 | 684 | 637 | 117 | 92 | 567 | 545 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 50-74 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 184 | 81 | 103 | 52 | 52 | 29 | 51 |
| 55-59 ans | 238 | 124 | 114 | 19 | 12 | 105 | 102 |
| 60-64 ans | 281 | 142 | 139 | 13 | 13 | 129 | 126 |
| 65-69 ans | 354 | 209 | 145 | 21 | 7 | 188 | 138 |
| 70-74 ans | 275 | 135 | 140 | 13 | 8 | 122 | 132 |
| 50-74 ans | 1 332 | 691 | 641 | 118 | 92 | 573 | 549 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 185 | 81 | 104 | 52 | 52 | 29 | 52 |
| 55-59 ans | 239 | 124 | 115 | 19 | 12 | 105 | 103 |
| 60-64 ans | 282 | 143 | 139 | 13 | 13 | 130 | 126 |
| 65-69 ans | 358 | 210 | 148 | 22 | 7 | 188 | 141 |
| 70-74 ans | 276 | 136 | 140 | 14 | 8 | 122 | 132 |
| 50-74 ans | 1 340 | 694 | 646 | 120 | 92 | 574 | 554 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | |
| 50-54 ans | 74 | 27 | 47 | 23 | 26 | 4 | 21 |
| 55-59 ans | 81 | 29 | 52 | 5 | 3 | 24 | 49 |
| 60-64 ans | 83 | 25 | 58 | 3 | 4 | 22 | 54 |
| 65-69 ans | 96 | 44 | 52 | 6 | 2 | 38 | 50 |
| 70-74 ans | 91 | 37 | 54 | 3 | 4 | 34 | 50 |
| 50-74 ans | 425 | 162 | 263 | 40 | 39 | 122 | 224 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | | |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 16 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 55-59 ans | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 60-64 ans | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
| 65-69 ans | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
| 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 50-74 ans | 70 | 39 | 31 | 6 | 5 | 33 | 26 | |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 24 | 13 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | |
| 55-59 ans | 38 | 22 | 16 | 1 | 2 | 21 | 14 | |
| 60-64 ans | 46 | 23 | 23 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
| 65-69 ans | 55 | 31 | 24 | 3 | 0 | 28 | 24 | |
| 70-74 ans | 55 | 27 | 28 | 1 | 1 | 26 | 27 | |
| 50-74 ans | 218 | 116 | 102 | 15 | 9 | 101 | 93 | |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 58 | 31 | 27 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
| 55-59 ans | 87 | 53 | 34 | 10 | 3 | 43 | 31 | |
| 60-64 ans | 109 | 69 | 40 | 5 | 5 | 64 | 35 | |
| 65-69 ans | 145 | 103 | 42 | 7 | 3 | 96 | 39 | |
| 70-74 ans | 96 | 51 | 45 | 7 | 1 | 44 | 44 | |
| 50-74 ans | 495 | 307 | 188 | 47 | 28 | 260 | 160 | |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 55-59 ans | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 60-64 ans | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 65-69 ans | 41 | 21 | 20 | 4 | 2 | 17 | 18 | |
| 70-74 ans | 23 | 15 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 | |
| 50-74 ans | 111 | 61 | 50 | 7 | 8 | 54 | 42 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 82 | 44 | 38 | 25 | 19 | 19 | 19 |
| | 55-59 ans | 125 | 75 | 50 | 11 | 5 | 64 | 45 |
| | 60-64 ans | 155 | 92 | 63 | 8 | 8 | 84 | 55 |
| | 65-69 ans | 200 | 134 | 66 | 10 | 3 | 124 | 63 |
| | 70-74 ans | 151 | 78 | 73 | 8 | 2 | 70 | 71 |
| | 50-74 ans | 713 | 423 | 290 | 62 | 37 | 361 | 253 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 58 | 31 | 27 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| | 55-59 ans | 87 | 53 | 34 | 10 | 3 | 43 | 31 |
| | 60-64 ans | 109 | 69 | 40 | 5 | 5 | 64 | 35 |
| | 65-69 ans | 145 | 103 | 42 | 7 | 3 | 96 | 39 |
| | 70-74 ans | 96 | 51 | 45 | 7 | 1 | 44 | 44 |
| | 50-74 ans | 495 | 307 | 188 | 47 | 28 | 260 | 160 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 40 | 25 | 15 | 16 | 9 | 9 | 6 |
| | 55-59 ans | 69 | 39 | 30 | 9 | 3 | 30 | 27 |
| | 60-64 ans | 93 | 61 | 32 | 5 | 5 | 56 | 27 |
| | 65-69 ans | 112 | 79 | 33 | 6 | 3 | 73 | 30 |
| | 70-74 ans | 74 | 40 | 34 | 5 | 0 | 35 | 34 |
| | 50-74 ans | 388 | 244 | 144 | 41 | 20 | 203 | 124 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 44 | 28 | 16 | 16 | 10 | 12 | 6 |
| | 55-59 ans | 80 | 50 | 30 | 9 | 3 | 41 | 27 |
| | 60-64 ans | 101 | 64 | 37 | 5 | 5 | 59 | 32 |
| | 65-69 ans | 137 | 99 | 38 | 6 | 3 | 93 | 35 |
| | 70-74 ans | 96 | 52 | 44 | 8 | 1 | 44 | 43 |
| | 50-74 ans | 458 | 293 | 165 | 44 | 22 | 249 | 143 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| | 65-69 ans | 41 | 21 | 20 | 4 | 2 | 17 | 18 |
| | 70-74 ans | 23 | 15 | 8 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| | 50-74 ans | 112 | 62 | 50 | 8 | 8 | 54 | 42 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| | 65-69 ans | 38 | 19 | 19 | 4 | 1 | 15 | 18 |
| | 70-74 ans | 20 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| | 50-74 ans | 102 | 55 | 47 | 7 | 7 | 48 | 40 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 65-69 ans | 36 | 19 | 17 | 4 | 1 | 15 | 16 |
| 70-74 ans | 18 | 11 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 50-74 ans | 96 | 53 | 43 | 7 | 6 | 46 | 37 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 55-59 ans | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 65-69 ans | 24 | 13 | 11 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 70-74 ans | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 50-74 ans | 65 | 34 | 31 | 5 | 4 | 29 | 27 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 60-64 ans | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 65-69 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 50-74 ans | 31 | 19 | 12 | 2 | 2 | 17 | 10 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 65-69 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50-74 ans | 32 | 15 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50-74 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | | | | | | | |
| 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50-74 ans | 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 38 - Isère

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| | 65-69 ans | 34 | 16 | 18 | 3 | 1 | 13 | 17 |
| | 70-74 ans | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| | 50-74 ans | 92 | 48 | 44 | 5 | 6 | 43 | 38 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| | 70-74 ans | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| | 50-74 ans | 54 | 33 | 21 | 18 | 9 | 15 | 12 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3 | 2,5 | 3,3 | 3 | 3,5 | 1,7 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 2,7 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 3,6 | 5,7 | 3,3 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 4,9 | 5,1 | 5,5 |
| | 50-74 ans | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 4 | 3,4 | 3,9 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0 | 0,2 |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 2,9 | 0,2 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 0,7 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 79,8 | 81,8 | 78,6 | 76,3 | 70,4 | 100 | 92 |
| | 55-59 ans | 84,2 | 85,7 | 83,3 | 93,8 | 65,2 | 83,8 | 86,8 |
| | 60-64 ans | 84,2 | 89,4 | 81 | 66,7 | 57,9 | 92,4 | 83,9 |
| | 65-69 ans | 87 | 91,6 | 84 | 66,7 | 25 | 93,9 | 87 |
| | 70-74 ans | 71,9 | 69,9 | 73,4 | 44,4 | 66,7 | 71,9 | 73,6 |
| | 50-74 ans | 81,2 | 83,2 | 80 | 74,3 | 65 | 85,6 | 83,2 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 4,6 | 3,2 | 5,4 | 3 | 4,5 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 4,1 | 5 | 3,4 | 4,9 | 4,6 | 5 | 3,3 |
| | 65-69 ans | 5,2 | 7,1 | 3,7 | 10,7 | 4 | 6,8 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 5,7 | 6,4 | 5,2 | 13,4 | 6,6 | 6 | 5,1 |
| | 50-74 ans | 4,3 | 5,2 | 3,6 | 4,8 | 3,1 | 5,4 | 3,7 |
| 50-74 ans ** | 4,2 | 4,9 | 3,5 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 97,1 | 95,8 | 98,2 | 95,3 | 98,3 | 96,8 | 98,1 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 100 | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 98,2 |
| | 60-64 ans | 98,7 | 97,5 | 100 | 93,8 | 100 | 97,9 | 100 |
| | 65-69 ans | 97,7 | 97,4 | 98,1 | 92,6 | 87,5 | 98 | 98,7 |
| | 70-74 ans | 96,1 | 96,7 | 95,5 | 89,5 | 100 | 97,7 | 95,3 |
| | 50-74 ans | 97,8 | 97,5 | 98 | 94,6 | 98,1 | 98,2 | 98 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 91,1 | 89 | 92,8 | 85,2 | 88,1 | 96,7 | 98,1 |
| | 55-59 ans | 91,9 | 93,2 | 90,5 | 86,4 | 80 | 94,6 | 91,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 94 | 93,5 | 94,6 | 86,7 | 86,7 | 94,2 | 95,5 |
| | 65-69 ans | 94,2 | 93,3 | 95,5 | 84 | 100 | 94,5 | 95,2 |
| | 70-74 ans | 93,2 | 93,1 | 93,3 | 76,5 | 100 | 95,3 | 93 |
| | 50-74 ans | 93,1 | 92,8 | 93,5 | 84,3 | 88,5 | 94,7 | 94,3 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 96,7 | 93,8 | 99 | 92,3 | 100 | 96,6 | 98 |
| | 55-59 ans | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| | 60-64 ans | 96,1 | 94,4 | 97,8 | 92,3 | 100 | 94,6 | 97,6 |
| | 65-69 ans | 94,9 | 96,7 | 92,5 | 90,5 | 100 | 97,3 | 92,1 |
| | 70-74 ans | 94,9 | 91,9 | 97,9 | 92,3 | 100 | 91,8 | 97,7 |
| | 50-74 ans | 96,2 | 95,4 | 97 | 93,2 | 100 | 95,8 | 96,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 3 (2-4) | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-4) |
| | 55-59 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 60-64 ans | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 65-69 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| | 70-74 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 3 (2-5) | 3 (2-6) | 3 (2-6) | 2 (2-4) | 3 (2-4) |
| | 50-74 ans | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-5) | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-4) | 2 (2-4) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 94 | 102 | 88 | 122 | 89 | 68 | 87 |
| | 55-59 ans | 86 | 93 | 80 | 82 | 83 | 94 | 79 |
| | 60-64 ans | 82 | 85 | 79 | 91 | 75 | 85 | 80 |
| | 65-69 ans | 84 | 82 | 87 | 81 | 123 | 82 | 86 |
| | 70-74 ans | 84 | 82 | 86 | 89 | 109 | 81 | 85 |
| | 50-74 ans | 86 | 87 | 84 | 101 | 91 | 84 | 83 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 71 (44,5-104,5) | 72 (48-108) | 71 (43-102) | 77 (57,5-135) | 71,5 (44,5-108,5) | 55 (35-84) | 70 (42-101) |
| | 55-59 ans | 64,5 (45-99) | 63,5 (44-105,5) | 66,5 (46-96) | 61 (45-82) | 48,5 (41-69,5) | 67 (44-107) | 70,5 (46-96) |
| | 60-64 ans | 60,5 (42-92) | 64 (41-96) | 58 (42-88) | 52 (45-66) | 45 (33-100) | 66 (41-96) | 59 (43-88) |
| | 65-69 ans | 69 (48-98,5) | 69 (48-97) | 69 (48-99) | 67 (54-97) | 99 (84-178) | 69 (47,5-98) | 68 (47,5-97) |
| | 70-74 ans | 66 (47-97) | 66 (45-95) | 66,5 (48-98,5) | 71 (55-95) | 68,5 (33-147) | 65 (44-95) | 66,5 (48-98,5) |
| | 50-74 ans | 66 (45-97) | 66 (45-98) | 65 (45-97) | 66,5 (52-108) | 67,5 (40-104,5) | 66 (44-96) | 65 (46-96) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 6,3 | 8,4 | 4,4 | 10,9 | 8,3 | 3,2 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 55-59 ans | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 9,1 | 20 | 3,6 | 1,8 |
| 60-64 ans | 2,3 | 2,5 | 2 | 12,5 | 6,7 | 1,4 | 1,5 |
| 65-69 ans | 2,8 | 4,3 | 0,6 | 14,8 | 0 | 3 | 0,7 |
| 70-74 ans | 3,9 | 3,3 | 4,5 | 15,8 | 0 | 1,5 | 4,7 |
| 50-74 ans | 3,7 | 4,3 | 3 | 12,2 | 8,5 | 2,4 | 2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60-64 ans | 99,6 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 99,2 | 100 |
| 65-69 ans | 99,4 | 100 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 98,6 |
| 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50-74 ans | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 100 | 100 | 99,8 | 99,6 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | |
| 50-54 ans | 40 | 33,3 | 45,2 | 44,2 | 50 | 13,8 | 40,4 |
| 55-59 ans | 33,9 | 23,4 | 45,2 | 26,3 | 25 | 22,9 | 47,6 |
| 60-64 ans | 29,4 | 17,5 | 41,7 | 23,1 | 30,8 | 16,9 | 42,9 |
| 65-69 ans | 26,8 | 21 | 35,1 | 27,3 | 28,6 | 20,2 | 35,5 |
| 70-74 ans | 33 | 27,2 | 38,6 | 21,4 | 50 | 27,9 | 37,9 |
| 50-74 ans | 31,7 | 23,3 | 40,7 | 33,3 | 42,4 | 21,3 | 40,4 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | | | | | | | |
| 50-54 ans | 8,6 | 7,4 | 9,6 | 3,8 | 5,8 | 13,8 | 13,5 |
| 55-59 ans | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,3 | 8,3 | 6,7 | 2,9 |
| 60-64 ans | 6 | 7 | 5 | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 4,8 |
| 65-69 ans | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 0 | 4,8 | 4,3 |
| 70-74 ans | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 7,1 | 0 | 3,3 | 3 |
| 50-74 ans | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 5 | 5,4 | 5,7 | 4,7 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,9 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 0,4 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 65-69 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 ans | 0,4 | 0,7 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 0 | 0,2 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | |
| 50-54 ans | 13 | 16 | 10,6 | 13,5 | 5,8 | 20,7 | 15,4 |
| 55-59 ans | 15,9 | 17,7 | 13,9 | 5,3 | 16,7 | 20 | 13,6 |
| 60-64 ans | 16,3 | 16,1 | 16,5 | 23,1 | 23,1 | 15,4 | 15,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 15,4 | 14,8 | 16,2 | 13,6 | 0 | 14,9 | 17 |
| | 70-74 ans | 19,9 | 19,9 | 20 | 7,1 | 12,5 | 21,3 | 20,5 |
| | 50-74 ans | 16,3 | 16,7 | 15,8 | 12,5 | 9,8 | 17,6 | 16,8 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 31,4 | 38,3 | 26 | 34,6 | 30,8 | 44,8 | 21,2 |
| | 55-59 ans | 36,4 | 42,7 | 29,6 | 52,6 | 25 | 41 | 30,1 |
| | 60-64 ans | 38,7 | 48,3 | 28,8 | 38,5 | 38,5 | 49,2 | 27,8 |
| | 65-69 ans | 40,5 | 49 | 28,4 | 31,8 | 42,9 | 51,1 | 27,7 |
| | 70-74 ans | 34,8 | 37,5 | 32,1 | 50 | 12,5 | 36,1 | 33,3 |
| | 50-74 ans | 36,9 | 44,2 | 29,1 | 39,2 | 30,4 | 45,3 | 28,9 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,3 | 2,5 | 5,8 | 0 | 3,8 | 6,9 | 7,7 |
| | 55-59 ans | 7,1 | 7,3 | 7 | 10,5 | 16,7 | 6,7 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 9,8 | 5,8 | 0 | 0 | 10,8 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 10 | 13,5 | 18,2 | 28,6 | 9 | 12,8 |
| | 70-74 ans | 8,3 | 11 | 5,7 | 7,1 | 25 | 11,5 | 4,5 |
| | 50-74 ans | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 5,8 | 8,7 | 9,4 | 7,6 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,6 | 2,5 | 1 | 3,8 | 1,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,4 | 0,9 | 0 | 8,3 | 2,9 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 7,7 | 0 | 0 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 11,9 | 14,6 | 9,8 | 12,9 | 8,4 | 17,7 | |
| | 55-59 ans | 18,1 | 26,1 | 12,4 | 26,8 | 10,1 | 26 | |
| | 60-64 ans | 20,8 | 29,5 | 14,6 | 24,6 | 24,6 | 30 | |
| | 65-69 ans | 26,8 | 41,3 | 15,7 | 39,7 | 15,1 | 41,5 | |
| | 70-74 ans | 28,1 | 33,4 | 24 | 56,3 | 16,5 | 31,9 | |
| | 50-74 ans | 20,9 | 29 | 14,9 | 20,2 | 10,9 | 31,4 | |
| | 50-74 ans ** | 20,6 | 27,2 | 14,5 | - | - | - | |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 8,4 | 10,3 | 6,9 | 9,3 | 7,1 | 12,1 | |
| | 55-59 ans | 12,6 | 18,5 | 8,4 | 24,4 | 6,1 | 17,5 | |
| | 60-64 ans | 14,6 | 22,1 | 9,2 | 15,4 | 15,4 | 22,9 | |
| | 65-69 ans | 19,5 | 31,8 | 10 | 27,8 | 15,1 | 32,1 | |
| | 70-74 ans | 17,8 | 21,8 | 14,8 | 49,3 | 8,3 | 20,1 | |
| | 50-74 ans | 14,5 | 21,1 | 9,6 | 15,3 | 8,2 | 22,6 | |
| | 50-74 ans ** | 14,3 | 19,6 | 9,4 | - | - | - | |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 8,3 | 3,9 | 8,2 | 4 | 8,4 | |
| | 55-59 ans | 10 | 13,6 | 7,4 | 22 | 6,1 | 12,2 | |
| | 60-64 ans | 12,5 | 19,5 | 7,4 | 15,4 | 15,4 | 20 | |
| | 65-69 ans | 15 | 24,4 | 7,8 | 23,8 | 15,1 | 24,4 | |
| | 70-74 ans | 13,7 | 17,1 | 11,2 | 35,2 | 0 | 16 | |
| | 50-74 ans | 11,4 | 16,7 | 7,4 | 13,4 | 5,9 | 17,6 | |
| | 50-74 ans ** | 11,2 | 15,6 | 7,2 | - | - | - | |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 9,3 | 4,1 | 8,2 | 4,4 | 11,2 | |
| | 55-59 ans | 11,6 | 17,4 | 7,4 | 22 | 6,1 | 16,7 | |
| | 60-64 ans | 13,6 | 20,5 | 8,5 | 15,4 | 15,4 | 21,1 | |
| | 65-69 ans | 18,4 | 30,5 | 9 | 23,8 | 15,1 | 31,1 | |
| | 70-74 ans | 17,8 | 22,3 | 14,4 | 56,3 | 8,3 | 20,1 | |
| | 50-74 ans | 13,4 | 20,1 | 8,5 | 14,3 | 6,5 | 21,6 | |
| | 50-74 ans ** | 13,2 | 18,6 | 8,2 | - | - | - | |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,3 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 38 - Isère

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,1 | 2 | 4,9 | 4 | 2,8 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 3 | 4,5 | 1,8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 6,5 | 4,7 | 15,9 | 10,1 | 5,7 | 4,5 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 6,4 | 2,6 | 7 | 16,5 | 6,4 | 2 |
| | 50-74 ans | 3,3 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 4,7 | 2,6 |
| | 50-74 ans ** | 3,1 | 3,8 | 2,4 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 11,1 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 0 | 12,5 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| | 70-74 ans | 10 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 0 |
| | 50-74 ans | 5,9 | 3,6 | 8,5 | 0 | 14,3 | 4,2 | 7,5 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)