

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 1 456 | 657 | 799 | 404 | 479 | 253 | 320 |
| | 55-59 ans | 1 711 | 747 | 964 | 99 | 108 | 648 | 856 |
| | 60-64 ans | 1 981 | 851 | 1 130 | 98 | 104 | 753 | 1 026 |
| | 65-69 ans | 2 367 | 1 045 | 1 322 | 72 | 75 | 973 | 1 247 |
| | 70-74 ans | 1 762 | 788 | 974 | 35 | 50 | 753 | 924 |
| | 50-74 ans | 9 277 | 4 088 | 5 189 | 708 | 816 | 3 380 | 4 373 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 56 | 33 | 23 | 27 | 14 | 6 | 9 |
| | 55-59 ans | 61 | 27 | 34 | 2 | 5 | 25 | 29 |
| | 60-64 ans | 78 | 38 | 40 | 0 | 7 | 38 | 33 |
| | 65-69 ans | 91 | 38 | 53 | 1 | 3 | 37 | 50 |
| | 70-74 ans | 83 | 32 | 51 | 1 | 1 | 31 | 50 |
| | 50-74 ans | 369 | 168 | 201 | 31 | 30 | 137 | 171 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 48 | 31 | 17 | 25 | 8 | 6 | 9 |
| | 55-59 ans | 44 | 22 | 22 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| | 60-64 ans | 63 | 29 | 34 | 0 | 4 | 29 | 30 |
| | 65-69 ans | 80 | 33 | 47 | 1 | 2 | 32 | 45 |
| | 70-74 ans | 63 | 26 | 37 | 1 | 1 | 25 | 36 |
| | 50-74 ans | 298 | 141 | 157 | 28 | 16 | 113 | 141 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 17 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| | 65-69 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| | 50-74 ans | 71 | 27 | 44 | 3 | 14 | 24 | 30 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 1 448 | 655 | 793 | 402 | 473 | 253 | 320 |
| | 55-59 ans | 1 694 | 742 | 952 | 98 | 104 | 644 | 848 |
| | 60-64 ans | 1 966 | 842 | 1 124 | 98 | 101 | 744 | 1 023 |
| | 65-69 ans | 2 356 | 1 040 | 1 316 | 72 | 74 | 968 | 1 242 |
| | 70-74 ans | 1 742 | 782 | 960 | 35 | 50 | 747 | 910 |
| | 50-74 ans | 9 206 | 4 061 | 5 145 | 705 | 802 | 3 356 | 4 343 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 40 | 19 | 21 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| | 55-59 ans | 67 | 40 | 27 | 8 | 4 | 32 | 23 |
| | 60-64 ans | 77 | 40 | 37 | 7 | 5 | 33 | 32 |
| | 65-69 ans | 116 | 69 | 47 | 6 | 3 | 63 | 44 |
| | 70-74 ans | 106 | 59 | 47 | 3 | 7 | 56 | 40 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 50-74 ans | 406 | 227 | 179 | 33 | 32 | 194 | 147 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 40 | 19 | 21 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| | 55-59 ans | 66 | 40 | 26 | 8 | 4 | 32 | 22 |
| | 60-64 ans | 77 | 40 | 37 | 7 | 5 | 33 | 32 |
| | 65-69 ans | 114 | 68 | 46 | 6 | 3 | 62 | 43 |
| | 70-74 ans | 103 | 57 | 46 | 3 | 6 | 54 | 40 |
| | 50-74 ans | 400 | 224 | 176 | 33 | 31 | 191 | 145 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 36 | 18 | 18 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| | 55-59 ans | 57 | 35 | 22 | 6 | 3 | 29 | 19 |
| | 60-64 ans | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 27 | 25 |
| | 65-69 ans | 104 | 60 | 44 | 4 | 3 | 56 | 41 |
| | 70-74 ans | 92 | 52 | 40 | 3 | 5 | 49 | 35 |
| | 50-74 ans | 352 | 198 | 154 | 27 | 27 | 171 | 127 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 30 | 15 | 15 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| | 55-59 ans | 49 | 29 | 20 | 5 | 2 | 24 | 18 |
| | 60-64 ans | 46 | 22 | 24 | 5 | 5 | 17 | 19 |
| | 65-69 ans | 80 | 41 | 39 | 3 | 3 | 38 | 36 |
| | 70-74 ans | 70 | 39 | 31 | 2 | 4 | 37 | 27 |
| | 50-74 ans | 275 | 146 | 129 | 22 | 23 | 124 | 106 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 36 | 18 | 18 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| | 55-59 ans | 56 | 34 | 22 | 6 | 3 | 28 | 19 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 60-64 ans | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 27 | 25 |
| 65-69 ans | 103 | 59 | 44 | 4 | 3 | 55 | 41 |
| 70-74 ans | 91 | 52 | 39 | 3 | 4 | 49 | 35 |
| 50-74 ans | 349 | 196 | 153 | 27 | 26 | 169 | 127 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 33 | 16 | 17 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 55-59 ans | 57 | 35 | 22 | 6 | 3 | 29 | 19 |
| 60-64 ans | 60 | 32 | 28 | 6 | 5 | 26 | 23 |
| 65-69 ans | 102 | 58 | 44 | 4 | 3 | 54 | 41 |
| 70-74 ans | 87 | 51 | 36 | 3 | 5 | 48 | 31 |
| 50-74 ans | 339 | 192 | 147 | 26 | 26 | 166 | 121 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 36 | 18 | 18 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| 55-59 ans | 58 | 35 | 23 | 6 | 3 | 29 | 20 |
| 60-64 ans | 63 | 33 | 30 | 6 | 5 | 27 | 25 |
| 65-69 ans | 106 | 61 | 45 | 4 | 3 | 57 | 42 |
| 70-74 ans | 92 | 52 | 40 | 3 | 5 | 49 | 35 |
| 50-74 ans | 355 | 199 | 156 | 27 | 27 | 172 | 129 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | |
| 50-54 ans | 13 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 55-59 ans | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 60-64 ans | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 65-69 ans | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 70-74 ans | 20 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 50-74 ans | 90 | 38 | 52 | 7 | 12 | 31 | 40 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | | |
|---|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 50-74 ans | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 55-59 ans | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 60-64 ans | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 65-69 ans | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 15 | 8 | |
| 70-74 ans | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
| 50-74 ans | 81 | 46 | 35 | 8 | 5 | 38 | 30 | |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 55-59 ans | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
| 60-64 ans | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 65-69 ans | 39 | 25 | 14 | 1 | 2 | 24 | 12 | |
| 70-74 ans | 26 | 14 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12 | |
| 50-74 ans | 118 | 72 | 46 | 10 | 6 | 62 | 40 | |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 70-74 ans | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 50-74 ans | 26 | 18 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 50-74 ans | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 34 | 22 | 12 | 3 | 2 | 19 | 10 |
| | 60-64 ans | 37 | 20 | 17 | 4 | 2 | 16 | 15 |
| | 65-69 ans | 64 | 42 | 22 | 3 | 2 | 39 | 20 |
| | 70-74 ans | 48 | 26 | 22 | 2 | 1 | 24 | 21 |
| | 50-74 ans | 200 | 119 | 81 | 18 | 11 | 101 | 70 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| | 55-59 ans | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| | 60-64 ans | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| | 65-69 ans | 39 | 25 | 14 | 1 | 2 | 24 | 12 |
| | 70-74 ans | 26 | 14 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| | 50-74 ans | 118 | 72 | 46 | 10 | 6 | 62 | 40 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| | 60-64 ans | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| | 65-69 ans | 29 | 17 | 12 | 0 | 2 | 17 | 10 |
| | 70-74 ans | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| | 50-74 ans | 92 | 55 | 37 | 9 | 4 | 46 | 33 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| | 60-64 ans | 24 | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| | 65-69 ans | 37 | 24 | 13 | 1 | 2 | 23 | 11 |
| | 70-74 ans | 32 | 18 | 14 | 1 | 1 | 17 | 13 |
| | 50-74 ans | 126 | 76 | 50 | 10 | 7 | 66 | 43 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| | 50-74 ans | 26 | 18 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | 50-74 ans | 25 | 18 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | 50-74 ans | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 39 - Jura

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 65-69 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 50-74 ans | 20 | 14 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 39 - Jura

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,8 | 5 | 2,9 | 6,7 | 2,9 | 2,4 | 2,8 |
| | 55-59 ans | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 2 | 4,6 | 3,9 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 0 | 6,7 | 5 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 3,6 | 4 | 1,4 | 4 | 3,8 | 4 |
| | 70-74 ans | 4,7 | 4,1 | 5,2 | 2,9 | 2 | 4,1 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 4 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0,7 | 1,2 | 1 | 3,7 | 0,6 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0 | 2,9 | 1,2 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,3 | 0,5 | 0,4 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,7 | 0,7 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 85,7 | 93,9 | 73,9 | 92,6 | 57,1 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 72,1 | 81,5 | 64,7 | 50 | 20 | 84 | 72,4 |
| | 60-64 ans | 80,8 | 76,3 | 85 | 0 | 57,1 | 76,3 | 90,9 |
| | 65-69 ans | 87,9 | 86,8 | 88,7 | 100 | 66,7 | 86,5 | 90 |
| | 70-74 ans | 75,9 | 81,3 | 72,5 | 100 | 100 | 80,6 | 72 |
| | 50-74 ans | 80,8 | 83,9 | 78,1 | 90,3 | 53,3 | 82,5 | 82,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 4 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 4 | 5,4 | 2,8 | 8,2 | 3,8 | 5 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 3,9 | 4,8 | 3,3 | 7,1 | 5 | 4,4 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 6,6 | 3,6 | 8,3 | 4,1 | 6,5 | 3,5 |
| | 70-74 ans | 6,1 | 7,5 | 4,9 | 8,6 | 14 | 7,5 | 4,4 |
| | 50-74 ans | 4,4 | 5,6 | 3,5 | 4,7 | 4 | 5,8 | 3,4 |
| 50-74 ans ** | 4,2 | 5,1 | 3,3 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,5 | 100 | 96,3 | 100 | 100 | 100 | 95,7 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,3 | 98,6 | 97,9 | 100 | 100 | 98,4 | 97,7 |
| | 70-74 ans | 97,2 | 96,6 | 97,9 | 100 | 85,7 | 96,4 | 100 |
| | 50-74 ans | 98,5 | 98,7 | 98,3 | 100 | 96,9 | 98,5 | 98,6 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90 | 94,7 | 85,7 | 88,9 | 84,6 | 100 | 87,5 |
| | 55-59 ans | 86,4 | 87,5 | 84,6 | 75 | 75 | 90,6 | 86,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 39 - Jura

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 81,8 | 82,5 | 81,1 | 85,7 | 100 | 81,8 | 78,1 |
| | 65-69 ans | 91,2 | 88,2 | 95,7 | 66,7 | 100 | 90,3 | 95,3 |
| | 70-74 ans | 89,3 | 91,2 | 87 | 100 | 83,3 | 90,7 | 87,5 |
| | 50-74 ans | 88 | 88,4 | 87,5 | 81,8 | 87,1 | 89,5 | 87,6 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 87,5 | 81,8 | 80 | 85,7 |
| | 55-59 ans | 86 | 82,9 | 90,9 | 83,3 | 66,7 | 82,8 | 94,7 |
| | 60-64 ans | 73 | 66,7 | 80 | 83,3 | 100 | 63 | 76 |
| | 65-69 ans | 76,9 | 68,3 | 88,6 | 75 | 100 | 67,9 | 87,8 |
| | 70-74 ans | 76,1 | 75 | 77,5 | 66,7 | 80 | 75,5 | 77,1 |
| | 50-74 ans | 78,1 | 73,7 | 83,8 | 81,5 | 85,2 | 72,5 | 83,5 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 3 (2-5) | 2 (2-5) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 3 (2-5) | 3 (2-5) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 3 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 102 | 104 | 99 | 89 | 118 | 116 | 73 |
| | 55-59 ans | 95 | 92 | 99 | 107 | 80 | 89 | 101 |
| | 60-64 ans | 94 | 95 | 93 | 89 | 69 | 97 | 98 |
| | 65-69 ans | 99 | 94 | 105 | 111 | 87 | 93 | 106 |
| | 70-74 ans | 93 | 100 | 83 | 76 | 77 | 102 | 84 |
| | 50-74 ans | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 97 | 96 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 83 (74-107) | 89,5 (75-114) | 80 (70-93) | 86 (59-118) | 86,5 (75-117) | 93 (79-107) | 80 (56-83) |
| | 55-59 ans | 74 (65,5-106,5) | 73 (66-107) | 74 (62-97) | 78,5 (69-154) | 79,5 (62-97) | 72 (66-106) | 74 (61-109) |
| | 60-64 ans | 78,5 (62-112) | 74 (62-91) | 82 (61-112) | 81 (68-91) | 73 (59-84) | 74 (59-117) | 82 (61,5-120) |
| | 65-69 ans | 80 (60-104) | 82,5 (61-115) | 77 (58-97) | 104 (84,5-136,5) | 90 (80-92) | 82 (60-109) | 73 (57-98) |
| | 70-74 ans | 79 (63-104) | 80 (68-110) | 78 (56,5-94,5) | 74 (73-80) | 80 (57-84) | 81,5 (67,5-115,5) | 77 (56-95) |
| | 50-74 ans | 80 (62-106) | 80 (66-110) | 80 (60-97) | 82 (73-115) | 80 (66-93) | 79 (63-109) | 78 (59-98) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 39 - Jura

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 2,3 | |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0 | 2,1 | 0 | 14,3 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0 | 1,1 | 0 | 3,1 | 0 | 0,7 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 91,7 | 88,9 | 94,4 | 87,5 | 90,9 | 90 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 95,2 | 97 | 93,3 | 100 | 100 | 96,3 | 92 |
| | 65-69 ans | 98,1 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 96,4 | 100 |
| | 70-74 ans | 94,6 | 98,1 | 90 | 100 | 100 | 98 | 88,6 |
| | 50-74 ans | 96,3 | 97 | 95,5 | 96,3 | 96,3 | 97,1 | 95,3 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 36,1 | 22,2 | 50 | 12,5 | 54,5 | 30 | 42,9 |
| | 55-59 ans | 27,6 | 22,9 | 34,8 | 50 | 33,3 | 17,2 | 35 |
| | 60-64 ans | 23,8 | 15,2 | 33,3 | 33,3 | 60 | 11,1 | 28 |
| | 65-69 ans | 24,5 | 16,4 | 35,6 | 0 | 0 | 17,5 | 38,1 |
| | 70-74 ans | 21,7 | 21,2 | 22,5 | 33,3 | 40 | 20,4 | 20 |
| | 50-74 ans | 25,4 | 19,1 | 33,3 | 25,9 | 44,4 | 18 | 31 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,6 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 8,6 | 4,3 | 0 | 0 | 10,3 | 5 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 3 | 3,3 | 0 | 0 | 3,7 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 3,8 | 7,5 | 0 | 40 | 4,1 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 3,7 | 4 | 3,2 | 0 | 7,4 | 4,7 | 2,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,1 | 5,6 | 16,7 | 12,5 | 9,1 | 0 | 28,6 |
| | 55-59 ans | 29,3 | 25,7 | 34,8 | 16,7 | 66,7 | 27,6 | 30 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 39 - Jura

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 22,2 | 24,2 | 20 | 50 | 20 | 18,5 | 20 |
| | 65-69 ans | 23,6 | 27,9 | 17,8 | 50 | 0 | 26,3 | 19 |
| | 70-74 ans | 22,8 | 21,2 | 25 | 33,3 | 20 | 20,4 | 25,7 |
| | 50-74 ans | 22,8 | 23,1 | 22,4 | 29,6 | 18,5 | 22,1 | 23,3 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 36,1 | 44,4 | 27,8 | 62,5 | 27,3 | 30 | 28,6 |
| | 55-59 ans | 29,3 | 37,1 | 17,4 | 33,3 | 0 | 37,9 | 20 |
| | 60-64 ans | 36,5 | 36,4 | 36,7 | 16,7 | 20 | 40,7 | 40 |
| | 65-69 ans | 36,8 | 41 | 31,1 | 25 | 66,7 | 42,1 | 28,6 |
| | 70-74 ans | 28,3 | 26,9 | 30 | 33,3 | 0 | 26,5 | 34,3 |
| | 50-74 ans | 33,2 | 36,2 | 29,5 | 37 | 22,2 | 36 | 31 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 2,8 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 2,9 | 8,7 | 0 | 0 | 3,4 | 10 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 9,4 | 8,2 | 11,1 | 25 | 33,3 | 7 | 9,5 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 0 | 0 | 14,3 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 7,3 | 9 | 5,1 | 3,7 | 3,7 | 9,9 | 5,4 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| | 70-74 ans | 7,6 | 11,5 | 2,5 | 0 | 0 | 12,2 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0,8 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 8,3 | 11,1 | 5,6 | 12,5 | 9,1 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 3 | 6,7 | 0 | 0 | 3,7 | 8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 39 - Jura

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1,9 | 3,3 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 1,9 | 10 | 0 | 2 | 11,4 |
| | 50-74 ans | 3,7 | 3 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 4,7 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 11,7 | 13,7 | 10,1 | 14,9 | 8,5 | 11,9 |
| | 55-59 ans | 20,1 | 29,6 | 12,6 | 30,6 | 19,2 | 29,5 |
| | 60-64 ans | 18,8 | 23,8 | 15,1 | 40,8 | 19,8 | 21,5 |
| | 65-69 ans | 27,2 | 40,4 | 16,7 | 41,7 | 27 | 40,3 |
| | 70-74 ans | 27,6 | 33,2 | 22,9 | 57,1 | 20 | 32,1 |
| | 50-74 ans | 21,7 | 29,3 | 15,7 | 25,5 | 13,7 | 30,1 |
| | 50-74 ans ** | 20,3 | 26,4 | 14,7 | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9 | 12,2 | 6,3 | 12,4 | 6,3 | 11,9 |
| | 55-59 ans | 10 | 17,5 | 4,2 | 20,4 | 0 | 17,1 |
| | 60-64 ans | 11,7 | 14,3 | 9,8 | 10,2 | 9,9 | 14,8 |
| | 65-69 ans | 16,6 | 24 | 10,6 | 13,9 | 27 | 24,8 |
| | 70-74 ans | 14,9 | 17,9 | 12,5 | 28,6 | 0 | 17,4 |
| | 50-74 ans | 12,8 | 17,7 | 8,9 | 14,2 | 7,5 | 18,5 |
| | 50-74 ans ** | 12,1 | 16,5 | 8,1 | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,9 | 10,7 | 3,8 | 12,4 | 2,1 | 7,9 |
| | 55-59 ans | 8,9 | 14,8 | 4,2 | 20,4 | 0 | 14 |
| | 60-64 ans | 9,2 | 11,9 | 7,1 | 10,2 | 9,9 | 12,1 |
| | 65-69 ans | 12,3 | 16,3 | 9,1 | 0 | 27 | 17,6 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 12,8 | 10,4 | 28,6 | 0 | 12 |
| | 50-74 ans | 10 | 13,5 | 7,2 | 12,8 | 5 | 13,7 |
| | 50-74 ans ** | 9,6 | 13,1 | 6,4 | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 9,7 | 12,2 | 7,6 | 12,4 | 6,3 | 11,9 |
| | 55-59 ans | 11,2 | 18,9 | 5,3 | 20,4 | 0 | 18,6 |
| | 60-64 ans | 12,2 | 14,3 | 10,7 | 10,2 | 9,9 | 14,8 |
| | 65-69 ans | 15,7 | 23,1 | 9,9 | 13,9 | 27 | 23,8 |
| | 70-74 ans | 18,4 | 23 | 14,6 | 28,6 | 20 | 22,8 |
| | 50-74 ans | 13,7 | 18,7 | 9,7 | 14,2 | 8,7 | 19,7 |
| | 50-74 ans ** | 13,1 | 17,4 | 9,1 | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 39 - Jura

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 | 1,6 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 2 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,2 | 4,8 | 3,8 | 13,9 | 13,5 | 4,1 | 3,2 |
| | 70-74 ans | 4,6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9,4 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 4,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 5,1 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,4 | 3,7 | 1,2 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 0 |
| | 50-74 ans | 20 | 11,1 | 42,9 | 0 | 0 | 11,8 | 50 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)