

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 645	3 250	3 395	1 668	1 684	1 582	1 711
	55-59 ans	6 593	3 042	3 551	261	293	2 781	3 258
	60-64 ans	7 023	3 259	3 764	238	214	3 021	3 550
	65-69 ans	6 584	3 134	3 450	205	202	2 929	3 248
	70-74 ans	4 409	2 073	2 336	121	121	1 952	2 215
	50-74 ans	31 254	14 758	16 496	2 493	2 514	12 265	13 982
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	471	234	237	146	134	88	103
	55-59 ans	363	168	195	17	16	151	179
	60-64 ans	369	184	185	14	17	170	168
	65-69 ans	370	171	199	20	17	151	182
	70-74 ans	296	132	164	8	14	124	150
	50-74 ans	1 869	889	980	205	198	684	782
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	187	93	94	48	38	45	56
	55-59 ans	179	84	95	7	7	77	88
	60-64 ans	182	95	87	8	5	87	82
	65-69 ans	204	97	107	6	7	91	100
	70-74 ans	167	77	90	3	7	74	83
	50-74 ans	919	446	473	72	64	374	409
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	284	141	143	98	96	43	47
	55-59 ans	184	84	100	10	9	74	91
	60-64 ans	187	89	98	6	12	83	86
	65-69 ans	166	74	92	14	10	60	82
	70-74 ans	129	55	74	5	7	50	67
	50-74 ans	950	443	507	133	134	310	373
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 361	3 109	3 252	1 570	1 588	1 539	1 664
	55-59 ans	6 409	2 958	3 451	251	284	2 707	3 167
	60-64 ans	6 836	3 170	3 666	232	202	2 938	3 464
	65-69 ans	6 418	3 060	3 358	191	192	2 869	3 166
	70-74 ans	4 280	2 018	2 262	116	114	1 902	2 148
	50-74 ans	30 304	14 315	15 989	2 360	2 380	11 955	13 609
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	194	107	87	54	48	53	39
	55-59 ans	251	155	96	17	13	138	83
	60-64 ans	326	219	107	14	6	205	101

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	389	239	150	8	9	231	141
		70-74 ans	325	195	130	11	5	184	125
		50-74 ans	1 485	915	570	104	81	811	489
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie		50-54 ans	193	107	86	54	48	53	38
		55-59 ans	250	155	95	17	13	138	82
		60-64 ans	320	214	106	14	5	200	101
		65-69 ans	379	235	144	8	8	227	136
		70-74 ans	311	187	124	10	5	177	119
		50-74 ans	1 453	898	555	103	79	795	476
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie		50-54 ans	180	102	78	51	45	51	33
		55-59 ans	232	146	86	15	12	131	74
		60-64 ans	296	197	99	11	5	186	94
		65-69 ans	350	216	134	8	7	208	127
		70-74 ans	281	169	112	8	3	161	109
		50-74 ans	1 339	830	509	93	72	737	437
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète		50-54 ans	177	101	76	51	44	50	32
		55-59 ans	224	141	83	14	10	127	73
		60-64 ans	290	193	97	11	5	182	92
		65-69 ans	340	213	127	8	6	205	121
		70-74 ans	268	162	106	7	2	155	104
		50-74 ans	1 299	810	489	91	67	719	422
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)		50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
		55-59 ans	6	6	0	2	0	4	0
		60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
		65-69 ans	13	7	6	0	1	7	5
		70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
		50-74 ans	37	24	13	3	1	21	12
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)		50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	179	101	78	51	45	50	33
	55-59 ans	229	145	84	15	10	130	74
	60-64 ans	293	196	97	11	5	185	92
	65-69 ans	346	215	131	8	6	207	125
	70-74 ans	277	167	110	8	3	159	107
	50-74 ans	1 324	824	500	93	69	731	431
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	15	6	9	0	3	6	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	180	102	78	51	45	51	33
	55-59 ans	232	146	86	15	12	131	74
	60-64 ans	296	197	99	11	5	186	94
	65-69 ans	350	216	134	8	7	208	127
	70-74 ans	281	169	112	8	3	161	109
	50-74 ans	1 339	830	509	93	72	737	437
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	180	102	78	51	45	51	33
	55-59 ans	233	147	86	16	12	131	74
	60-64 ans	297	198	99	11	5	187	94
	65-69 ans	351	216	135	8	7	208	128
	70-74 ans	284	171	113	8	3	163	110
	50-74 ans	1 345	834	511	94	72	740	439

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	35	47	18	25	17	22
	55-59 ans	68	39	29	7	5	32	24
	60-64 ans	95	47	48	2	2	45	46
	65-69 ans	83	42	41	0	2	42	39
	70-74 ans	76	40	36	2	2	38	34
	50-74 ans	404	203	201	29	36	174	165
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	17	7	10	1	2	6	8
	60-64 ans	28	19	9	0	1	19	8
	65-69 ans	30	17	13	0	1	17	12
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	96	56	40	7	7	49	33
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	22	10	11	6	11	4
	55-59 ans	46	34	12	3	2	31	10
	60-64 ans	51	33	18	2	0	31	18
	65-69 ans	90	62	28	4	0	58	28
	70-74 ans	69	43	26	1	1	42	25
	50-74 ans	288	194	94	21	9	173	85
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	48	35	13	15	9	20	4
	55-59 ans	80	52	28	2	3	50	25
	60-64 ans	94	77	17	6	1	71	16
	65-69 ans	113	74	39	3	2	71	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	94	64	30	4	0	60	30
	50-74 ans	429	302	127	30	15	272	112
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	16	10	6	1	0	9	6
	60-64 ans	21	17	4	1	1	16	3
	65-69 ans	26	15	11	0	2	15	9
	70-74 ans	29	16	13	1	0	15	13
	50-74 ans	95	59	36	4	3	55	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	22	12	10	2	2	10	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	80	57	23	26	15	31	8
	55-59 ans	126	86	40	5	5	81	35
	60-64 ans	145	110	35	8	1	102	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	203	136	67	7	2	129	65
	70-74 ans	163	107	56	5	1	102	55
	50-74 ans	717	496	221	51	24	445	197
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	48	35	13	15	9	20	4
	55-59 ans	80	52	28	2	3	50	25
	60-64 ans	94	77	17	6	1	71	16
	65-69 ans	113	74	39	3	2	71	37
	70-74 ans	94	64	30	4	0	60	30
	50-74 ans	429	302	127	30	15	272	112
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	45	33	12	14	8	19	4
	55-59 ans	70	49	21	2	3	47	18
	60-64 ans	80	67	13	4	0	63	13
	65-69 ans	95	68	27	3	1	65	26
	70-74 ans	85	58	27	4	0	54	27
	50-74 ans	375	275	100	27	12	248	88
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	51	38	13	17	9	21	4
	55-59 ans	83	56	27	2	3	54	24
	60-64 ans	99	80	19	5	1	75	18
	65-69 ans	123	87	36	4	1	83	35
	70-74 ans	104	72	32	4	0	68	32
	50-74 ans	460	333	127	32	14	301	113
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	16	10	6	1	0	9	6
	60-64 ans	21	17	4	1	1	16	3
	65-69 ans	26	15	11	0	2	15	9
	70-74 ans	29	16	13	1	0	15	13
	50-74 ans	95	59	36	4	3	55	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	15	9	6	1	0	8	6
	60-64 ans	19	16	3	1	0	15	3
	65-69 ans	25	15	10	0	1	15	9
	70-74 ans	26	16	10	1	0	15	10
	50-74 ans	87	56	31	3	1	53	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	15	9	6	1	0	8	6
	60-64 ans	19	16	3	1	0	15	3
	65-69 ans	25	15	10	0	1	15	9
	70-74 ans	26	16	10	1	0	15	10
	50-74 ans	87	56	31	3	1	53	30
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	12	7	5	0	0	7	5
	60-64 ans	16	13	3	1	0	12	3
	65-69 ans	19	11	8	0	1	11	7
	70-74 ans	18	9	9	1	0	8	9
	50-74 ans	67	40	27	2	1	38	26
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	50-74 ans	20	16	4	1	0	15	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	7	7	0	0	0	7	0
	65-69 ans	10	5	5	0	0	5	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	37	21	16	0	0	21	16
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	14	8	6	1	0	7	6
	60-64 ans	19	16	3	1	0	15	3
	65-69 ans	25	15	10	0	1	15	9
	70-74 ans	26	16	10	1	0	15	10
	50-74 ans	86	55	31	3	1	52	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	25	14	11	1	1	13	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,2	7	8,8	8	5,6	6
	55-59 ans	5,5	5,5	5,5	6,5	5,5	5,4	5,5
	60-64 ans	5,3	5,6	4,9	5,9	7,9	5,6	4,7
	65-69 ans	5,6	5,5	5,8	9,8	8,4	5,2	5,6
	70-74 ans	6,7	6,4	7	6,6	11,6	6,4	6,8
	50-74 ans	6	6	5,9	8,2	7,9	5,6	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,3	4,3	4,2	5,9	5,7	2,7	2,7
	55-59 ans	2,8	2,8	2,8	3,8	3,1	2,7	2,8
	60-64 ans	2,7	2,7	2,6	2,5	5,6	2,7	2,4
	65-69 ans	2,5	2,4	2,7	6,8	5	2	2,5
	70-74 ans	2,9	2,7	3,2	4,1	5,8	2,6	3
	50-74 ans	3	3	3,1	5,3	5,3	2,5	2,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,7	39,7	39,7	32,9	28,4	51,1	54,4
	55-59 ans	49,3	50	48,7	41,2	43,8	51	49,2
	60-64 ans	49,3	51,6	47	57,1	29,4	51,2	48,8
	65-69 ans	55,1	56,7	53,8	30	41,2	60,3	54,9
	70-74 ans	56,4	58,3	54,9	37,5	50	59,7	55,3
	50-74 ans	49,2	50,2	48,3	35,1	32,3	54,7	52,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,4	2,7	3,4	3	3,4	2,3
	55-59 ans	3,9	5,2	2,8	6,8	4,6	5,1	2,6
	60-64 ans	4,8	6,9	2,9	6	3	7	2,9
	65-69 ans	6,1	7,8	4,5	4,2	4,7	8,1	4,5
	70-74 ans	7,6	9,7	5,7	9,5	4,4	9,7	5,8
	50-74 ans	4,9	6,4	3,6	4,4	3,4	6,8	3,6
	50-74 ans **	4,8	6,1	3,5	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	97,4
	55-59 ans	99,6	100	99	100	100	100	98,8
	60-64 ans	98,2	97,7	99,1	100	83,3	97,6	100
	65-69 ans	97,4	98,3	96	100	88,9	98,3	96,5
	70-74 ans	95,7	95,9	95,4	90,9	100	96,2	95,2
	50-74 ans	97,8	98,1	97,4	99	97,5	98	97,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,3	95,3	90,7	94,4	93,8	96,2	86,8
	55-59 ans	92,8	94,2	90,5	88,2	92,3	94,9	90,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,5	92,1	93,4	78,6	100	93	93,1
	65-69 ans	92,3	91,9	93,1	100	87,5	91,6	93,4
	70-74 ans	90,4	90,4	90,3	80	60	91	91,6
	50-74 ans	92,2	92,4	91,7	90,3	91,1	92,7	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	99	97,4	100	97,8	98	97
	55-59 ans	96,6	96,6	96,5	93,3	83,3	96,9	98,6
	60-64 ans	98	98	98	100	100	97,8	97,9
	65-69 ans	97,1	98,6	94,8	100	85,7	98,6	95,3
	70-74 ans	95,4	95,9	94,6	87,5	66,7	96,3	95,4
	50-74 ans	97	97,6	96,1	97,8	93,1	97,6	96,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	55-59 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	60-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	65-69 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	70-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	50-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	55-59 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	60-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	65-69 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	70-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	50-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	105	84	103	85	108	83
	55-59 ans	81	84	76	83	78	84	76
	60-64 ans	86	90	77	80	87	91	76
	65-69 ans	84	85	84	97	90	84	83
	70-74 ans	84	85	83	83	55	85	84
	50-74 ans	86	88	81	95	83	88	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68,5 (48-103)	74,5 (48-118)	64,5 (48-97)	75 (49-105)	66 (49-100)	74 (48-119)	63 (45-90)
	55-59 ans	65,5 (42-101)	67 (45-103)	61 (37-96)	61 (33-106)	61 (29,5-104,5)	67 (47-103)	61 (39-88)
	60-64 ans	69 (46-92)	72 (50-97)	65 (39-87)	85 (50-109)	80 (33-98)	70,5 (49-96)	63,5 (41-85)
	65-69 ans	67,5 (42-100)	67,5 (46-96)	67,5 (39-112)	61,5 (47,5-83,5)	67 (30-137)	68,5 (46-96)	68 (39-112)
	70-74 ans	69 (49-95)	73 (49-95)	64,5 (48-88,5)	86,5 (39,5-123,5)	57 (47-62)	73 (49-95)	65 (48-89)
	50-74 ans	68 (46-98)	70 (48-98)	65 (43-97)	72 (48-106)	64,5 (47-102)	69 (48-97)	65 (43-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,1	1,9	2,3	1,9	0	1,9	5,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,2	0,6	2,1	0	0	0,7	2,4
60-64 ans	1,2	1,4	0,9	0	0	1,5	1
65-69 ans	2,3	2,5	2	0	11,1	2,6	1,4
70-74 ans	1,5	1	2,3	0	0	1,1	2,4
50-74 ans	1,7	1,5	1,9	1	1,2	1,6	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	45,6	34,3	60,3	35,3	55,6	33,3	66,7
55-59 ans	29,2	26,5	33,7	43,8	41,7	24,4	32,4
60-64 ans	32	23,7	48,5	18,2	40	24,1	48,9
65-69 ans	23,6	19,4	30,4	0	28,6	20,2	30,5
70-74 ans	26,8	23,4	31,9	25	66,7	23,3	30,9
50-74 ans	30	24,3	39,3	30,9	50	23,5	37,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	6,1	7,8	3,8	11,8	6,7	3,9	0
55-59 ans	7,3	4,8	11,6	6,3	16,7	4,6	10,8
60-64 ans	9,4	9,6	9,1	0	20	10,2	8,5
65-69 ans	8,5	7,9	9,6	0	14,3	8,2	9,4
70-74 ans	3,5	2,9	4,4	0	0	3,1	4,5
50-74 ans	7,1	6,7	7,8	7,4	9,7	6,6	7,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,5	0
65-69 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,5	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	17,8	21,6	12,8	21,6	13,3	21,6	12,1
55-59 ans	19,7	23,1	14	18,8	16,7	23,7	13,5
60-64 ans	17,2	16,7	18,2	18,2	0	16,6	19,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25,6	28,7	20,7	50	0	27,9	21,9
	70-74 ans	24,3	25,1	23	12,5	33,3	25,8	22,7
	50-74 ans	21,4	23,3	18,4	22,3	12,5	23,4	19,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,7	34,3	16,7	29,4	20	39,2	12,1
	55-59 ans	34,3	35,4	32,6	12,5	25	38,2	33,8
	60-64 ans	31,6	38,9	17,2	54,5	20	38	17
	65-69 ans	32,2	34,3	28,9	37,5	28,6	34,1	28,9
	70-74 ans	33,1	37,4	26,5	50	0	36,8	27,3
	50-74 ans	31,9	36,2	24,9	31,9	20,8	36,8	25,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	1	2,6	2	0	0	6,1
	55-59 ans	6,9	6,8	7	6,3	0	6,9	8,1
	60-64 ans	7,1	8,6	4	9,1	20	8,6	3,2
	65-69 ans	7,4	6,9	8,1	0	28,6	7,2	7
	70-74 ans	10,2	9,4	11,5	12,5	0	9,2	11,8
	50-74 ans	7,1	7,1	7	4,3	4,2	7,4	7,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	1	3,8	0	4,4	2	3
	55-59 ans	0,9	0,7	1,2	6,3	0	0	1,4
	60-64 ans	2	2	2	0	0	2,1	2,1
	65-69 ans	2	2,3	1,5	12,5	0	1,9	1,6
	70-74 ans	1,1	0,6	1,8	0	0	0,6	1,8
	50-74 ans	1,6	1,4	2	2,1	2,8	1,4	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	2,7	0	6,3	0	2,3	0
	60-64 ans	0,3	0	1	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,7	0,6	0,9	0	0	0,6	0,9
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	1,1	0	0,5	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	18,3	7,1	16,6	9,4	20,1	4,8
	55-59 ans	19,7	29,1	11,6	19,9	17,6	29,9	11,1
	60-64 ans	21,2	34,7	9,5	34,5	5	34,7	9,8
	65-69 ans	31,6	44,4	20	36,6	10,4	45	20,5
	70-74 ans	38,1	53	24,8	43,1	8,8	53,6	25,6
	50-74 ans	23,7	34,6	13,8	21,6	10,1	37,2	14,5
	50-74 ans **	22,8	33,1	13,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,3	4	9,6	5,7	13	2,4
	55-59 ans	12,5	17,6	8,1	8	10,6	18,5	7,9
	60-64 ans	13,8	24,3	4,6	25,9	5	24,2	4,6
	65-69 ans	17,6	24,2	11,6	15,7	10,4	24,7	11,7
	70-74 ans	22	31,7	13,3	34,5	0	31,5	14
	50-74 ans	14,2	21,1	7,9	12,7	6,3	22,8	8,2
	50-74 ans **	13,7	20,3	7,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,6	3,7	8,9	5	12,3	2,4
	55-59 ans	10,9	16,6	6,1	8	10,6	17,4	5,7
	60-64 ans	11,7	21,1	3,5	17,2	0	21,4	3,8
	65-69 ans	14,8	22,2	8	15,7	5,2	22,7	8,2
	70-74 ans	19,9	28,7	11,9	34,5	0	28,4	12,6
	50-74 ans	12,4	19,2	6,3	11,4	5	20,7	6,5
	50-74 ans **	12,1	18,5	6,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8	12,2	4	10,8	5,7	13,6	2,4
	55-59 ans	13	18,9	7,8	8	10,6	19,9	7,6
	60-64 ans	14,5	25,2	5,2	21,6	5	25,5	5,2
	65-69 ans	19,2	28,4	10,7	20,9	5,2	28,9	11,1
	70-74 ans	24,3	35,7	14,1	34,5	0	35,8	14,9
	50-74 ans	15,2	23,3	7,9	13,6	5,9	25,2	8,3
	50-74 ans **	14,7	22,3	7,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,3	0,6	0,6	0	0	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 67 - Bas-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2,5	3,4	1,7	4	0	3,3	1,9	
60-64 ans	3,1	5,4	1,1	4,3	5	5,4	0,9	
65-69 ans	4,1	4,9	3,3	0	10,4	5,2	2,8	
70-74 ans	6,8	7,9	5,7	8,6	0	7,9	6,1	
50-74 ans	3,1	4,1	2,3	1,7	1,3	4,6	2,4	
50-74 ans **	3	3,9	2,2	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

ND: non disponible

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)