Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	57 193	26 854	30 339	15 846	17 290	11 008	13 049
	55-59 ans	51 181	23 260	27 921	3 384	3 741	19 876	24 180
	60-64 ans	58 241	26 062	32 179	3 385	3 699	22 677	28 480
	65-69 ans	54 102	24 077	30 025	2 341	2 475	21 736	27 550
	70-74 ans	37 009	16 465	20 544	1 155	1 298	15 310	19 246
	50-74 ans	257 726	116 718	141 008	26 111	28 503	90 607	112 505
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	2 463	1 208	1 255	781	811	427	444
	55-59 ans	2 096	1 040	1 056	221	219	819	837
	60-64 ans	2 320	1 083	1 237	191	224	892	1 013
	65-69 ans	2 203	990	1 213	156	201	834	1 012
	70-74 ans	1 643	702	941	83	116	619	825
	50-74 ans	10 725	5 023	5 702	1 432	1 571	3 591	4 131
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable	50.54	4 007	00.4	000	5.45	504	0.40	050
suite à un test NA	50-54 ans	1 827	894	933	545	581	349	352
	55-59 ans	1 608	803	805	150	145	653	660
	60-64 ans	1 874	875	999	127	161	748	838
	65-69 ans	1 816	820	996	110	132	710	864
	70-74 ans	1 322	576	746	53	81	523	665
	50-74 ans	8 447	3 968	4 479	985	1 100	2 983	3 379
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	636	314	322	236	230	78	92
	55-59 ans	488	237	251	71	74	166	177
	60-64 ans	446	208	238	64	63	144	175
	65-69 ans	387	170	217	46	69	124	148
	70-74 ans	321	126	195	30	35	96	160
	50-74 ans	2 278	1 055	1 223	447	471	608	752
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test	50.54		00 = 10	0004=	/ = 0.15	4= 000	40.005	40.0==
analysable)	50-54 ans	56 557	26 540	30 017	15 610	17 060	10 930	12 957
	55-59 ans	50 693	23 023	27 670	3 313	3 667	19 710	24 003
	60-64 ans	57 795	25 854	31 941	3 321	3 636	22 533	28 305

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	53 715	23 907	29 808	2 295	2 406	21 612	27 402
	70-74 ans	36 688	16 339	20 349	1 125	1 263	15 214	19 086
	50-74 ans	255 448	115 663	139 785	25 664	28 032	89 999	111 753
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 011	508	503	314	304	194	199
	55-59 ans	924	462	462	90	73	372	389
	60-64 ans	1 228	642	586	113	97	529	489
	65-69 ans	1 207	605	602	95	66	510	536
	70-74 ans	958	484	474	59	33	425	441
	50-74 ans	5 328	2 701	2 627	671	573	2 030	2 054
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour								
la coloscopie	50-54 ans	1 008	506	502	312	304	194	198
	55-59 ans	921	460	461	90	73	370	388
	60-64 ans	1 223	639	584	113	96	526	488
	65-69 ans	1 204	603	601	94	66	509	535
	70-74 ans	950	478	472	59	33	419	439
	50-74 ans	5 306	2 686	2 620	668	572	2 018	2 048
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	926	457	469	284	290	173	179
	55-59 ans	841	420	421	75	66	345	355
	60-64 ans	1 109	580	529	98	86	482	443
	65-69 ans	1 091	549	542	81	58	468	484
	70-74 ans	846	425	421	52	27	373	394
	50-74 ans	4 813	2 431	2 382	590	527	1 841	1 855
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50.54	200	400	450	070	000	407	470
complète	50-54 ans	892	439	453	272	280	167	173
	55-59 ans	803	400	403	70	65	330	338
	60-64 ans	1 055	548	507	89	79	459	428
	65-69 ans	1 039	519	520	76	56	443	464
	70-74 ans	798	397	401	49	26	348	375
	50-74 ans	4 587	2 303	2 284	556	506	1 747	1 778
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou								
à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	917	455	462	282	288	173	174
	55-59 ans	834	416	418	75	65	341	353
	60-64 ans	1 091	573	518	97	80	476	438
	65-69 ans	1 078	544	534	79	57	465	477
	70-74 ans	833	418	415	52	26	366	389
	50-74 ans	4 753	2 406	2 347	585	516	1 821	1 831
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et		_		_	_	_	_	_
une autre exploration colique	50-54 ans	9	2	7	2	2	0	5
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	18	7	11	1	6	6	5
	65-69 ans	13	5	8	2	1	3	7
	70-74 ans	13	7	6	0	1	7	5
	50-74 ans	60	25	35	5	11	20	24
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration	50.54		•	•	•			•
colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	14	10	4	3	1	7	3

Effectifs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,5	4,1	4,9	4,7	3,9	3,4
	55-59 ans	4,1	4,5	3,8	6,5	5,9	4,1	3,5
	60-64 ans	4	4,2	3,8	5,6	6,1	3,9	3,6
	65-69 ans	4,1	4,1	4	6,7	8,1	3,8	3,7
	70-74 ans	4,4	4,3	4,6	7,2	8,9	4	4,3
	50-74 ans	4,2	4,3	4	5,5	5,5	4	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1,1	1,5	1,3	0,7	0,7
	55-59 ans	1	1	0,9	2,1	2	0,8	0,7
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	1,9	1,7	0,6	0,6
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	2	2,8	0,6	0,5
	70-74 ans	0,9	0,8	0,9	2,6	2,7	0,6	0,8
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,7	1,7	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un	50.54	74.0	7.4	74.0	00.0	74.0	04.7	70.0
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,2	74	74,3	69,8	71,6	81,7	79,3
	55-59 ans	76,7	77,2	76,2	67,9	66,2	79,7	78,9
	60-64 ans	80,8	80,8	80,8	66,5	71,9	83,9	82,7
	65-69 ans	82,4	82,8	82,1	70,5	65,7	85,1	85,4
	70-74 ans	80,5	82,1	79,3	63,9	69,8	84,5	80,6
	50-74 ans	78,8	79	78,6	68,8	70	83,1	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1.0	1,9	17	2	1.0	1 0	1 5
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans 55-59 ans	1,8 1,8	1,9	1,7 1,7	2,7	1,8 2	1,8	1,5 1,6
	60-64 ans			•			1,9	
		2,1	2,5	1,8	3,4	2,7	2,3	1,7
	65-69 ans	2,2	2,5	2	4,1	2,7	2,4	2
	70-74 ans	2,6	3	2,3	5,2	2,6	2,8	2,3
	50-74 ans 50-74 ans **	2,1 2,1	2,3 2,3	1,9 1,9	2,6	2	2,3	1,8
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et	50-14 alls	2, 1	2,3	1,9	-	-	-	-
étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,6	99,8	99,4	100	100	99,5

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,7	99,6	99,8	100	100	99,5	99,7
	60-64 ans	99,6	99,5	99,7	100	99	99,4	99,8
	65-69 ans	99,8	99,7	99,8	98,9	100	99,8	99,8
	70-74 ans	99,2	98,8	99,6	100	100	98,6	99,5
	50-74 ans	99,6	99,4	99,7	99,6	99,8	99,4	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la								
coloscopie)	50-54 ans	91,9	90,3	93,4	91	95,4	89,2	90,4
	55-59 ans	91,3	91,3	91,3	83,3	90,4	93,2	91,5
	60-64 ans	90,7	90,8	90,6	86,7	89,6	91,6	90,8
	65-69 ans	90,6	91	90,2	86,2	87,9	91,9	90,5
	70-74 ans	89,1	88,9	89,2	88,1	81,8	89	89,7
	50-74 ans	90,7	90,5	90,9	88,3	92,1	91,2	90,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	96,3	96,1	96,6	95,8	96,6	96,5	96,6
	55-59 ans	95,5	95,2	95,7	93,3	98,5	95,7	95,2
	60-64 ans	95,1	94,5	95,8	90,8	91,9	95,2	96,6
	65-69 ans	95,2	94,5	95,9	93,8	96,6	94,7	95,9
	70-74 ans	94,3	93,4	95,2	94,2	96,3	93,3	95,2
	50-74 ans	95,3	94,7	95,9	94,2	96	94,9	95,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)