Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	61 766	28 216	33 550	16 701	18 828	11 515	14 722
	55-59 ans	57 067	25 096	31 971	4 233	4 984	20 863	26 987
	60-64 ans	64 986	28 343	36 643	4 550	5 104	23 793	31 539
	65-69 ans	57 024	25 273	31 751	3 144	3 616	22 129	28 135
	70-74 ans	38 257	16 766	21 491	1 792	2 183	14 974	19 308
	50-74 ans	279 100	123 694	155 406	30 420	34 715	93 274	120 691
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	4 126	2 017	2 109	1 246	1 299	771	810
	55-59 ans	3 861	1 745	2 116	425	475	1 320	1 641
	60-64 ans	4 240	1 913	2 327	404	422	1 509	1 905
	65-69 ans	3 667	1 598	2 069	296	312	1 302	1 757
	70-74 ans	2 854	1 225	1 629	199	215	1 026	1 414
	50-74 ans	18 748	8 498	10 250	2 570	2 723	5 928	7 527
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable								
suite à un test NA	50-54 ans	2 747	1 350	1 397	759	777	591	620
	55-59 ans	2 740	1 229	1 511	232	259	997	1 252
	60-64 ans	3 235	1 432	1 803	238	272	1 194	1 531
	65-69 ans	2 798	1 218	1 580	172	196	1 046	1 384
	70-74 ans	2 165	961	1 204	122	127	839	1 077
	50-74 ans	13 685	6 190	7 495	1 523	1 631	4 667	5 864
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 379	667	712	487	522	180	190
	55-59 ans	1 121	516	605	193	216	323	389
	60-64 ans	1 005	481	524	166	150	315	374
	65-69 ans	869	380	489	124	116	256	373
	70-74 ans	689	264	425	77	88	187	337
	50-74 ans	5 063	2 308	2 755	1 047	1 092	1 261	1 663
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test								
analysable)	50-54 ans	60 387	27 549	32 838	16 214	18 306	11 335	14 532
	55-59 ans	55 946	24 580	31 366	4 040	4 768	20 540	26 598
	60-64 ans	63 981	27 862	36 119	4 384	4 954	23 478	31 165

Effectifs sur la période 2013-2014	Total			Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	56 155	24 893	31 262	3 020	3 500	21 873	27 762
	70-74 ans	37 568	16 502	21 066	1 715	2 095	14 787	18 971
	50-74 ans	274 037	121 386	152 651	29 373	33 623	92 013	119 028
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 505	778	727	490	436	288	291
	55-59 ans	1 615	881	734	195	149	686	585
	60-64 ans	1 939	1 011	928	214	174	797	754
	65-69 ans	1 780	976	804	144	119	832	685
	70-74 ans	1 347	700	647	96	86	604	561
	50-74 ans	8 186	4 346	3 840	1 139	964	3 207	2 876
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour								
la coloscopie	50-54 ans	1 493	774	719	487	428	287	291
	55-59 ans	1 585	865	720	193	146	672	574
	60-64 ans	1 902	990	912	208	174	782	738
	65-69 ans	1 739	952	787	139	115	813	672
	70-74 ans	1 293	665	628	90	81	575	547
	50-74 ans	8 012	4 246	3 766	1 117	944	3 129	2 822
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 275	649	626	399	372	250	254
	55-59 ans	1 376	749	627	153	124	596	503
	60-64 ans	1 663	857	806	177	151	680	655
	65-69 ans	1 524	837	687	120	100	717	587
	70-74 ans	1 128	588	540	71	73	517	467
	50-74 ans	6 966	3 680	3 286	920	820	2 760	2 466
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie								
complète	50-54 ans	1 192	606	586	378	353	228	233
	55-59 ans	1 292	696	596	142	114	554	482
	60-64 ans	1 534	798	736	165	136	633	600
	65-69 ans	1 416	785	631	113	91	672	540
	70-74 ans	1 024	537	487	67	64	470	423
	50-74 ans	6 458	3 422	3 036	865	758	2 557	2 278
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou								
à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ıbséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	7	4	2	2	5	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	1 253	641	612	393	368	248	244
	55-59 ans	1 357	740	617	151	120	589	497
	60-64 ans	1 629	841	788	172	146	669	642
	65-69 ans	1 494	824	670	119	95	705	575
	70-74 ans	1 097	575	522	70	73	505	449
	50-74 ans	6 830	3 621	3 209	905	802	2 716	2 407
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et			_		_		_	
une autre exploration colique	50-54 ans	22	8	14	6	4	2	10
	55-59 ans	19	9	10	2	4	7	6
	60-64 ans	34	16	18	5	5	11	13
	65-69 ans	30	13	17	1	5	12	12
	70-74 ans	31	13	18	1	0	12	18
	50-74 ans	136	59	77	15	18	44	59
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration				_		_		
colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	11	6	5	3	5	3	0
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	11	6	5	1	0	5	5
	65-69 ans	13	10	3	2	2	8	1
	70-74 ans	18	12	6	1	2	11	4
	50-74 ans	61	38	23	8	9	30	14

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistaç	ge initial <sup>§</sup>	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,1	6,3	7,5	6,9	6,7	5,5
	55-59 ans	6,8	7	6,6	10	9,5	6,3	6,1
	60-64 ans	6,5	6,7	6,4	8,9	8,3	6,3	6
	65-69 ans	6,4	6,3	6,5	9,4	8,6	5,9	6,2
	70-74 ans	7,5	7,3	7,6	11,1	9,8	6,9	7,3
	50-74 ans	6,7	6,9	6,6	8,4	7,8	6,4	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non	50.54	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	4.0	4.0
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2,1	2,9	2,8	1,6	1,3
	55-59 ans	2	2,1	1,9	4,6	4,3	1,5	1,4
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	3,6	2,9	1,3	1,2
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	3,9	3,2	1,2	1,3
	70-74 ans	1,8	1,6	2	4,3	4	1,2	1,7
DOS Decreased and approximate property of air contract areas on	50-74 ans	1,8	1,9	1,8	3,4	3,1	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,6	66,9	66,2	60,9	59,8	76,7	76,5
resultat analysable suite a unitest NA	55-59 ans	71	70,4	71,4	54,6	54,5	75,7 75,5	76,3
	60-64 ans	76,3	70,4 74,9	71, <del>4</del> 77,5	58,9	64,5	79,1	80,4
	65-69 ans	76,3	76,2	76,4	58,1	62,8	80,3	78,8
	70-74 ans	75,9	78,4	73,9	61,3	59,1	81,8	76,2
	50-74 ans	<b>73</b>	70, <del>4</del> <b>72,8</b>	73,9 <b>73,1</b>	<b>59,3</b>	59,9	<b>78,7</b>	77,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les	30-74 ans	73	72,0	73,1	33,3	33,3	70,1	11,3
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	3	2,4	2,5	2
	55-59 ans	2,9	3,6	2,3	4,8	3,1	3,3	2,2
	60-64 ans	3	3,6	2,6	4,9	3,5	3,4	2,4
	65-69 ans	3,2	3,9	2,6	4,8	3,4	3,8	2,5
	70-74 ans	3,6	4,2	3,1	5,6	4,1	4,1	3
	50-74 ans	3	3,6	2,5	3,9	2,9	3,5	2,4
	50-74 ans **	3	3,5	2,5	-	_,-	-	-, -
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et								
étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,5	98,9	99,4	98,2	99,7	100

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,1	98,2	98,1	99	98	98	98,1
	60-64 ans	98,1	97,9	98,3	97,2	100	98,1	97,9
	65-69 ans	97,7	97,5	97,9	96,5	96,6	97,7	98,1
	70-74 ans	96	95	97,1	93,8	94,2	95,2	97,5
	50-74 ans	97,9	97,7	98,1	98,1	97,9	97,6	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la								
coloscopie)	50-54 ans	85,4	83,9	87,1	81,9	86,9	87,1	87,3
	55-59 ans	86,8	86,6	87,1	79,3	84,9	88,7	87,6
	60-64 ans	87,4	86,6	88,4	85,1	86,8	87	88,8
	65-69 ans	87,6	87,9	87,3	86,3	87	88,2	87,4
	70-74 ans	87,2	88,4	86	78,9	90,1	89,9	85,4
	50-74 ans	86,9	86,7	87,3	82,4	86,9	88,2	87,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	93,5	93,4	93,6	94,7	94,9	91,2	91,7
	55-59 ans	93,9	92,9	95,1	92,8	91,9	93	95,8
	60-64 ans	92,2	93,1	91,3	93,2	90,1	93,1	91,6
	65-69 ans	92,9	93,8	91,8	94,2	91	93,7	92
	70-74 ans	90,8	91,3	90,2	94,4	87,7	90,9	90,6
	50-74 ans	92,7	93	92,4	94	92,4	92,6	92,4

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)