

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	36	25	11	18	7	7	4
	55-59 ans	53	37	16	8	3	29	13
	60-64 ans	95	68	27	18	3	50	24
	65-69 ans	75	46	29	10	4	36	25
	70-74 ans	91	54	37	8	5	46	32
	50-74 ans	350	230	120	62	22	168	98
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	11	8	3	5	3	3	0
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	29	22	7	8	0	14	7
	65-69 ans	21	12	9	2	2	10	7
	70-74 ans	28	18	10	3	1	15	9
	50-74 ans	102	69	33	21	6	48	27
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	25	17	8	13	4	4	4
	55-59 ans	40	28	12	5	3	23	9
	60-64 ans	66	46	20	10	3	36	17
	65-69 ans	54	34	20	8	2	26	18
	70-74 ans	63	36	27	5	4	31	23
	50-74 ans	248	161	87	41	16	120	71
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	18	14	4	10	2	4	2
	55-59 ans	29	23	6	2	2	21	4
	60-64 ans	55	39	16	8	2	31	14
	65-69 ans	40	26	14	6	2	20	12
	70-74 ans	58	32	26	5	4	27	22
	50-74 ans	200	134	66	31	12	103	54
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	11	5	6	3	1	2	5
	60-64 ans	11	7	4	2	1	5	3
	65-69 ans	14	8	6	2	0	6	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	48	27	21	10	4	17	17
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	9	0	6	0	3	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	18	12	6	3	0	9	6
	65-69 ans	17	11	6	3	1	8	5
	70-74 ans	23	14	9	2	1	12	8
	50-74 ans	77	54	23	16	2	38	21
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	10	9	1	0	0	9	1
	60-64 ans	14	9	5	2	1	7	4
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	17	7	10	0	2	7	8
	50-74 ans	46	29	17	3	3	26	14
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	7	4	3	0	2	4	1
	60-64 ans	13	10	3	3	1	7	2
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	12	6	6	1	0	5	6
	50-74 ans	50	30	20	8	6	22	14
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	10	8	2	0	0	8	2
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	50-74 ans	27	21	6	4	1	17	5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30,6	32	27,3	27,8	42,9	42,9	0
	55-59 ans	24,5	24,3	25	37,5	0	20,7	30,8
	60-64 ans	30,5	32,4	25,9	44,4	0	28	29,2
	65-69 ans	28	26,1	31	20	50	27,8	28
	70-74 ans	30,8	33,3	27	37,5	20	32,6	28,1
	50-74 ans	29,1	30	27,5	33,9	27,3	28,6	27,6
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	28	17,6	50	23,1	50	0	50
	55-59 ans	27,5	17,9	50	60	33,3	8,7	55,6
	60-64 ans	16,7	15,2	20	20	33,3	13,9	17,6
	65-69 ans	25,9	23,5	30	25	0	23,1	33,3
	70-74 ans	7,9	11,1	3,7	0	0	12,9	4,3
	50-74 ans	19,4	16,8	24,1	24,4	25	14,2	23,9
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	72	82,4	50	76,9	50	100	50
	55-59 ans	72,5	82,1	50	40	66,7	91,3	44,4
	60-64 ans	83,3	84,8	80	80	66,7	86,1	82,4
	65-69 ans	74,1	76,5	70	75	100	76,9	66,7
	70-74 ans	92,1	88,9	96,3	100	100	87,1	95,7
	50-74 ans	80,6	83,2	75,9	75,6	75	85,8	76,1
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	64,3	0	60	0	75	0
	55-59 ans	34,5	34,8	33,3	100	0	28,6	50
	60-64 ans	32,7	30,8	37,5	37,5	0	29	42,9
	65-69 ans	42,5	42,3	42,9	50	50	40	41,7
	70-74 ans	39,7	43,8	34,6	40	25	44,4	36,4
	50-74 ans	38,5	40,3	34,8	51,6	16,7	36,9	38,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	5,6	7,1	0	10	0	0	0
	55-59 ans	34,5	39,1	16,7	0	0	42,9	25
	60-64 ans	25,5	23,1	31,3	25	50	22,6	28,6
	65-69 ans	10	11,5	7,1	0	0	15	8,3
	70-74 ans	29,3	21,9	38,5	0	50	25,9	36,4
	50-74 ans	23	21,6	25,8	9,7	25	25,2	25,9
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	21,4	75	20	100	25	50
	55-59 ans	24,1	17,4	50	0	100	19	25
	60-64 ans	23,6	25,6	18,8	37,5	50	22,6	14,3
	65-69 ans	30	26,9	35,7	33,3	50	25	33,3
	70-74 ans	20,7	18,8	23,1	20	0	18,5	27,3
	50-74 ans	25	22,4	30,3	25,8	50	21,4	25,9
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,1	7,1	25	10	0	0	50
	55-59 ans	6,9	8,7	0	0	0	9,5	0
	60-64 ans	18,2	20,5	12,5	0	0	25,8	14,3
	65-69 ans	17,5	19,2	14,3	16,7	0	20	16,7
	70-74 ans	10,3	15,6	3,8	40	25	11,1	0
	50-74 ans	13,5	15,7	9,1	12,9	8,3	16,5	9,3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire