

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19 874	9 350	10 524	5 161	5 586	4 189	4 938
	55-59 ans	17 652	8 117	9 535	837	895	7 280	8 640
	60-64 ans	18 825	8 422	10 403	633	679	7 789	9 724
	65-69 ans	15 694	7 170	8 524	381	404	6 789	8 120
	70-74 ans	13 247	5 826	7 421	260	278	5 566	7 143
	50-74 ans	85 292	38 885	46 407	7 272	7 842	31 613	38 565
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	847	422	425	250	278	172	147
	55-59 ans	729	360	369	54	68	306	301
	60-64 ans	657	271	386	41	50	230	336
	65-69 ans	530	224	306	31	31	193	275
	70-74 ans	525	212	313	20	18	192	295
	50-74 ans	3 288	1 489	1 799	396	445	1 093	1 354
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	557	294	263	162	159	132	104
	55-59 ans	520	259	261	30	35	229	226
	60-64 ans	471	186	285	27	28	159	257
	65-69 ans	381	164	217	14	20	150	197
	70-74 ans	365	148	217	7	7	141	210
	50-74 ans	2 294	1 051	1 243	240	249	811	994
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	290	128	162	88	119	40	43
	55-59 ans	209	101	108	24	33	77	75
	60-64 ans	186	85	101	14	22	71	79
	65-69 ans	149	60	89	17	11	43	78
	70-74 ans	160	64	96	13	11	51	85
	50-74 ans	994	438	556	156	196	282	360
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19 584	9 222	10 362	5 073	5 467	4 149	4 895
	55-59 ans	17 443	8 016	9 427	813	862	7 203	8 565
	60-64 ans	18 639	8 337	10 302	619	657	7 718	9 645
	65-69 ans	15 545	7 110	8 435	364	393	6 746	8 042
	70-74 ans	13 087	5 762	7 325	247	267	5 515	7 058
	50-74 ans	84 298	38 447	45 851	7 116	7 646	31 331	38 205
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	263	149	114	96	60	53	54
	55-59 ans	295	173	122	27	9	146	113
	60-64 ans	311	167	144	13	11	154	133
	65-69 ans	317	183	134	11	12	172	122
	70-74 ans	310	153	157	8	11	145	146

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 496	825	671	155	103	670	568
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	258	147	111	95	60	52	51
	55-59 ans	284	166	118	26	9	140	109
	60-64 ans	302	162	140	13	11	149	129
	65-69 ans	307	177	130	10	12	167	118
	70-74 ans	302	150	152	8	11	142	141
	50-74 ans	1 453	802	651	152	103	650	548
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	231	127	104	80	55	47	49
	55-59 ans	258	150	108	21	8	129	100
	60-64 ans	268	140	128	9	10	131	118
	65-69 ans	277	159	118	7	10	152	108
	70-74 ans	276	138	138	8	11	130	127
	50-74 ans	1 310	714	596	125	94	589	502
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	200	109	91	71	47	38	44
	55-59 ans	230	135	95	17	8	118	87
	60-64 ans	232	125	107	8	5	117	102
	65-69 ans	231	135	96	5	8	130	88
	70-74 ans	234	116	118	6	8	110	110
	50-74 ans	1 127	620	507	107	76	513	431
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	18	9	9	1	2	8	7
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	229	125	104	79	55	46	49
	55-59 ans	256	149	107	21	8	128	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	262	139	123	9	9	130	114
	65-69 ans	275	159	116	7	10	152	106
	70-74 ans	272	136	136	8	10	128	126
	50-74 ans	1 294	708	586	124	92	584	494
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	16	6	10	1	2	5	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	12	5	7	1	0	4	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	215	120	95	76	50	44	45
	55-59 ans	250	147	103	21	8	126	95
	60-64 ans	258	137	121	9	9	128	112
	65-69 ans	264	154	110	7	10	147	100
	70-74 ans	264	133	131	7	11	126	120
	50-74 ans	1 251	691	560	120	88	571	472
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	232	127	105	80	55	47	50
	55-59 ans	258	150	108	21	8	129	100
	60-64 ans	272	143	129	9	10	134	119
	65-69 ans	279	160	119	8	10	152	109
	70-74 ans	281	139	142	8	11	131	131
	50-74 ans	1 322	719	603	126	94	593	509
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	124	63	61	40	31	23	30
	55-59 ans	125	68	57	7	2	61	55
	60-64 ans	135	60	75	2	4	58	71
	65-69 ans	101	45	56	2	5	43	51
	70-74 ans	117	46	71	4	7	42	64
	50-74 ans	602	282	320	55	49	227	271

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	13	8	5	0	1	8	4
	60-64 ans	16	10	6	0	0	10	6
	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	59	37	22	7	4	30	18
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	6	8	4	6	2	2
	55-59 ans	29	20	9	4	3	16	6
	60-64 ans	28	14	14	2	1	12	13
	65-69 ans	36	23	13	0	2	23	11
	70-74 ans	28	19	9	0	1	19	8
	50-74 ans	135	82	53	10	13	72	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	24	15	15	6	9	9
	55-59 ans	59	36	23	6	2	30	21
	60-64 ans	43	31	12	2	3	29	9
	65-69 ans	72	45	27	1	2	44	25
	70-74 ans	67	39	28	1	3	38	25
	50-74 ans	280	175	105	25	16	150	89
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	21	12	9	2	1	10	8
	65-69 ans	29	22	7	4	0	18	7
	70-74 ans	33	19	14	1	0	18	14
	50-74 ans	99	64	35	13	2	51	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	7	0	4	0	3	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	12	9	3	1	0	8	3
	65-69 ans	11	10	1	1	0	9	1
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	47	34	13	7	0	27	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	18	7	11	4	6	3	5
	55-59 ans	8	3	5	0	0	3	5
	60-64 ans	13	4	9	0	1	4	8
	65-69 ans	14	5	9	0	1	5	8
	70-74 ans	13	4	9	1	0	3	9
	50-74 ans	66	23	43	5	8	18	35
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	53	30	23	19	12	11	11
	55-59 ans	88	56	32	10	5	46	27
	60-64 ans	71	45	26	4	4	41	22
	65-69 ans	108	68	40	1	4	67	36
	70-74 ans	95	58	37	1	4	57	33
	50-74 ans	415	257	158	35	29	222	129
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	24	15	15	6	9	9
	55-59 ans	59	36	23	6	2	30	21
	60-64 ans	43	31	12	2	3	29	9
	65-69 ans	72	45	27	1	2	44	25
	70-74 ans	67	39	28	1	3	38	25
	50-74 ans	280	175	105	25	16	150	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	30	21	9	14	3	7	6
	55-59 ans	43	27	16	5	2	22	14
	60-64 ans	31	22	9	2	3	20	6
	65-69 ans	54	35	19	1	2	34	17
	70-74 ans	44	28	16	0	3	28	13
	50-74 ans	202	133	69	22	13	111	56
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	33	23	10	14	3	9	7
	55-59 ans	50	34	16	6	2	28	14
	60-64 ans	37	27	10	2	3	25	7
	65-69 ans	60	40	20	1	2	39	18
	70-74 ans	54	33	21	0	3	33	18
	50-74 ans	234	157	77	23	13	134	64
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	21	12	9	2	1	10	8
	65-69 ans	29	22	7	4	0	18	7
	70-74 ans	33	19	14	1	0	18	14
	50-74 ans	99	64	35	13	2	51	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	19	10	9	2	1	8	8
	65-69 ans	28	21	7	3	0	18	7
	70-74 ans	31	18	13	1	0	17	13
	50-74 ans	93	59	34	11	2	48	32
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	14	8	6	2	1	6	5
	65-69 ans	19	14	5	2	0	12	5
	70-74 ans	21	12	9	0	0	12	9
	50-74 ans	64	39	25	6	2	33	23
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	27	19	8	4	0	15	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	16	12	4	3	0	9	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	18	13	5	1	0	12	5
	70-74 ans	24	13	11	1	0	12	11
	50-74 ans	58	37	21	7	1	30	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	13	5	10	3	3	2
	55-59 ans	18	10	8	3	1	7	7
	60-64 ans	22	14	8	3	1	11	7
	65-69 ans	15	10	5	2	1	8	4
	70-74 ans	16	8	8	0	0	8	8
	50-74 ans	89	55	34	18	6	37	28

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,5	4	4,8	5	4,1	3
	55-59 ans	4,1	4,4	3,9	6,5	7,6	4,2	3,5
	60-64 ans	3,5	3,2	3,7	6,5	7,4	3	3,5
	65-69 ans	3,4	3,1	3,6	8,1	7,7	2,8	3,4
	70-74 ans	4	3,6	4,2	7,7	6,5	3,4	4,1
	50-74 ans	3,9	3,8	3,9	5,4	5,7	3,5	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,4	1,5	1,7	2,1	1	0,9
	55-59 ans	1,2	1,2	1,1	2,9	3,7	1,1	0,9
	60-64 ans	1	1	1	2,2	3,2	0,9	0,8
	65-69 ans	0,9	0,8	1	4,5	2,7	0,6	1
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	5	4	0,9	1,2
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,1	2,5	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,8	69,7	61,9	64,8	57,2	76,7	70,7
	55-59 ans	71,3	71,9	70,7	55,6	51,5	74,8	75,1
	60-64 ans	71,7	68,6	73,8	65,9	56	69,1	76,5
	65-69 ans	71,9	73,2	70,9	45,2	64,5	77,7	71,6
	70-74 ans	69,5	69,8	69,3	35	38,9	73,4	71,2
	50-74 ans	69,8	70,6	69,1	60,6	56	74,2	73,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,9	1,1	1,3	1,1
	55-59 ans	1,7	2,2	1,3	3,3	1	2	1,3
	60-64 ans	1,7	2	1,4	2,1	1,7	2	1,4
	65-69 ans	2	2,6	1,6	3	3,1	2,5	1,5
	70-74 ans	2,4	2,7	2,1	3,2	4,1	2,6	2,1
	50-74 ans	1,8	2,1	1,5	2,2	1,3	2,1	1,5
50-74 ans **	1,8	2,1	1,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,7	97,4	99	100	98,1	94,4
	55-59 ans	96,3	96	96,7	96,3	100	95,9	96,5
	60-64 ans	97,1	97	97,2	100	100	96,8	97
	65-69 ans	96,8	96,7	97	90,9	100	97,1	96,7
	70-74 ans	97,4	98	96,8	100	100	97,9	96,6
	50-74 ans	97,1	97,2	97	98,1	100	97	96,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	86,4	93,7	84,2	91,7	90,4	96,1
	55-59 ans	90,8	90,4	91,5	80,8	88,9	92,1	91,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,7	86,4	91,4	69,2	90,9	87,9	91,5
	65-69 ans	90,2	89,8	90,8	70	83,3	91	91,5
	70-74 ans	91,4	92	90,8	100	100	91,5	90,1
	50-74 ans	90,2	89	91,6	82,2	91,3	90,6	91,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,6	85,8	87,5	88,8	85,5	80,9	89,8
	55-59 ans	89,1	90	88	81	100	91,5	87
	60-64 ans	86,6	89,3	83,6	88,9	50	89,3	86,4
	65-69 ans	83,4	84,9	81,4	71,4	80	85,5	81,5
	70-74 ans	84,8	84,1	85,5	75	72,7	84,6	86,6
	50-74 ans	86	86,8	85,1	85,6	80,9	87,1	85,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	103	82	103	83	103	82
	55-59 ans	88	86	91	100	84	84	92
	60-64 ans	80	84	74	72	66	85	75
	65-69 ans	83	91	73	73	55	92	75
	70-74 ans	84	74	95	98	69	72	98
	50-74 ans	86	87	83	99	77	85	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68,5 (45,5-99)	70,5 (48-100)	67 (40-98)	71 (52,5-102)	70,5 (37-97)	69,5 (44-100)	56 (47,5-98)
	55-59 ans	66 (44,5-94)	65 (43-89)	72 (49-107)	80 (34-127)	84,5 (36-123,5)	65 (44,5-88)	70 (49-106)
	60-64 ans	63 (46-87)	65 (44,5-93)	63 (47-80)	62 (43-94)	49,5 (23,5-90,5)	65 (45-92)	63 (48-80)
	65-69 ans	61,5 (44-90)	63 (49-98)	58,5 (42-79)	63 (53-90)	42 (25-76)	62 (48-98)	60 (42,5-79)
	70-74 ans	69 (48-100)	63 (46-87)	74,5 (50,5-113)	79 (50-154)	56 (48-101)	62,5 (45-87)	75 (51-114)
	50-74 ans	65 (46-95)	65 (46-93)	65 (46-97)	69,5 (48,5-114,5)	61 (37-99)	64 (46-92)	65 (48-96)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,8	8,7	4,4	10,4	5	5,7	3,7
	55-59 ans	6,1	5,8	6,6	11,1	11,1	4,8	6,2
	60-64 ans	7,1	8,4	5,6	23,1	9,1	7,1	5,3
	65-69 ans	4,7	5,5	3,7	18,2	8,3	4,7	3,3
	70-74 ans	5,2	5,2	5,1	0	0	5,5	5,5
	50-74 ans	5,9	6,7	5,1	11,6	5,8	5,5	4,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,1	94,5	91,3	95	90,9	93,6	91,8
	55-59 ans	96,9	98	95,4	100	100	97,7	95
	60-64 ans	96,3	97,9	94,5	100	90	97,7	94,9
	65-69 ans	95,3	96,9	93,2	100	100	96,7	92,6
	70-74 ans	95,7	96,4	94,9	87,5	100	96,9	94,5
	50-74 ans	95,5	96,8	94	96	93,6	96,9	94
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	49,6	58,1	50	56,4	48,9	60
	55-59 ans	48,4	45,3	52,8	33,3	25	47,3	55
	60-64 ans	49,6	42	58,1	22,2	40	43,3	59,7
	65-69 ans	36,2	28,1	47,1	25	50	28,3	46,8
	70-74 ans	41,6	33,1	50	50	63,6	32,1	48,9
	50-74 ans	45,5	39,2	53,1	43,7	52,1	38,3	53,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,7	6,3	2,9	7,5	5,5	4,3	0
	55-59 ans	5	5,3	4,6	0	12,5	6,2	4
	60-64 ans	5,9	7	4,7	0	0	7,5	5
	65-69 ans	4,3	4,4	4,2	0	0	4,6	4,6
	70-74 ans	2,5	2,9	2,1	12,5	0	2,3	2,3
	50-74 ans	4,5	5,1	3,6	5,6	4,3	5,1	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,8	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0	0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	4,7	7,6	5	10,9	4,3	4
	55-59 ans	11,2	13,3	8,3	19	37,5	12,4	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10,3	9,8	10,9	22,2	10	9	10,9
	65-69 ans	12,9	14,4	10,9	0	20	15,1	10,1
	70-74 ans	10	13,7	6,3	0	9,1	14,5	6,1
	50-74 ans	10,2	11,4	8,8	7,9	13,8	12,1	7,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,8	18,9	14,3	18,8	10,9	19,1	18
	55-59 ans	22,9	24	21,3	28,6	25	23,3	21
	60-64 ans	15,8	21,7	9,3	22,2	30	21,6	7,6
	65-69 ans	25,8	28,1	22,7	12,5	20	28,9	22,9
	70-74 ans	23,8	28,1	19,7	12,5	27,3	29	19,1
	50-74 ans	21,2	24,3	17,4	19,8	17	25,3	17,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,7	1,9	5	1,8	4,3	2
	55-59 ans	3,1	3,3	2,8	9,5	0	2,3	3
	60-64 ans	7,7	8,4	7	22,2	10	7,5	6,7
	65-69 ans	10,4	13,8	5,9	50	0	11,8	6,4
	70-74 ans	11,7	13,7	9,9	12,5	0	13,7	10,7
	50-74 ans	7,5	8,9	5,8	10,3	2,1	8,6	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	50-74 ans	0,2	0,1	0,3	0,8	0	0	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	5,5	0	5	0	6,4	0
	55-59 ans	2,7	2,7	2,8	4,8	0	2,3	3
	60-64 ans	4,4	6,3	2,3	11,1	0	6	2,5
	65-69 ans	3,9	6,3	0,8	12,5	0	5,9	0,9
	70-74 ans	3,6	2,9	4,2	0	0	3,1	4,6
	50-74 ans	3,6	4,7	2,2	5,6	0	4,6	2,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7,8	5,5	10,5	5	10,9	6,4	10
	55-59 ans	3,1	2	4,6	0	0	2,3	5
	60-64 ans	4,8	2,8	7	0	10	3	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	3,1	7,6	0	10	3,3	7,3
	70-74 ans	4,6	2,9	6,3	12,5	0	2,3	6,9
	50-74 ans	5	3,2	7,1	4	8,5	3	6,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,3	2,2	3,7	2,2	2,7	2,2
	55-59 ans	5	7	3,4	12,3	5,8	6,4	3,2
	60-64 ans	3,8	5,4	2,5	6,5	6,1	5,3	2,3
	65-69 ans	6,9	9,6	4,7	2,7	10,2	9,9	4,5
	70-74 ans	7,3	10,1	5,1	4	15	10,3	4,7
	50-74 ans	4,9	6,7	3,4	4,9	3,8	7,1	3,4
	50-74 ans **	4,9	6,5	3,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,6	1,4	3	1,1	2,2	1,8
	55-59 ans	3,4	4,5	2,4	7,4	2,3	4,2	2,5
	60-64 ans	2,3	3,7	1,2	3,2	4,6	3,8	0,9
	65-69 ans	4,6	6,3	3,2	2,7	5,1	6,5	3,1
	70-74 ans	5,1	6,8	3,8	4	11,2	6,9	3,5
	50-74 ans	3,3	4,6	2,3	3,5	2,1	4,8	2,3
	50-74 ans **	3,3	4,4	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,3	0,9	2,8	0,5	1,7	1,2
	55-59 ans	2,5	3,4	1,7	6,2	2,3	3,1	1,6
	60-64 ans	1,7	2,6	0,9	3,2	4,6	2,6	0,6
	65-69 ans	3,5	4,9	2,3	2,7	5,1	5	2,1
	70-74 ans	3,4	4,9	2,2	0	11,2	5,1	1,8
	50-74 ans	2,4	3,5	1,5	3,1	1,7	3,5	1,5
	50-74 ans **	2,4	3,4	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,5	1	2,8	0,5	2,2	1,4
	55-59 ans	2,9	4,2	1,7	7,4	2,3	3,9	1,6
	60-64 ans	2	3,2	1	3,2	4,6	3,2	0,7
	65-69 ans	3,9	5,6	2,4	2,7	5,1	5,8	2,2
	70-74 ans	4,1	5,7	2,9	0	11,2	6	2,6
	50-74 ans	2,8	4,1	1,7	3,2	1,7	4,3	1,7
	50-74 ans **	2,8	4	1,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,8	0,2	0,5	0,2
	55-59 ans	0,5	0,6	0,3	2,5	0	0,4	0,4
	60-64 ans	1,1	1,4	0,9	3,2	1,5	1,3	0,8
	65-69 ans	1,9	3,1	0,8	11	0	2,7	0,9
	70-74 ans	2,5	3,3	1,9	4	0	3,3	2
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,8	0,3	1,6	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,5	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	33,3	100	25	100	50	100
	55-59 ans	85,7	75	100	100	0	66,7	100
	60-64 ans	73,7	80	66,7	100	100	75	62,5
	65-69 ans	67,9	66,7	71,4	66,7	0	66,7	71,4
	70-74 ans	67,7	66,7	69,2	0	0	70,6	69,2
	50-74 ans	68,8	66,1	73,5	54,5	100	68,8	71,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)