

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 35 208 | 16 357 | 18 851 | 8 653 | 9 669 | 7 704 | 9 182 |
| | 55-59 ans | 33 205 | 14 804 | 18 401 | 1 902 | 2 257 | 12 902 | 16 144 |
| | 60-64 ans | 35 400 | 15 674 | 19 726 | 1 425 | 1 642 | 14 249 | 18 084 |
| | 65-69 ans | 29 811 | 13 311 | 16 500 | 867 | 995 | 12 444 | 15 505 |
| | 70-74 ans | 18 501 | 8 099 | 10 402 | 469 | 509 | 7 630 | 9 893 |
| | 50-74 ans | 152 125 | 68 245 | 83 880 | 13 316 | 15 072 | 54 929 | 68 808 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 2 400 | 1 145 | 1 255 | 835 | 927 | 310 | 328 |
| | 55-59 ans | 1 834 | 836 | 998 | 211 | 221 | 625 | 777 |
| | 60-64 ans | 1 894 | 729 | 1 165 | 148 | 195 | 581 | 970 |
| | 65-69 ans | 1 593 | 653 | 940 | 97 | 134 | 556 | 806 |
| | 70-74 ans | 1 204 | 525 | 679 | 85 | 69 | 440 | 610 |
| | 50-74 ans | 8 925 | 3 888 | 5 037 | 1 376 | 1 546 | 2 512 | 3 491 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 1 189 | 571 | 618 | 413 | 461 | 158 | 157 |
| | 55-59 ans | 860 | 401 | 459 | 78 | 72 | 323 | 387 |
| | 60-64 ans | 947 | 348 | 599 | 47 | 84 | 301 | 515 |
| | 65-69 ans | 857 | 348 | 509 | 41 | 64 | 307 | 445 |
| | 70-74 ans | 584 | 252 | 332 | 32 | 27 | 220 | 305 |
| | 50-74 ans | 4 437 | 1 920 | 2 517 | 611 | 708 | 1 309 | 1 809 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 1 211 | 574 | 637 | 422 | 466 | 152 | 171 |
| | 55-59 ans | 974 | 435 | 539 | 133 | 149 | 302 | 390 |
| | 60-64 ans | 947 | 381 | 566 | 101 | 111 | 280 | 455 |
| | 65-69 ans | 736 | 305 | 431 | 56 | 70 | 249 | 361 |
| | 70-74 ans | 620 | 273 | 347 | 53 | 42 | 220 | 305 |
| | 50-74 ans | 4 488 | 1 968 | 2 520 | 765 | 838 | 1 203 | 1 682 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 33 997 | 15 783 | 18 214 | 8 231 | 9 203 | 7 552 | 9 011 |
| | 55-59 ans | 32 231 | 14 369 | 17 862 | 1 769 | 2 108 | 12 600 | 15 754 |
| | 60-64 ans | 34 453 | 15 293 | 19 160 | 1 324 | 1 531 | 13 969 | 17 629 |
| | 65-69 ans | 29 075 | 13 006 | 16 069 | 811 | 925 | 12 195 | 15 144 |
| | 70-74 ans | 17 881 | 7 826 | 10 055 | 416 | 467 | 7 410 | 9 588 |
| | 50-74 ans | 147 637 | 66 277 | 81 360 | 12 551 | 14 234 | 53 726 | 67 126 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 631 | 314 | 317 | 163 | 179 | 151 | 138 |
| | 55-59 ans | 638 | 308 | 330 | 70 | 54 | 238 | 276 |
| | 60-64 ans | 748 | 353 | 395 | 53 | 50 | 300 | 345 |
| | 65-69 ans | 722 | 377 | 345 | 39 | 31 | 338 | 314 |
| | 70-74 ans | 458 | 240 | 218 | 27 | 12 | 213 | 206 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 3 197 | 1 592 | 1 605 | 352 | 326 | 1 240 | 1 279 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 627 | 312 | 315 | 162 | 179 | 150 | 136 |
| | 55-59 ans | 629 | 303 | 326 | 68 | 54 | 235 | 272 |
| | 60-64 ans | 744 | 350 | 394 | 53 | 50 | 297 | 344 |
| | 65-69 ans | 718 | 374 | 344 | 39 | 30 | 335 | 314 |
| | 70-74 ans | 454 | 238 | 216 | 27 | 12 | 211 | 204 |
| | 50-74 ans | 3 172 | 1 577 | 1 595 | 349 | 325 | 1 228 | 1 270 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 536 | 270 | 266 | 135 | 144 | 135 | 122 |
| | 55-59 ans | 539 | 253 | 286 | 53 | 48 | 200 | 238 |
| | 60-64 ans | 663 | 305 | 358 | 43 | 45 | 262 | 313 |
| | 65-69 ans | 614 | 316 | 298 | 31 | 27 | 285 | 271 |
| | 70-74 ans | 373 | 193 | 180 | 19 | 10 | 174 | 170 |
| | 50-74 ans | 2 725 | 1 337 | 1 388 | 281 | 274 | 1 056 | 1 114 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 528 | 269 | 259 | 134 | 141 | 135 | 118 |
| | 55-59 ans | 530 | 249 | 281 | 50 | 47 | 199 | 234 |
| | 60-64 ans | 649 | 298 | 351 | 41 | 44 | 257 | 307 |
| | 65-69 ans | 592 | 306 | 286 | 30 | 25 | 276 | 261 |
| | 70-74 ans | 362 | 187 | 175 | 16 | 9 | 171 | 166 |
| | 50-74 ans | 2 661 | 1 309 | 1 352 | 271 | 266 | 1 038 | 1 086 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 533 | 270 | 263 | 135 | 143 | 135 | 120 |
| | 55-59 ans | 533 | 251 | 282 | 51 | 48 | 200 | 234 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 658 | 302 | 356 | 43 | 45 | 259 | 311 |
| | 65-69 ans | 603 | 310 | 293 | 29 | 27 | 281 | 266 |
| | 70-74 ans | 369 | 191 | 178 | 19 | 10 | 172 | 168 |
| | 50-74 ans | 2 696 | 1 324 | 1 372 | 277 | 273 | 1 047 | 1 099 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 29 | 13 | 16 | 4 | 1 | 9 | 15 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 531 | 270 | 261 | 135 | 142 | 135 | 119 |
| | 55-59 ans | 533 | 252 | 281 | 52 | 48 | 200 | 233 |
| | 60-64 ans | 654 | 301 | 353 | 43 | 44 | 258 | 309 |
| | 65-69 ans | 605 | 312 | 293 | 30 | 27 | 282 | 266 |
| | 70-74 ans | 370 | 192 | 178 | 19 | 10 | 173 | 168 |
| | 50-74 ans | 2 693 | 1 327 | 1 366 | 279 | 271 | 1 048 | 1 095 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 538 | 271 | 267 | 136 | 144 | 135 | 123 |
| | 55-59 ans | 546 | 256 | 290 | 54 | 48 | 202 | 242 |
| | 60-64 ans | 666 | 307 | 359 | 43 | 45 | 264 | 314 |
| | 65-69 ans | 617 | 319 | 298 | 31 | 27 | 288 | 271 |
| | 70-74 ans | 377 | 195 | 182 | 19 | 10 | 176 | 172 |
| | 50-74 ans | 2 744 | 1 348 | 1 396 | 283 | 274 | 1 065 | 1 122 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 309 | 132 | 177 | 64 | 94 | 68 | 83 |
| | 55-59 ans | 304 | 107 | 197 | 17 | 29 | 90 | 168 |
| | 60-64 ans | 345 | 123 | 222 | 16 | 22 | 107 | 200 |
| | 65-69 ans | 280 | 131 | 149 | 10 | 12 | 121 | 137 |
| | 70-74 ans | 179 | 80 | 99 | 5 | 4 | 75 | 95 |
| | 50-74 ans | 1 417 | 573 | 844 | 112 | 161 | 461 | 683 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 38 | 27 | 11 | 3 | 1 | 24 | 10 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 71 | 40 | 31 | 21 | 16 | 19 | 15 |
| | 55-59 ans | 74 | 47 | 27 | 9 | 6 | 38 | 21 |
| | 60-64 ans | 98 | 55 | 43 | 6 | 4 | 49 | 39 |
| | 65-69 ans | 88 | 43 | 45 | 5 | 5 | 38 | 40 |
| | 70-74 ans | 63 | 36 | 27 | 2 | 1 | 34 | 26 |
| | 50-74 ans | 394 | 221 | 173 | 43 | 32 | 178 | 141 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 57 | 38 | 19 | 20 | 11 | 18 | 8 |
| | 55-59 ans | 80 | 49 | 31 | 13 | 8 | 36 | 23 |
| | 60-64 ans | 105 | 64 | 41 | 9 | 6 | 55 | 35 |
| | 65-69 ans | 116 | 69 | 47 | 9 | 4 | 60 | 43 |
| | 70-74 ans | 61 | 33 | 28 | 4 | 2 | 29 | 26 |
| | 50-74 ans | 419 | 253 | 166 | 55 | 31 | 198 | 135 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 24 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 26 | 21 | 5 | 8 | 1 | 13 | 4 |
| | 60-64 ans | 54 | 27 | 27 | 11 | 9 | 16 | 18 |
| | 65-69 ans | 59 | 34 | 25 | 5 | 5 | 29 | 20 |
| | 70-74 ans | 40 | 30 | 10 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| | 50-74 ans | 203 | 127 | 76 | 39 | 23 | 88 | 53 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 22 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 23 | 12 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 128 | 78 | 50 | 41 | 27 | 37 | 23 |
| | 55-59 ans | 154 | 96 | 58 | 22 | 14 | 74 | 44 |
| | 60-64 ans | 203 | 119 | 84 | 15 | 10 | 104 | 74 |
| | 65-69 ans | 204 | 112 | 92 | 14 | 9 | 98 | 83 |
| | 70-74 ans | 124 | 69 | 55 | 6 | 3 | 63 | 52 |
| | 50-74 ans | 813 | 474 | 339 | 98 | 63 | 376 | 276 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 57 | 38 | 19 | 20 | 11 | 18 | 8 |
| | 55-59 ans | 80 | 49 | 31 | 13 | 8 | 36 | 23 |
| | 60-64 ans | 105 | 64 | 41 | 9 | 6 | 55 | 35 |
| | 65-69 ans | 116 | 69 | 47 | 9 | 4 | 60 | 43 |
| | 70-74 ans | 61 | 33 | 28 | 4 | 2 | 29 | 26 |
| | 50-74 ans | 419 | 253 | 166 | 55 | 31 | 198 | 135 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 38 | 26 | 12 | 12 | 7 | 14 | 5 |
| | 55-59 ans | 54 | 32 | 22 | 7 | 5 | 25 | 17 |
| | 60-64 ans | 68 | 43 | 25 | 5 | 4 | 38 | 21 |
| | 65-69 ans | 73 | 47 | 26 | 5 | 0 | 42 | 26 |
| | 70-74 ans | 42 | 24 | 18 | 2 | 2 | 22 | 16 |
| | 50-74 ans | 275 | 172 | 103 | 31 | 18 | 141 | 85 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 46 | 32 | 14 | 16 | 8 | 16 | 6 |
| | 55-59 ans | 73 | 48 | 25 | 12 | 6 | 36 | 19 |
| | 60-64 ans | 93 | 62 | 31 | 8 | 4 | 54 | 27 |
| | 65-69 ans | 101 | 62 | 39 | 9 | 3 | 53 | 36 |
| | 70-74 ans | 58 | 34 | 24 | 5 | 2 | 29 | 22 |
| | 50-74 ans | 371 | 238 | 133 | 50 | 23 | 188 | 110 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 24 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 26 | 21 | 5 | 8 | 1 | 13 | 4 |
| | 60-64 ans | 54 | 27 | 27 | 11 | 9 | 16 | 18 |
| | 65-69 ans | 59 | 34 | 25 | 5 | 5 | 29 | 20 |
| | 70-74 ans | 40 | 30 | 10 | 8 | 2 | 22 | 8 |
| | 50-74 ans | 203 | 127 | 76 | 39 | 23 | 88 | 53 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 23 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 22 | 18 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4 |
| | 60-64 ans | 49 | 23 | 26 | 11 | 8 | 12 | 18 |
| | 65-69 ans | 53 | 29 | 24 | 4 | 5 | 25 | 19 |
| | 70-74 ans | 38 | 28 | 10 | 8 | 2 | 20 | 8 |
| | 50-74 ans | 185 | 113 | 72 | 36 | 21 | 77 | 51 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 23 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 49 | 23 | 26 | 11 | 8 | 12 | 18 |
| | 65-69 ans | 50 | 27 | 23 | 3 | 5 | 24 | 18 |
| | 70-74 ans | 37 | 28 | 9 | 8 | 1 | 20 | 8 |
| | 50-74 ans | 180 | 110 | 70 | 34 | 20 | 76 | 50 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | 55-59 ans | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| | 60-64 ans | 38 | 18 | 20 | 8 | 6 | 10 | 14 |
| | 65-69 ans | 45 | 24 | 21 | 3 | 4 | 21 | 17 |
| | 70-74 ans | 30 | 24 | 6 | 7 | 1 | 17 | 5 |
| | 50-74 ans | 145 | 89 | 56 | 27 | 16 | 62 | 40 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 35 | 21 | 14 | 7 | 4 | 14 | 10 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| | 60-64 ans | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| | 70-74 ans | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| | 50-74 ans | 59 | 39 | 20 | 5 | 7 | 34 | 13 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 33 | 22 | 11 | 8 | 3 | 14 | 8 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| | 65-69 ans | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 35 | 18 | 17 | 8 | 3 | 10 | 14 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 59 - Nord

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 18 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 23 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 20 | 16 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 |
| | 60-64 ans | 47 | 22 | 25 | 10 | 7 | 12 | 18 |
| | 65-69 ans | 48 | 26 | 22 | 2 | 5 | 24 | 17 |
| | 70-74 ans | 37 | 28 | 9 | 8 | 1 | 20 | 8 |
| | 50-74 ans | 175 | 107 | 68 | 32 | 19 | 75 | 49 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 86 | 41 | 45 | 27 | 33 | 14 | 12 |
| | 55-59 ans | 77 | 42 | 35 | 12 | 6 | 30 | 29 |
| | 60-64 ans | 66 | 35 | 31 | 9 | 4 | 26 | 27 |
| | 65-69 ans | 91 | 51 | 40 | 6 | 3 | 45 | 37 |
| | 70-74 ans | 69 | 39 | 30 | 6 | 2 | 33 | 28 |
| | 50-74 ans | 389 | 208 | 181 | 60 | 48 | 148 | 133 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 59 - Nord

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,8 | 7 | 6,7 | 9,6 | 9,6 | 4 | 3,6 |
| | 55-59 ans | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 11,1 | 9,8 | 4,8 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 4,7 | 5,9 | 10,4 | 11,9 | 4,1 | 5,4 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 4,9 | 5,7 | 11,2 | 13,5 | 4,5 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 18,1 | 13,6 | 5,8 | 6,2 |
| | 50-74 ans | 5,9 | 5,7 | 6 | 10,3 | 10,3 | 4,6 | 5,1 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 4,9 | 4,8 | 2 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 7 | 6,6 | 2,3 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 7,1 | 6,8 | 2 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 6,5 | 7 | 2 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 11,3 | 8,3 | 2,9 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 3 | 2,9 | 3 | 5,7 | 5,6 | 2,2 | 2,4 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 49,5 | 49,9 | 49,2 | 49,5 | 49,7 | 51 | 47,9 |
| | 55-59 ans | 46,9 | 48 | 46 | 37 | 32,6 | 51,7 | 49,8 |
| | 60-64 ans | 50 | 47,7 | 51,4 | 31,8 | 43,1 | 51,8 | 53,1 |
| | 65-69 ans | 53,8 | 53,3 | 54,1 | 42,3 | 47,8 | 55,2 | 55,2 |
| | 70-74 ans | 48,5 | 48 | 48,9 | 37,6 | 39,1 | 50 | 50 |
| | 50-74 ans | 49,7 | 49,4 | 50 | 44,4 | 45,8 | 52,1 | 51,8 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 2 | 2,1 | 1,8 | 4 | 2,6 | 1,9 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 4 | 3,3 | 2,1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 4,8 | 3,4 | 2,8 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 6,5 | 2,6 | 2,9 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
| 50-74 ans ** | 2,2 | 2,4 | 2 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 | 99,3 | 98,6 |
| | 55-59 ans | 98,6 | 98,4 | 98,8 | 97,1 | 100 | 98,7 | 98,6 |
| | 60-64 ans | 99,5 | 99,2 | 99,7 | 100 | 100 | 99 | 99,7 |
| | 65-69 ans | 99,4 | 99,2 | 99,7 | 100 | 96,8 | 99,1 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,1 | 99,2 | 99,1 | 100 | 100 | 99,1 | 99 |
| | 50-74 ans | 99,2 | 99,1 | 99,4 | 99,1 | 99,7 | 99 | 99,3 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 85,5 | 86,5 | 84,4 | 83,3 | 80,4 | 90 | 89,7 |
| | 55-59 ans | 85,7 | 83,5 | 87,7 | 77,9 | 88,9 | 85,1 | 87,5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 59 - Nord

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 89,1 | 87,1 | 90,9 | 81,1 | 90 | 88,2 | 91 |
| | 65-69 ans | 85,5 | 84,5 | 86,6 | 79,5 | 90 | 85,1 | 86,3 |
| | 70-74 ans | 82,2 | 81,1 | 83,3 | 70,4 | 83,3 | 82,5 | 83,3 |
| | 50-74 ans | 85,9 | 84,8 | 87 | 80,5 | 84,3 | 86 | 87,7 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 98,5 | 99,6 | 97,4 | 99,3 | 97,9 | 100 | 96,7 |
| | 55-59 ans | 98,3 | 98,4 | 98,3 | 94,3 | 97,9 | 99,5 | 98,3 |
| | 60-64 ans | 97,9 | 97,7 | 98 | 95,3 | 97,8 | 98,1 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 96,4 | 96,8 | 96 | 96,8 | 92,6 | 96,8 | 96,3 |
| | 70-74 ans | 97,1 | 96,9 | 97,2 | 84,2 | 90 | 98,3 | 97,6 |
| | 50-74 ans | 97,7 | 97,9 | 97,4 | 96,4 | 97,1 | 98,3 | 97,5 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 3 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| | 55-59 ans | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 3 (1-5) | 2 (1-5) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| | 60-64 ans | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 3 (1-5) | 3 (1-5) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| | 65-69 ans | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 3 (1-4) | 2 (1-5) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| | 70-74 ans | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 3 (1-5) | 3 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| | 50-74 ans | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 3 (1-5) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 89 | 86 |
| | 55-59 ans | 89 | 94 | 86 | 77 | 87 | 98 | 85 |
| | 60-64 ans | 80 | 78 | 82 | 94 | 103 | 75 | 79 |
| | 65-69 ans | 83 | 84 | 82 | 140 | 101 | 78 | 80 |
| | 70-74 ans | 80 | 76 | 86 | 108 | 90 | 72 | 85 |
| | 50-74 ans | 84 | 84 | 84 | 94 | 91 | 81 | 83 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 61 (42-94) | 62 (44-99) | 60 (41-89) | 64 (48-105) | 60,5 (41-91,5) | 60 (42-91) | 57 (41-87) |
| | 55-59 ans | 60 (40-88) | 61 (41-91) | 59 (40-85) | 64 (41-95) | 60 (39,5-91) | 59 (41,5-90,5) | 59 (40-84) |
| | 60-64 ans | 57 (41-88) | 56 (41-87) | 59 (41-89) | 61 (41-92) | 70 (45-101) | 55,5 (40-87) | 57 (41-84) |
| | 65-69 ans | 57 (40-86) | 55 (40-85,5) | 59 (40-86) | 66 (47-95) | 45 (31-96) | 55 (38-84) | 60 (40-86) |
| | 70-74 ans | 55 (38-87) | 55 (41-87) | 55,5 (35-85,5) | 59 (42-97) | 40 (30-70) | 55 (39-87) | 56 (36-86) |
| | 50-74 ans | 59 (41-88) | 58 (41-90) | 59 (40-87) | 64 (45-99) | 60,5 (39-94) | 56 (40-87) | 58 (40-85) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France | 50-54 ans | 13,6 | 13,1 | 14,2 | 16,6 | 18,4 | 9,3 | 8,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 59 - Nord

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 12,1 | 13,6 | 10,6 | 17,1 | 11,1 | 12,6 | 10,5 |
| | 60-64 ans | 8,8 | 9,9 | 7,8 | 17 | 8 | 8,7 | 7,8 |
| | 65-69 ans | 12,6 | 13,5 | 11,6 | 15,4 | 9,7 | 13,3 | 11,8 |
| | 70-74 ans | 15,1 | 16,3 | 13,8 | 22,2 | 16,7 | 15,5 | 13,6 |
| | 50-74 ans | 12,2 | 13,1 | 11,3 | 17 | 14,7 | 11,9 | 10,4 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,1 | 100 | 98,1 | 100 | 98,6 | 100 | 97,5 |
| | 55-59 ans | 98,9 | 99,6 | 98,3 | 98,1 | 100 | 100 | 97,9 |
| | 60-64 ans | 98,6 | 98,7 | 98,6 | 100 | 97,8 | 98,5 | 98,7 |
| | 65-69 ans | 98,5 | 98,7 | 98,3 | 96,8 | 100 | 98,9 | 98,2 |
| | 70-74 ans | 99,2 | 99,5 | 98,9 | 100 | 100 | 99,4 | 98,8 |
| | 50-74 ans | 98,8 | 99,3 | 98,4 | 99,3 | 98,9 | 99,2 | 98,3 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 57,4 | 48,7 | 66,3 | 47,1 | 65,3 | 50,4 | 67,5 |
| | 55-59 ans | 55,7 | 41,8 | 67,9 | 31,5 | 60,4 | 44,6 | 69,4 |
| | 60-64 ans | 51,8 | 40,1 | 61,8 | 37,2 | 48,9 | 40,5 | 63,7 |
| | 65-69 ans | 45,4 | 41,1 | 50 | 32,3 | 44,4 | 42 | 50,6 |
| | 70-74 ans | 47,5 | 41 | 54,4 | 26,3 | 40 | 42,6 | 55,2 |
| | 50-74 ans | 51,6 | 42,5 | 60,5 | 39,6 | 58,8 | 43,3 | 60,9 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 1,5 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 3,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 0 | 2,5 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 2,3 | 0,6 | 0 | 0 | 2,7 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 1,6 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 2 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | 0,9 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0,4 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13,2 | 14,8 | 11,6 | 15,4 | 11,1 | 14,1 | 12,2 |
| | 55-59 ans | 13,6 | 18,4 | 9,3 | 16,7 | 12,5 | 18,8 | 8,7 |
| | 60-64 ans | 14,7 | 17,9 | 12 | 14 | 8,9 | 18,6 | 12,4 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 59 - Nord

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 14,3 | 13,5 | 15,1 | 16,1 | 18,5 | 13,2 | 14,8 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 18,5 | 14,8 | 10,5 | 10 | 19,3 | 15,1 |
| | 50-74 ans | 14,4 | 16,4 | 12,4 | 15,2 | 11,7 | 16,7 | 12,6 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 10,6 | 14 | 7,1 | 14,7 | 7,6 | 13,3 | 6,5 |
| | 55-59 ans | 14,7 | 19,1 | 10,7 | 24,1 | 16,7 | 17,8 | 9,5 |
| | 60-64 ans | 15,8 | 20,8 | 11,4 | 20,9 | 13,3 | 20,8 | 11,1 |
| | 65-69 ans | 18,8 | 21,6 | 15,8 | 29 | 14,8 | 20,8 | 15,9 |
| | 70-74 ans | 16,2 | 16,9 | 15,4 | 21,1 | 20 | 16,5 | 15,1 |
| | 50-74 ans | 15,3 | 18,8 | 11,9 | 19,4 | 11,3 | 18,6 | 12 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 5,1 | 4,2 | 5,9 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 8,2 | 1,7 | 14,8 | 2,1 | 6,4 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 8,8 | 7,5 | 25,6 | 20 | 6,1 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 10,7 | 8,4 | 16,1 | 18,5 | 10,1 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 10,6 | 15,4 | 5,5 | 42,1 | 20 | 12,5 | 4,7 |
| | 50-74 ans | 7,4 | 9,4 | 5,4 | 13,8 | 8,4 | 8,3 | 4,7 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,1 | 0 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,8 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,3 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,8 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 2 | 0,7 | 1,9 | 0 | 2 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 3,2 | 0 | 0,7 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0 | 0 | 0,6 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 0 | 0 | 0,4 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0 | 2,2 | 0,8 | 1 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 59 - Nord

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,1 | 0,6 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,8 | 4,9 | 2,7 | 5 | 2,9 | 4,9 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 6,7 | 3,2 | 12,4 | 6,6 | 5,9 | 2,8 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 7,8 | 4,4 | 11,3 | 6,5 | 7,4 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 7 | 8,6 | 5,7 | 17,3 | 9,7 | 8 | 5,5 |
| | 70-74 ans | 6,9 | 8,8 | 5,5 | 14,4 | 6,4 | 8,5 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 5,5 | 7,2 | 4,2 | 7,8 | 4,4 | 7 | 4,1 |
| | 50-74 ans ** | 5,5 | 7,1 | 4,1 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,7 | 2,4 | 1 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 7,3 | 3,8 | 2,9 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 3 | 4,2 | 2,1 | 6,8 | 3,9 | 3,9 | 2 |
| | 65-69 ans | 4 | 5,3 | 2,9 | 11,1 | 4,3 | 4,9 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 4,2 | 2,8 | 9,6 | 4,3 | 3,9 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 3,8 | 2 | 4,4 | 2,2 | 3,7 | 2 |
| | 50-74 ans ** | 2,8 | 3,7 | 2 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,9 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 4 | 2,4 | 2 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 3,6 | 1,6 | 6,2 | 0 | 3,4 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 4,8 | 4,3 | 3 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 2,6 | 1,3 |
| | 50-74 ans ** | 1,9 | 2,5 | 1,3 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,4 | 2 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 2,1 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 3,3 | 1,4 | 6,8 | 2,8 | 2,9 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 4,1 | 1,6 | 6 | 2,6 | 3,9 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 3,5 | 4,8 | 2,4 | 11,1 | 3,2 | 4,3 | 2,4 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 4,3 | 2,4 | 12 | 4,3 | 3,9 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 3,6 | 1,6 | 4 | 1,6 | 3,5 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,5 | 3,5 | 1,6 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 59 - Nord

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 4,5 | 0,5 | 1 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 8,3 | 5,9 | 1,1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2,6 | 1,6 | 6,2 | 5,4 | 2,4 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 3,8 | 1 | 19,2 | 4,3 | 3 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 0,8 |
| | 50-74 ans ** | 1,4 | 1,9 | 0,9 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 5,6 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5,7 | 6,9 | 4,2 | 25 | 0 | 4 | 5,3 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 5,6 | 4,8 | 1,3 | 2 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)