

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 576	5 275	6 301	2 920	3 412	2 355	2 889
	55-59 ans	10 389	4 572	5 817	792	809	3 780	5 008
	60-64 ans	11 718	5 175	6 543	794	747	4 381	5 796
	65-69 ans	10 119	4 547	5 572	568	496	3 979	5 076
	70-74 ans	6 863	3 149	3 714	351	314	2 798	3 400
	<b>50-74 ans</b>	<b>50 665</b>	<b>22 718</b>	<b>27 947</b>	<b>5 425</b>	<b>5 778</b>	<b>17 293</b>	<b>22 169</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	816	360	456	220	271	140	185
	55-59 ans	821	367	454	81	94	286	360
	60-64 ans	871	348	523	66	74	282	449
	65-69 ans	780	361	419	78	61	283	358
	70-74 ans	643	297	346	51	42	246	304
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 931</b>	<b>1 733</b>	<b>2 198</b>	<b>496</b>	<b>542</b>	<b>1 237</b>	<b>1 656</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	589	257	332	146	180	111	152
	55-59 ans	637	291	346	53	55	238	291
	60-64 ans	695	283	412	44	46	239	366
	65-69 ans	598	276	322	46	41	230	281
	70-74 ans	514	245	269	34	25	211	244
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 033</b>	<b>1 352</b>	<b>1 681</b>	<b>323</b>	<b>347</b>	<b>1 029</b>	<b>1 334</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	227	103	124	74	91	29	33
	55-59 ans	184	76	108	28	39	48	69
	60-64 ans	176	65	111	22	28	43	83
	65-69 ans	182	85	97	32	20	53	77
	70-74 ans	129	52	77	17	17	35	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>898</b>	<b>381</b>	<b>517</b>	<b>173</b>	<b>195</b>	<b>208</b>	<b>322</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 349	5 172	6 177	2 846	3 321	2 326	2 856
	55-59 ans	10 205	4 496	5 709	764	770	3 732	4 939
	60-64 ans	11 542	5 110	6 432	772	719	4 338	5 713
	65-69 ans	9 937	4 462	5 475	536	476	3 926	4 999
	70-74 ans	6 734	3 097	3 637	334	297	2 763	3 340
	<b>50-74 ans</b>	<b>49 767</b>	<b>22 337</b>	<b>27 430</b>	<b>5 252</b>	<b>5 583</b>	<b>17 085</b>	<b>21 847</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	321	167	154	89	86	78	68
	55-59 ans	299	136	163	24	24	112	139
	60-64 ans	391	207	184	33	25	174	159
	65-69 ans	397	165	232	24	20	141	212
	70-74 ans	269	131	138	19	17	112	121

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 677</b>	<b>806</b>	<b>871</b>	<b>189</b>	<b>172</b>	<b>617</b>	<b>699</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	319	166	153	88	85	78	68
	55-59 ans	298	135	163	24	24	111	139
	60-64 ans	386	203	183	32	25	171	158
	65-69 ans	389	163	226	24	20	139	206
	70-74 ans	265	130	135	19	17	111	118
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 657</b>	<b>797</b>	<b>860</b>	<b>187</b>	<b>171</b>	<b>610</b>	<b>689</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	273	140	133	73	71	67	62
	55-59 ans	268	121	147	21	20	100	127
	60-64 ans	347	178	169	28	22	150	147
	65-69 ans	353	146	207	20	17	126	190
	70-74 ans	237	108	129	18	16	90	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 478</b>	<b>693</b>	<b>785</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>533</b>	<b>639</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	270	138	132	73	71	65	61
	55-59 ans	266	121	145	21	20	100	125
	60-64 ans	342	174	168	28	22	146	146
	65-69 ans	350	146	204	20	17	126	187
	70-74 ans	233	106	127	18	16	88	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 461</b>	<b>685</b>	<b>776</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>525</b>	<b>630</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	273	140	133	73	71	67	62
	55-59 ans	267	121	146	21	20	100	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	344	176	168	28	22	148	146
	65-69 ans	350	146	204	20	17	126	187
	70-74 ans	234	107	127	18	16	89	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 468</b>	<b>690</b>	<b>778</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>530</b>	<b>632</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	8	2	6	0	0	2	6
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	272	139	133	73	71	66	62
	55-59 ans	268	121	147	21	20	100	127
	60-64 ans	346	177	169	28	22	149	147
	65-69 ans	352	146	206	20	17	126	189
	70-74 ans	235	107	128	18	16	89	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 473</b>	<b>690</b>	<b>783</b>	<b>160</b>	<b>146</b>	<b>530</b>	<b>637</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	275	141	134	74	72	67	62
	55-59 ans	269	121	148	21	20	100	128
	60-64 ans	352	181	171	28	22	153	149
	65-69 ans	361	148	213	20	17	128	196
	70-74 ans	240	109	131	18	16	91	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 497</b>	<b>700</b>	<b>797</b>	<b>161</b>	<b>147</b>	<b>539</b>	<b>650</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	159	70	89	36	51	34	38
	55-59 ans	133	47	86	5	8	42	78
	60-64 ans	180	71	109	10	12	61	97
	65-69 ans	164	54	110	5	8	49	102
	70-74 ans	113	42	71	2	7	40	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>749</b>	<b>284</b>	<b>465</b>	<b>58</b>	<b>86</b>	<b>226</b>	<b>379</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	36	24	12	10	6	14	6
	55-59 ans	46	25	21	4	3	21	18
	60-64 ans	44	22	22	4	2	18	20
	65-69 ans	51	23	28	3	1	20	27
	70-74 ans	27	11	16	3	1	8	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>105</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>86</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	36	21	15	8	9	13	6
	55-59 ans	33	18	15	7	3	11	12
	60-64 ans	51	34	17	4	3	30	14
	65-69 ans	59	33	26	6	1	27	25
	70-74 ans	33	16	17	3	2	13	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>212</b>	<b>122</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>94</b>	<b>72</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	14	11	13	4	1	7
	55-59 ans	27	16	11	2	1	14	10
	60-64 ans	47	33	14	6	3	27	11
	65-69 ans	49	23	26	4	2	19	24
	70-74 ans	39	24	15	3	3	21	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>110</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>82</b>	<b>64</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	10	7	3	1	2	6	1
	60-64 ans	9	6	3	1	2	5	1
	65-69 ans	14	9	5	1	3	8	2
	70-74 ans	18	10	8	6	2	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	61	35	26	21	13	14	13
	55-59 ans	60	34	26	9	4	25	22
	60-64 ans	98	67	31	10	6	57	25
	65-69 ans	108	56	52	10	3	46	49
	70-74 ans	72	40	32	6	5	34	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>399</b>	<b>232</b>	<b>167</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>176</b>	<b>136</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25	14	11	13	4	1	7
	55-59 ans	27	16	11	2	1	14	10
	60-64 ans	47	33	14	6	3	27	11
	65-69 ans	49	23	26	4	2	19	24
	70-74 ans	39	24	15	3	3	21	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>110</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>82</b>	<b>64</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	9	8	9	2	0	6
	55-59 ans	23	14	9	2	0	12	9
	60-64 ans	35	23	12	3	3	20	9
	65-69 ans	34	17	17	3	1	14	16
	70-74 ans	32	20	12	1	3	19	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>83</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>49</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	25	14	11	12	3	2	8
	55-59 ans	29	17	12	3	1	14	11
	60-64 ans	49	35	14	4	3	31	11
	65-69 ans	55	30	25	6	1	24	24
	70-74 ans	40	25	15	2	3	23	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>121</b>	<b>77</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>94</b>	<b>66</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	10	7	3	1	2	6	1
	60-64 ans	9	6	3	1	2	5	1
	65-69 ans	14	9	5	1	3	8	2
	70-74 ans	18	10	8	6	2	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	10	7	3	1	2	6	1
	60-64 ans	9	6	3	1	2	5	1
	65-69 ans	14	9	5	1	3	8	2
	70-74 ans	17	9	8	6	2	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	0	2	4	0
	65-69 ans	10	6	4	1	2	5	2
	70-74 ans	12	6	6	4	2	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	7	4	3	1	2	3	1
	70-74 ans	9	5	4	4	2	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 60 - Oise

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	9	7	2	1	2	6	0
	60-64 ans	8	5	3	1	2	4	1
	65-69 ans	13	8	5	0	3	8	2
	70-74 ans	14	8	6	6	2	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	14	7	7	2	2	5	5
	60-64 ans	20	13	7	2	1	11	6
	65-69 ans	19	10	9	2	0	8	9
	70-74 ans	18	15	3	1	1	14	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>25</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	6,8	7,2	7,5	7,9	5,9	6,4
	55-59 ans	7,9	8	7,8	10,2	11,6	7,6	7,2
	60-64 ans	7,4	6,7	8	8,3	9,9	6,4	7,7
	65-69 ans	7,7	7,9	7,5	13,7	12,3	7,1	7,1
	70-74 ans	9,4	9,4	9,3	14,5	13,4	8,8	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2	2	2,5	2,7	1,2	1,1
	55-59 ans	1,8	1,7	1,9	3,5	4,8	1,3	1,4
	60-64 ans	1,5	1,3	1,7	2,8	3,7	1	1,4
	65-69 ans	1,8	1,9	1,7	5,6	4	1,3	1,5
	70-74 ans	1,9	1,7	2,1	4,8	5,4	1,3	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,2	71,4	72,8	66,4	66,4	79,3	82,2
	55-59 ans	77,6	79,3	76,2	65,4	58,5	83,2	80,8
	60-64 ans	79,8	81,3	78,8	66,7	62,2	84,8	81,5
	65-69 ans	76,7	76,5	76,8	59	67,2	81,3	78,5
	70-74 ans	79,9	82,5	77,7	66,7	59,5	85,8	80,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,2</b>	<b>78</b>	<b>76,5</b>	<b>65,1</b>	<b>64</b>	<b>83,2</b>	<b>80,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,2	2,5	3,1	2,6	3,4	2,4
	55-59 ans	2,9	3	2,9	3,1	3,1	3	2,8
	60-64 ans	3,4	4,1	2,9	4,3	3,5	4	2,8
	65-69 ans	4	3,7	4,2	4,5	4,2	3,6	4,2
	70-74 ans	4	4,2	3,8	5,7	5,7	4,1	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,4	99,4	98,9	98,8	100	100
	55-59 ans	99,7	99,3	100	100	100	99,1	100
	60-64 ans	98,7	98,1	99,5	97	100	98,3	99,4
	65-69 ans	98	98,8	97,4	100	100	98,6	97,2
	70-74 ans	98,5	99,2	97,8	100	100	99,1	97,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>	<b>98,9</b>	<b>99,4</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,6	84,3	86,9	83	83,5	85,9	91,2
	55-59 ans	89,9	89,6	90,2	87,5	83,3	90,1	91,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,9	87,7	92,3	87,5	88	87,7	93
	65-69 ans	90,7	89,6	91,6	83,3	85	90,6	92,2
	70-74 ans	89,4	83,1	95,6	94,7	94,1	81,1	95,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,2</b>	<b>87</b>	<b>91,3</b>	<b>85,6</b>	<b>85,4</b>	<b>87,4</b>	<b>92,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,6	99,2	100	100	97	98,4
	55-59 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,4
	60-64 ans	98,6	97,8	99,4	100	100	97,3	99,3
	65-69 ans	99,2	100	98,6	100	100	100	98,4
	70-74 ans	98,3	98,1	98,4	100	100	97,8	98,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	3	2	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	3	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>	<b>1 (1-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	115	121	108	116	115	127	100
	55-59 ans	100	108	94	95	88	110	95
	60-64 ans	116	124	108	149	110	119	108
	65-69 ans	103	100	106	99	133	101	103
	70-74 ans	104	108	100	84	97	113	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>102</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (60-134)	82 (56,5-122,5)	84 (64-144)	85 (55-109)	88 (66-155)	81 (57-134)	81,5 (59-115)
	55-59 ans	83,5 (54-113)	83 (49-115)	85 (58-113)	81 (49-130)	79,5 (60,5-101)	83,5 (49,5-111,5)	85 (57-113)
	60-64 ans	90 (59-122)	92 (60-120)	84 (58-127)	90 (63,5-113)	89 (57-115)	92 (59-122)	84 (58-129)
	65-69 ans	87 (56-123)	87,5 (53-134)	87 (57-122)	97 (47-121)	87 (71-147)	86,5 (53-135)	87 (57-119)
	70-74 ans	90 (58-126)	83 (60-125,5)	96 (56-126)	78,5 (56-112)	93 (50,5-125,5)	84 (65-127)	96 (58-126)
	<b>50-74 ans</b>	<b>86 (57-122)</b>	<b>86 (55-120)</b>	<b>87 (59-124)</b>	<b>85 (54,5-120)</b>	<b>87,5 (63-139)</b>	<b>86 (55-120)</b>	<b>87 (58-121)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,2	7,2	5,2	7,9	5,8	6,4	4,4
	55-59 ans	4,7	5,1	4,3	8,3	8,3	4,5	3,6
	60-64 ans	5,1	6,3	3,8	6,1	4	6,3	3,8
	65-69 ans	4,8	6,1	3,9	8,3	0	5,7	4,2
	70-74 ans	6,7	11,5	2,2	5,3	5,9	12,5	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,1</b>	<b>3,9</b>	<b>7,4</b>	<b>5,2</b>	<b>7</b>	<b>3,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,3	100	100	100	98,5	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	65-69 ans	99,7	100	99,5	100	100	100	99,5
	70-74 ans	99,2	99,1	99,2	100	100	98,9	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,8	49,6	66,4	48,6	70,8	50,7	61,3
	55-59 ans	49,4	38,8	58,1	23,8	40	42	60,9
	60-64 ans	51,1	39,2	63,7	35,7	54,5	39,9	65,1
	65-69 ans	45,4	36,5	51,6	25	47,1	38,3	52
	70-74 ans	47,1	38,5	54,2	11,1	43,8	44	55,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>40,6</b>	<b>58,3</b>	<b>36</b>	<b>58,5</b>	<b>41,9</b>	<b>58,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,1	17	9	13,5	8,3	20,9	9,7
	55-59 ans	17,1	20,7	14,2	19	15	21	14,1
	60-64 ans	12,5	12,2	12,9	14,3	9,1	11,8	13,4
	65-69 ans	14,1	15,5	13,1	15	5,9	15,6	13,8
	70-74 ans	11,3	10,1	12,2	16,7	6,3	8,8	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>15</b>	<b>12,4</b>	<b>14,9</b>	<b>8,8</b>	<b>15</b>	<b>13,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	0,7	1,5	1,4	0	0	3,2
	55-59 ans	2,2	1,7	2,7	0	0	2	3,1
	60-64 ans	1,1	2,2	0	3,6	0	2	0
	65-69 ans	1,4	1,4	1,4	0	0	1,6	1,5
	70-74 ans	1,3	1,8	0,8	0	0	2,2	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,1	14,9	11,2	10,8	12,5	19,4	9,7
	55-59 ans	12,3	14,9	10,1	33,3	15	11	9,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,5	18,8	9,9	14,3	13,6	19,6	9,4
	65-69 ans	16,3	22,3	12,2	30	5,9	21,1	12,8
	70-74 ans	13,8	14,7	13	16,7	12,5	14,3	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,2</b>	<b>17,4</b>	<b>11,3</b>	<b>17,4</b>	<b>12,2</b>	<b>17,4</b>	<b>11,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,1	9,9	8,2	17,6	5,6	1,5	11,3
	55-59 ans	10	13,2	7,4	9,5	5	14	7,8
	60-64 ans	13,4	18,2	8,2	21,4	13,6	17,6	7,4
	65-69 ans	13,6	15,5	12,2	20	11,8	14,8	12,2
	70-74 ans	16,3	22	11,5	16,7	18,8	23,1	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>15,7</b>	<b>9,7</b>	<b>17,4</b>	<b>8,8</b>	<b>15,2</b>	<b>9,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,1	2,1	0	4,1	0	0	0
	55-59 ans	3,7	5,8	2	4,8	10	6	0,8
	60-64 ans	2,6	3,3	1,8	3,6	9,1	3,3	0,7
	65-69 ans	3,9	6,1	2,3	5	17,6	6,3	1
	70-74 ans	7,5	9,2	6,1	33,3	12,5	4,4	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5</b>	<b>2,4</b>	<b>7,5</b>	<b>6,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,5	0	1,4	0	1,6
	55-59 ans	0,4	0	0,7	0	5	0	0
	60-64 ans	0,9	1,7	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1,1	0	1,9	0	5,9	0	1,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,5	0
	55-59 ans	1,1	0	2	0	5	0	1,6
	60-64 ans	1,7	2,2	1,2	3,6	0	2	1,3
	65-69 ans	1,4	2	0,9	0	0	2,3	1
	70-74 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,5	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	3,6	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	5	0	0	0,5
	70-74 ans	0,8	0,9	0,8	0	6,3	1,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	6,8	4,2	7,4	3,9	6	4,6
	55-59 ans	5,9	7,6	4,6	11,8	5,2	6,7	4,5
	60-64 ans	8,5	13,1	4,8	13	8,3	13,1	4,4
	65-69 ans	10,9	12,6	9,5	18,7	6,3	11,7	9,8
	70-74 ans	10,7	12,9	8,8	18	16,8	12,3	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>10,4</b>	<b>6,1</b>	<b>10,7</b>	<b>5,6</b>	<b>10,3</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,9</b>	<b>10</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	4,6	1,2	0,4	2,5
	55-59 ans	2,6	3,6	1,9	2,6	1,3	3,8	2
	60-64 ans	4,1	6,5	2,2	7,8	4,2	6,2	1,9
	65-69 ans	4,9	5,2	4,7	7,5	4,2	4,8	4,8
	70-74 ans	5,8	7,7	4,1	9	10,1	7,6	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	3,2	0,6	0	2,1
	55-59 ans	2,3	3,1	1,6	2,6	0	3,2	1,8
	60-64 ans	3	4,5	1,9	3,9	4,2	4,6	1,6
	65-69 ans	3,4	3,8	3,1	5,6	2,1	3,6	3,2
	70-74 ans	4,8	6,5	3,3	3	10,1	6,9	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	4,2	0,9	0,9	2,8
	55-59 ans	2,8	3,8	2,1	3,9	1,3	3,8	2,2
	60-64 ans	4,2	6,8	2,2	5,2	4,2	7,1	1,9
	65-69 ans	5,5	6,7	4,6	11,2	2,1	6,1	4,8
	70-74 ans	5,9	8,1	4,1	6	10,1	8,3	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>	<b>5,5</b>	<b>3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 60 - Oise

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,6	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	1	1,6	0,5	1,3	2,6	1,6	0,2
	60-64 ans	0,8	1,2	0,5	1,3	2,8	1,2	0,2
	65-69 ans	1,4	2	0,9	1,9	6,3	2	0,4
	70-74 ans	2,7	3,2	2,2	18	6,7	1,4	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	66,7	0	66,7	0	0	0
	55-59 ans	40	28,6	66,7	0	50	33,3	100
	60-64 ans	33,3	33,3	33,3	100	0	20	100
	65-69 ans	28,6	33,3	20	0	33,3	37,5	0
	70-74 ans	23,5	33,3	12,5	33,3	0	33,3	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,1</b>	<b>35,3</b>	<b>26,3</b>	<b>41,7</b>	<b>22,2</b>	<b>31,8</b>	<b>30</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)