

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22 465	10 334	12 131	5 841	6 722	4 493	5 409
	55-59 ans	21 250	9 267	11 983	1 678	1 812	7 589	10 171
	60-64 ans	23 183	10 265	12 918	1 576	1 812	8 689	11 106
	65-69 ans	19 382	8 697	10 685	1 159	1 327	7 538	9 358
	70-74 ans	11 880	5 072	6 808	592	754	4 480	6 054
	50-74 ans	98 160	43 635	54 525	10 846	12 427	32 789	42 098
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 192	546	646	322	368	224	278
	55-59 ans	1 139	481	658	130	139	351	519
	60-64 ans	1 290	565	725	126	140	439	585
	65-69 ans	1 028	435	593	86	97	349	496
	70-74 ans	779	304	475	59	66	245	409
	50-74 ans	5 428	2 331	3 097	723	810	1 608	2 287
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	719	326	393	172	196	154	197
	55-59 ans	756	316	440	68	68	248	372
	60-64 ans	918	412	506	64	76	348	430
	65-69 ans	730	314	416	46	51	268	365
	70-74 ans	511	202	309	22	29	180	280
	50-74 ans	3 634	1 570	2 064	372	420	1 198	1 644
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	473	220	253	150	172	70	81
	55-59 ans	383	165	218	62	71	103	147
	60-64 ans	372	153	219	62	64	91	155
	65-69 ans	298	121	177	40	46	81	131
	70-74 ans	268	102	166	37	37	65	129
	50-74 ans	1 794	761	1 033	351	390	410	643
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21 992	10 114	11 878	5 691	6 550	4 423	5 328
	55-59 ans	20 867	9 102	11 765	1 616	1 741	7 486	10 024
	60-64 ans	22 811	10 112	12 699	1 514	1 748	8 598	10 951
	65-69 ans	19 084	8 576	10 508	1 119	1 281	7 457	9 227
	70-74 ans	11 612	4 970	6 642	555	717	4 415	5 925
	50-74 ans	96 366	42 874	53 492	10 495	12 037	32 379	41 455
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	404	198	206	115	115	83	91
	55-59 ans	423	234	189	59	39	175	150
	60-64 ans	489	252	237	42	43	210	194
	65-69 ans	470	231	239	39	33	192	206
	70-74 ans	321	157	164	22	19	135	145

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 107	1 072	1 035	277	249	795	786
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	390	189	201	110	112	79	89
	55-59 ans	410	227	183	57	39	170	144
	60-64 ans	466	243	223	40	40	203	183
	65-69 ans	449	219	230	36	32	183	198
	70-74 ans	299	148	151	18	17	130	134
	50-74 ans	2 014	1 026	988	261	240	765	748
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	327	160	167	91	94	69	73
	55-59 ans	346	189	157	40	31	149	126
	60-64 ans	406	208	198	29	35	179	163
	65-69 ans	410	198	212	30	29	168	183
	70-74 ans	258	129	129	15	15	114	114
	50-74 ans	1 747	884	863	205	204	679	659
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	323	159	164	90	93	69	71
	55-59 ans	343	187	156	40	31	147	125
	60-64 ans	402	206	196	27	35	179	161
	65-69 ans	400	193	207	26	29	167	178
	70-74 ans	251	127	124	15	15	112	109
	50-74 ans	1 719	872	847	198	203	674	644
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	22	18	4	5	3	13	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	323	160	163	91	93	69	70
	55-59 ans	343	189	154	40	31	149	123

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	404	207	197	28	35	179	162
	65-69 ans	407	197	210	29	29	168	181
	70-74 ans	254	128	126	15	15	113	111
	50-74 ans	1 731	881	850	203	203	678	647
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	0	4	0	1	0	3
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	3	13	2	1	1	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	15	7	8	1	1	6	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	322	159	163	90	93	69	70
	55-59 ans	343	188	155	40	31	148	124
	60-64 ans	403	207	196	28	35	179	161
	65-69 ans	406	197	209	29	29	168	180
	70-74 ans	254	128	126	15	15	113	111
	50-74 ans	1 728	879	849	202	203	677	646
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	328	160	168	91	95	69	73
	55-59 ans	349	190	159	40	31	150	128
	60-64 ans	408	208	200	29	35	179	165
	65-69 ans	414	201	213	30	29	171	184
	70-74 ans	263	132	131	16	15	116	116
	50-74 ans	1 762	891	871	206	205	685	666
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	199	87	112	47	57	40	55
	55-59 ans	201	97	104	23	19	74	85
	60-64 ans	192	74	118	13	22	61	96
	65-69 ans	192	73	119	11	17	62	102
	70-74 ans	141	69	72	7	7	62	65
	50-74 ans	925	400	525	101	122	299	403

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	3	4	1	3	2	1
	55-59 ans	11	8	3	3	0	5	3
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	45	25	20	5	4	20	16
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	19	19	13	10	6	9
	55-59 ans	45	29	16	1	4	28	12
	60-64 ans	71	44	27	3	2	41	25
	65-69 ans	68	35	33	7	3	28	30
	70-74 ans	37	20	17	0	4	20	13
	50-74 ans	259	147	112	24	23	123	89
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36	24	12	14	10	10	2
	55-59 ans	46	31	15	6	5	25	10
	60-64 ans	73	54	19	5	3	49	16
	65-69 ans	61	35	26	5	5	30	21
	70-74 ans	38	22	16	3	1	19	15
	50-74 ans	254	166	88	33	24	133	64
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	19	8	11	5	8	3	3
	55-59 ans	17	9	8	3	2	6	6
	60-64 ans	29	18	11	4	2	14	9
	65-69 ans	43	26	17	7	3	19	14
	70-74 ans	23	13	10	4	1	9	9
	50-74 ans	131	74	57	23	16	51	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	6	3	1	2	5	1
	55-59 ans	7	6	1	2	1	4	0
	60-64 ans	12	5	7	3	2	2	5
	65-69 ans	10	4	6	0	0	4	6
	70-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
	50-74 ans	43	22	21	7	6	15	15
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	15	6	9	1	2	5	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	74	43	31	27	20	16	11
	55-59 ans	91	60	31	7	9	53	22
	60-64 ans	144	98	46	8	5	90	41
	65-69 ans	129	70	59	12	8	58	51
	70-74 ans	75	42	33	3	5	39	28
	50-74 ans	513	313	200	57	47	256	153
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	24	12	14	10	10	2
	55-59 ans	46	31	15	6	5	25	10
	60-64 ans	73	54	19	5	3	49	16
	65-69 ans	61	35	26	5	5	30	21
	70-74 ans	38	22	16	3	1	19	15
	50-74 ans	254	166	88	33	24	133	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	22	10	14	8	8	2
	55-59 ans	37	26	11	6	4	20	7
	60-64 ans	59	43	16	4	3	39	13
	65-69 ans	45	25	20	4	4	21	16
	70-74 ans	28	18	10	3	0	15	10
	50-74 ans	201	134	67	31	19	103	48
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	25	14	14	11	11	3
	55-59 ans	44	32	12	7	4	25	8
	60-64 ans	76	52	24	4	3	48	21
	65-69 ans	61	35	26	5	4	30	22
	70-74 ans	32	19	13	3	1	16	12
	50-74 ans	252	163	89	33	23	130	66
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	19	8	11	5	8	3	3
	55-59 ans	17	9	8	3	2	6	6
	60-64 ans	29	18	11	4	2	14	9
	65-69 ans	44	26	18	7	4	19	14
	70-74 ans	24	13	11	4	1	9	10
	50-74 ans	133	74	59	23	17	51	42
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	8	10	5	7	3	3
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	28	18	10	4	2	14	8
	65-69 ans	41	24	17	6	4	18	13
	70-74 ans	23	12	11	3	1	9	10
	50-74 ans	125	71	54	21	15	50	39
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	8	6	2	2	1	4	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	3	2	5	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	7	8	4	6	3	2
	55-59 ans	13	7	6	2	1	5	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	27	17	10	4	2	13	8
	65-69 ans	31	16	15	4	3	12	12
	70-74 ans	21	11	10	3	1	8	9
	50-74 ans	107	58	49	17	13	41	36
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	19	10	9	3	1	7	8
	65-69 ans	22	9	13	3	2	6	11
	70-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
	50-74 ans	77	40	37	14	8	26	29
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	1	4	0	3	1	1
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	8	7	1	1	1	6	0
	65-69 ans	9	7	2	1	1	6	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	30	18	12	3	5	15	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	11	4	7	0	1	4	6
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	29	14	15	4	2	10	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	8	2	6	2	1	0	5
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	24	12	12	8	2	4	10
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	5	5	1	3	4	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	7	10	4	7	3	3
	55-59 ans	12	7	5	2	0	5	5
	60-64 ans	27	17	10	4	2	13	8
	65-69 ans	35	19	16	4	4	15	12
	70-74 ans	22	12	10	3	1	9	9
	50-74 ans	113	62	51	17	14	45	37
A40- Perdus de vue	50-54 ans	47	24	23	18	14	6	9
	55-59 ans	41	25	16	14	6	11	10
	60-64 ans	36	21	15	6	4	15	11
	65-69 ans	19	12	7	6	1	6	6
	70-74 ans	26	11	15	1	1	10	14
	50-74 ans	169	93	76	45	26	48	50

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5	5,1
	55-59 ans	5,4	5,2	5,5	7,7	7,7	4,6	5,1
	60-64 ans	5,6	5,5	5,6	8	7,7	5,1	5,3
	65-69 ans	5,3	5	5,5	7,4	7,3	4,6	5,3
	70-74 ans	6,6	6	7	10	8,8	5,5	6,8
	50-74 ans	5,5	5,3	5,7	6,7	6,5	4,9	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	1,6	1,5
	55-59 ans	1,8	1,8	1,8	3,7	3,9	1,4	1,4
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	3,9	3,5	1	1,4
	65-69 ans	1,5	1,4	1,7	3,5	3,5	1,1	1,4
	70-74 ans	2,3	2	2,4	6,3	4,9	1,5	2,1
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	3,2	3,1	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,3	59,7	60,8	53,4	53,3	68,8	70,9
	55-59 ans	66,4	65,7	66,9	52,3	48,9	70,7	71,7
	60-64 ans	71,2	72,9	69,8	50,8	54,3	79,3	73,5
	65-69 ans	71	72,2	70,2	53,5	52,6	76,8	73,6
	70-74 ans	65,6	66,4	65,1	37,3	43,9	73,5	68,5
	50-74 ans	66,9	67,4	66,6	51,5	51,9	74,5	71,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2	1,7	2	1,8	1,9	1,7
	55-59 ans	2	2,6	1,6	3,7	2,2	2,3	1,5
	60-64 ans	2,1	2,5	1,9	2,8	2,5	2,4	1,8
	65-69 ans	2,5	2,7	2,3	3,5	2,6	2,6	2,2
	70-74 ans	2,8	3,2	2,5	4	2,6	3,1	2,4
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,6	2,1	2,5	1,9
50-74 ans **	2,2	2,5	1,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,5	95,5	97,6	95,7	97,4	95,2	97,8
	55-59 ans	96,9	97	96,8	96,6	100	97,1	96
	60-64 ans	95,3	96,4	94,1	95,2	93	96,7	94,3
	65-69 ans	95,5	94,8	96,2	92,3	97	95,3	96,1
	70-74 ans	93,1	94,3	92,1	81,8	89,5	96,3	92,4
	50-74 ans	95,6	95,7	95,5	94,2	96,4	96,2	95,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,8	84,7	83,1	82,7	83,9	87,3	82
	55-59 ans	84,4	83,3	85,8	70,2	79,5	87,6	87,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,1	85,6	88,8	72,5	87,5	88,2	89,1
	65-69 ans	91,3	90,4	92,2	83,3	90,6	91,8	92,4
	70-74 ans	86,3	87,2	85,4	83,3	88,2	87,7	85,1
	50-74 ans	86,7	86,2	87,3	78,5	85	88,8	88,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	99,4	98,2	98,9	98,9	100	97,3
	55-59 ans	99,1	98,9	99,4	100	100	98,7	99,2
	60-64 ans	99	99	99	93,1	100	100	98,8
	65-69 ans	97,6	97,5	97,6	86,7	100	99,4	97,3
	70-74 ans	97,3	98,4	96,1	100	100	98,2	95,6
	50-74 ans	98,4	98,6	98,1	96,6	99,5	99,3	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	3	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	3	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
	50-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	76	81	84	87	66	73
	55-59 ans	78	82	74	96	95	78	69
	60-64 ans	74	82	65	87	66	81	65
	65-69 ans	72	74	71	109	92	68	67
	70-74 ans	66	67	65	64	78	67	63
	50-74 ans	74	77	71	89	85	73	67
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (41-86)	53,5 (41,5-79,5)	57 (39-90)	56 (43-84)	61 (37-98)	52 (36-75)	55 (42-70)
	55-59 ans	56 (40-83)	58 (42-91)	55 (40-76)	56,5 (43,5-87)	55 (45-92)	58 (40-93)	54 (38-74)
	60-64 ans	55 (39-80)	57 (41-82)	50 (35-77)	63 (36-112)	49 (31-94)	57 (41-82)	50 (35-72)
	65-69 ans	54 (40-77)	57,5 (41-77)	50 (38,5-77)	70,5 (42-107)	59 (41-95)	55 (40-74,5)	50 (38-74)
	70-74 ans	50 (36-73)	49 (36-70)	51 (36-74)	48 (35-91)	41 (26-68)	49,5 (36-70)	52 (36-74)
	50-74 ans	54 (39-79)	56 (40-80)	52 (38-77)	57 (42-91)	55 (39,5-94)	55 (39-78)	52 (38-74)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,6	12,1	11,2	15,7	12,2	7,2	9,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,7	10,7	8,5	23,7	15,4	6,3	6,7
	60-64 ans	7,4	8,3	6,3	14,3	9,3	7,1	5,7
	65-69 ans	4	5,2	2,9	15,4	3	3,1	2,9
	70-74 ans	8,1	7	9,1	4,5	5,3	7,4	9,7
	50-74 ans	8	8,7	7,3	16,2	10,4	6	6,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	99,4	97,6	98,9	98,9	100	95,9
	55-59 ans	99,1	99,5	98,7	100	100	99,3	98,4
	60-64 ans	99,3	99,5	99	96,6	100	100	98,8
	65-69 ans	99	99,5	98,6	96,7	100	100	98,4
	70-74 ans	98,4	99,2	97,7	100	100	99,1	97,4
	50-74 ans	98,9	99,4	98,4	98,5	99,5	99,7	98
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,7	54,4	66,7	51,6	60	58	75,3
	55-59 ans	57,6	51,1	65,4	57,5	61,3	49,3	66,4
	60-64 ans	47,1	35,6	59	44,8	62,9	34,1	58,2
	65-69 ans	46,4	36,3	55,9	36,7	58,6	36,3	55,4
	70-74 ans	53,6	52,3	55	43,8	46,7	53,4	56
	50-74 ans	52,5	44,9	60,3	49	59,5	43,6	60,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,1	1,9	2,4	1,1	3,2	2,9	1,4
	55-59 ans	3,2	4,2	1,9	7,5	0	3,3	2,3
	60-64 ans	2,2	2,9	1,5	3,4	0	2,8	1,8
	65-69 ans	2,4	3	1,9	0	0	3,5	2,2
	70-74 ans	3	1,5	4,6	0	6,7	1,7	4,3
	50-74 ans	2,6	2,8	2,3	2,4	2	2,9	2,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,3	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	1	0	0,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,6	11,9	11,3	14,3	10,5	8,7	12,3
	55-59 ans	12,9	15,3	10,1	2,5	12,9	18,7	9,4
	60-64 ans	17,4	21,2	13,5	10,3	5,7	22,9	15,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,4	17,4	15,5	23,3	10,3	16,4	16,3
	70-74 ans	14,1	15,2	13	0	26,7	17,2	11,2
	50-74 ans	14,7	16,5	12,9	11,7	11,2	18	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	15	7,1	15,4	10,5	14,5	2,7
	55-59 ans	13,2	16,3	9,4	15	16,1	16,7	7,8
	60-64 ans	17,9	26	9,5	17,2	8,6	27,4	9,7
	65-69 ans	14,7	17,4	12,2	16,7	17,2	17,5	11,4
	70-74 ans	14,4	16,7	12,2	18,8	6,7	16,4	12,9
	50-74 ans	14,4	18,6	10,1	16	11,7	19,4	9,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	5	6,5	5,5	8,4	4,3	4,1
	55-59 ans	4,9	4,7	5	7,5	6,5	4	4,7
	60-64 ans	7,1	8,7	5,5	13,8	5,7	7,8	5,5
	65-69 ans	10,4	12,9	8	23,3	10,3	11,1	7,6
	70-74 ans	8,7	9,8	7,6	25	6,7	7,8	7,8
	50-74 ans	7,4	8,3	6,5	11,2	7,8	7,4	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	3,8	1,8	1,1	2,1	7,2	1,4
	55-59 ans	2	3,2	0,6	5	3,2	2,7	0
	60-64 ans	2,9	2,4	3,5	10,3	5,7	1,1	3
	65-69 ans	2,4	2	2,8	0	0	2,3	3,3
	70-74 ans	1,9	0,8	3,1	6,3	6,7	0	2,6
	50-74 ans	2,4	2,5	2,4	3,4	2,9	2,2	2,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	1,1	2,5	2,5	0	0,7	3,1
	60-64 ans	0,5	0	1	0	5,7	0	0
	65-69 ans	1,2	2	0,5	0	0	2,3	0,5
	70-74 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	1,7
	50-74 ans	0,9	0,7	1	0,5	1	0,7	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0	0	0,7	0,8
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	65-69 ans	0,7	1	0,5	0	0	1,2	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,5	2,3	0,8	0	0	2,6	0,9
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0,5	0	0,9	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,3	2,6	4,7	3,1	3,6	2,1
	55-59 ans	4,4	6,6	2,6	4,3	5,2	7,1	2,2
	60-64 ans	6,3	9,7	3,6	5,3	2,9	10,5	3,7
	65-69 ans	6,8	8,2	5,6	10,7	6,2	7,8	5,5
	70-74 ans	6,5	8,5	5	5,4	7	8,8	4,7
	50-74 ans	5,3	7,3	3,7	5,4	3,9	7,9	3,7
	50-74 ans **	5,3	7,1	3,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,4	1	2,5	1,5	2,3	0,4
	55-59 ans	2,2	3,4	1,3	3,7	2,9	3,3	1
	60-64 ans	3,2	5,3	1,5	3,3	1,7	5,7	1,5
	65-69 ans	3,2	4,1	2,5	4,5	3,9	4	2,3
	70-74 ans	3,3	4,4	2,4	5,4	1,4	4,3	2,5
	50-74 ans	2,6	3,9	1,6	3,1	2	4,1	1,5
	50-74 ans **	2,7	3,8	1,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,2	0,8	2,5	1,2	1,8	0,4
	55-59 ans	1,8	2,9	0,9	3,7	2,3	2,7	0,7
	60-64 ans	2,6	4,3	1,3	2,6	1,7	4,5	1,2
	65-69 ans	2,4	2,9	1,9	3,6	3,1	2,8	1,7
	70-74 ans	2,4	3,6	1,5	5,4	0	3,4	1,7
	50-74 ans	2,1	3,1	1,3	3	1,6	3,2	1,2
	50-74 ans **	2,1	3,1	1,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,5	1,2	2,5	1,7	2,5	0,6
	55-59 ans	2,1	3,5	1	4,3	2,3	3,3	0,8
	60-64 ans	3,3	5,1	1,9	2,6	1,7	5,6	1,9
	65-69 ans	3,2	4,1	2,5	4,5	3,1	4	2,4
	70-74 ans	2,8	3,8	2	5,4	1,4	3,6	2
	50-74 ans	2,6	3,8	1,7	3,1	1,9	4	1,6
	50-74 ans **	2,6	3,7	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	0,9	1,2	0,7	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1	0,7	1,9	1,1	0,8	0,6
	60-64 ans	1,3	1,8	0,9	2,6	1,1	1,6	0,8
	65-69 ans	2,3	3	1,7	6,3	3,1	2,5	1,5
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	7,2	1,4	2	1,7
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	2,2	1,4	1,6	1
	50-74 ans **	1,3	1,6	1,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	12,5	20	20	14,3	0	33,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	19,5	25	11,8	33,3	25	22,2	7,7
	70-74 ans	8,7	8,3	9,1	0	0	11,1	10
	50-74 ans	10,4	11,3	9,3	14,3	13,3	10	7,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)