

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 645	8 399	9 246	5 113	5 607	3 286	3 639
	55-59 ans	17 910	8 239	9 671	922	944	7 317	8 727
	60-64 ans	18 960	8 925	10 035	637	571	8 288	9 464
	65-69 ans	15 170	7 181	7 989	371	357	6 810	7 632
	70-74 ans	12 036	5 491	6 545	214	200	5 277	6 345
	50-74 ans	81 721	38 235	43 486	7 257	7 679	30 978	35 807
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 080	515	565	361	401	154	164
	55-59 ans	994	462	532	78	89	384	443
	60-64 ans	1 134	509	625	58	66	451	559
	65-69 ans	977	487	490	45	40	442	450
	70-74 ans	913	408	505	32	28	376	477
	50-74 ans	5 098	2 381	2 717	574	624	1 807	2 093
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	648	302	346	203	240	99	106
	55-59 ans	666	315	351	41	48	274	303
	60-64 ans	773	350	423	22	28	328	395
	65-69 ans	688	336	352	24	25	312	327
	70-74 ans	604	272	332	11	13	261	319
	50-74 ans	3 379	1 575	1 804	301	354	1 274	1 450
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	432	213	219	158	161	55	58
	55-59 ans	328	147	181	37	41	110	140
	60-64 ans	361	159	202	36	38	123	164
	65-69 ans	289	151	138	21	15	130	123
	70-74 ans	309	136	173	21	15	115	158
	50-74 ans	1 719	806	913	273	270	533	643
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17 213	8 186	9 027	4 955	5 446	3 231	3 581
	55-59 ans	17 582	8 092	9 490	885	903	7 207	8 587
	60-64 ans	18 599	8 766	9 833	601	533	8 165	9 300
	65-69 ans	14 881	7 030	7 851	350	342	6 680	7 509
	70-74 ans	11 727	5 355	6 372	193	185	5 162	6 187
	50-74 ans	80 002	37 429	42 573	6 984	7 409	30 445	35 164
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	358	199	159	130	102	69	57
	55-59 ans	372	210	162	30	17	180	145
	60-64 ans	465	257	208	23	22	234	186
	65-69 ans	374	213	161	11	3	202	158
	70-74 ans	351	192	159	17	10	175	149

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 920	1 071	849	211	154	860	695
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	353	196	157	128	102	68	55
	55-59 ans	365	206	159	29	17	177	142
	60-64 ans	458	253	205	23	22	230	183
	65-69 ans	366	208	158	10	3	198	155
	70-74 ans	343	184	159	17	10	167	149
	50-74 ans	1 885	1 047	838	207	154	840	684
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	337	185	152	119	98	66	54
	55-59 ans	348	197	151	25	17	172	134
	60-64 ans	428	234	194	21	19	213	175
	65-69 ans	333	193	140	10	3	183	137
	70-74 ans	309	167	142	14	8	153	134
	50-74 ans	1 755	976	779	189	145	787	634
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	329	181	148	115	94	66	54
	55-59 ans	334	186	148	24	17	162	131
	60-64 ans	420	231	189	20	18	211	171
	65-69 ans	324	187	137	9	3	178	134
	70-74 ans	292	160	132	12	8	148	124
	50-74 ans	1 699	945	754	180	140	765	614
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	9	8	1	0	0	8	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	23	18	5	1	2	17	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	334	183	151	117	97	66	54
	55-59 ans	344	195	149	25	17	170	132

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	423	232	191	21	19	211	172
	65-69 ans	328	191	137	10	3	181	134
	70-74 ans	303	166	137	14	8	152	129
	50-74 ans	1 732	967	765	187	144	780	621
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	23	9	14	2	1	7	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	337	185	152	119	98	66	54
	55-59 ans	348	197	151	25	17	172	134
	60-64 ans	428	234	194	21	19	213	175
	65-69 ans	333	193	140	10	3	183	137
	70-74 ans	309	167	142	14	8	153	134
	50-74 ans	1 755	976	779	189	145	787	634
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	338	186	152	120	98	66	54
	55-59 ans	348	197	151	25	17	172	134
	60-64 ans	428	234	194	21	19	213	175
	65-69 ans	333	193	140	10	3	183	137
	70-74 ans	311	169	142	14	8	155	134
	50-74 ans	1 758	979	779	190	145	789	634
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	196	92	104	61	63	31	41
	55-59 ans	180	82	98	10	10	72	88
	60-64 ans	196	94	102	3	11	91	91
	65-69 ans	139	63	76	4	1	59	75
	70-74 ans	129	54	75	8	4	46	71
	50-74 ans	840	385	455	86	89	299	366

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	9	12	6	10	3	2
	55-59 ans	26	17	9	1	1	16	8
	60-64 ans	23	13	10	1	0	12	10
	65-69 ans	18	10	8	0	0	10	8
	70-74 ans	16	8	8	1	0	7	8
	50-74 ans	104	57	47	9	11	48	36
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	28	12	16	8	12	4
	55-59 ans	44	23	21	0	4	23	17
	60-64 ans	74	48	26	6	2	42	24
	65-69 ans	62	39	23	1	0	38	23
	70-74 ans	46	27	19	0	0	27	19
	50-74 ans	266	165	101	23	14	142	87
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	66	46	20	31	16	15	4
	55-59 ans	66	51	15	9	1	42	14
	60-64 ans	100	60	40	8	2	52	38
	65-69 ans	72	46	26	1	2	45	24
	70-74 ans	70	45	25	2	3	43	22
	50-74 ans	374	248	126	51	24	197	102
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	24	19	5	5	1	14	4
	60-64 ans	22	13	9	3	3	10	6
	65-69 ans	33	28	5	4	0	24	5
	70-74 ans	35	25	10	2	0	23	10
	50-74 ans	122	90	32	17	5	73	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	26	20	6	0	0	20	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	2	5	0	0	2	5
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	16	7	9	1	1	6	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	106	74	32	47	24	27	8
	55-59 ans	110	74	36	9	5	65	31
	60-64 ans	174	108	66	14	4	94	62
	65-69 ans	134	85	49	2	2	83	47
	70-74 ans	116	72	44	2	3	70	41
	50-74 ans	640	413	227	74	38	339	189
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	66	46	20	31	16	15	4
	55-59 ans	66	51	15	9	1	42	14
	60-64 ans	100	60	40	8	2	52	38
	65-69 ans	72	46	26	1	2	45	24
	70-74 ans	70	45	25	2	3	43	22
	50-74 ans	374	248	126	51	24	197	102

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	55	35	20	23	16	12	4
	55-59 ans	48	38	10	7	1	31	9
	60-64 ans	79	50	29	7	1	43	28
	65-69 ans	53	33	20	1	2	32	18
	70-74 ans	48	32	16	0	3	32	13
	50-74 ans	283	188	95	38	23	150	72
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	64	43	21	26	16	17	5
	55-59 ans	54	43	11	7	1	36	10
	60-64 ans	88	58	30	7	1	51	29
	65-69 ans	70	46	24	1	2	45	22
	70-74 ans	57	39	18	1	3	38	15
	50-74 ans	333	229	104	42	23	187	81
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	24	19	5	5	1	14	4
	60-64 ans	22	13	9	3	3	10	6
	65-69 ans	33	28	5	4	0	24	5
	70-74 ans	35	25	10	2	0	23	10
	50-74 ans	122	90	32	17	5	73	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	21	17	4	4	1	13	3
	60-64 ans	19	12	7	2	2	10	5
	65-69 ans	30	26	4	3	0	23	4
	70-74 ans	34	24	10	1	0	23	10
	50-74 ans	111	84	27	13	3	71	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	21	17	4	4	1	13	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	12	7	2	2	10	5
	65-69 ans	30	26	4	3	0	23	4
	70-74 ans	32	22	10	1	0	21	10
	50-74 ans	109	82	27	13	3	69	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	1	0	2	2
	55-59 ans	17	13	4	4	1	9	3
	60-64 ans	15	8	7	1	2	7	5
	65-69 ans	26	24	2	3	0	21	2
	70-74 ans	26	17	9	1	0	16	9
	50-74 ans	89	65	24	10	3	55	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	20	17	3	3	0	14	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	15	14	1	1	0	13	1
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	41	32	9	1	2	31	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	19	13	6	5	0	8	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	21	15	6	3	0	12	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	19	16	3	4	1	12	2
	60-64 ans	19	12	7	2	2	10	5
	65-69 ans	30	26	4	3	0	23	4
	70-74 ans	32	22	10	1	0	21	10
	50-74 ans	107	81	26	13	3	68	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	7	3	6	2	1	1
	55-59 ans	11	5	6	1	0	4	6
	60-64 ans	18	10	8	2	2	8	6
	65-69 ans	21	8	13	0	0	8	13
	70-74 ans	18	12	6	3	1	9	5
	50-74 ans	78	42	36	12	5	30	31

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,1	6,1	7,1	7,2	4,7	4,5
	55-59 ans	5,5	5,6	5,5	8,5	9,4	5,2	5,1
	60-64 ans	6	5,7	6,2	9,1	11,6	5,4	5,9
	65-69 ans	6,4	6,8	6,1	12,1	11,2	6,5	5,9
	70-74 ans	7,6	7,4	7,7	15	14	7,1	7,5
	50-74 ans	6,2	6,2	6,2	7,9	8,1	5,8	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	3,1	2,9	1,7	1,6
	55-59 ans	1,8	1,8	1,9	4	4,3	1,5	1,6
	60-64 ans	1,9	1,8	2	5,7	6,7	1,5	1,7
	65-69 ans	1,9	2,1	1,7	5,7	4,2	1,9	1,6
	70-74 ans	2,6	2,5	2,6	9,8	7,5	2,2	2,5
	50-74 ans	2,1	2,1	2,1	3,8	3,5	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60	58,6	61,2	56,2	59,9	64,3	64,6
	55-59 ans	67	68,2	66	52,6	53,9	71,4	68,4
	60-64 ans	68,2	68,8	67,7	37,9	42,4	72,7	70,7
	65-69 ans	70,4	69	71,8	53,3	62,5	70,6	72,7
	70-74 ans	66,2	66,7	65,7	34,4	46,4	69,4	66,9
	50-74 ans	66,3	66,1	66,4	52,4	56,7	70,5	69,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,6	1,9	2,1	1,6
	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	3,4	1,9	2,5	1,7
	60-64 ans	2,5	2,9	2,1	3,8	4,1	2,9	2
	65-69 ans	2,5	3	2,1	3,1	0,9	3	2,1
	70-74 ans	3	3,6	2,5	8,8	5,4	3,4	2,4
	50-74 ans	2,4	2,9	2	3	2,1	2,8	2
50-74 ans **	2,4	2,8	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,5	98,7	98,5	100	98,6	96,5
	55-59 ans	98,1	98,1	98,1	96,7	100	98,3	97,9
	60-64 ans	98,5	98,4	98,6	100	100	98,3	98,4
	65-69 ans	97,9	97,7	98,1	90,9	100	98	98,1
	70-74 ans	97,7	95,8	100	100	100	95,4	100
	50-74 ans	98,2	97,8	98,7	98,1	100	97,7	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,5	94,4	96,8	93	96,1	97,1	98,2
	55-59 ans	95,3	95,6	95	86,2	100	97,2	94,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,4	92,5	94,6	91,3	86,4	92,6	95,6
	65-69 ans	91	92,8	88,6	100	100	92,4	88,4
	70-74 ans	90,1	90,8	89,3	82,4	80	91,6	89,9
	50-74 ans	93,1	93,2	93	91,3	94,2	93,7	92,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	97,8	97,4	96,6	95,9	100	100
	55-59 ans	96	94,4	98	96	100	94,2	97,8
	60-64 ans	98,1	98,7	97,4	95,2	94,7	99,1	97,7
	65-69 ans	97,3	96,9	97,9	90	100	97,3	97,8
	70-74 ans	94,5	95,8	93	85,7	100	96,7	92,5
	50-74 ans	96,8	96,8	96,8	95,2	96,6	97,2	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	106	121	107	113	104	136
	55-59 ans	106	107	104	83	89	110	105
	60-64 ans	95	98	92	77	84	100	93
	65-69 ans	94	91	98	151	136	87	97
	70-74 ans	99	95	104	79	205	97	98
	50-74 ans	101	99	103	101	112	99	101
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (53-111)	77 (51-109)	74 (55-116,5)	76 (51-109)	70,5 (56-115)	80,5 (49-113)	77,5 (52-118)
	55-59 ans	73,5 (50-103,5)	76 (50-106)	72 (50-100)	76 (56-100)	80 (64-112)	76,5 (50-106)	72 (49-98)
	60-64 ans	69 (49-98,5)	71 (51-102)	67 (46-93)	76 (57-98)	79 (49-106)	71 (51-102)	64 (45-92)
	65-69 ans	73 (54-97)	73 (51-97)	72 (57-101,5)	81 (52-97)	131 (70-207)	73 (50-97)	71 (57-97)
	70-74 ans	75 (52-111)	74 (51-110)	75 (52-112)	59 (40-91)	98,5 (60,5-272,5)	76 (55-112)	74,5 (52-111)
	50-74 ans	72 (51-105)	74 (51-105)	72 (51-105)	73 (51-106)	74 (57-115)	74 (51-104)	71 (50-101)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,8	3,5	1,9	4,6	2	1,4	1,8
	55-59 ans	3	2,4	3,7	3,3	0	2,2	4,1
	60-64 ans	3,9	3,9	3,8	8,7	9,1	3,4	3,2
	65-69 ans	5,6	3,8	8,1	0	0	4	8,2
	70-74 ans	5,1	6,3	3,8	17,6	10	5,1	3,4
	50-74 ans	4,1	3,9	4,2	5,7	3,2	3,5	4,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	49,5	68,4	50,8	64,3	47	75,9
	55-59 ans	51,7	41,6	64,9	40	58,8	41,9	65,7
	60-64 ans	45,8	40,2	52,6	14,3	57,9	42,7	52
	65-69 ans	41,7	32,6	54,3	40	33,3	32,2	54,7
	70-74 ans	41,5	32	52,8	57,1	50	29,7	53
	50-74 ans	47,8	39,3	58,4	45,3	61,4	37,9	57,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	4,8	7,9	5	10,2	4,5	3,7
	55-59 ans	7,5	8,6	6	4	5,9	9,3	6
	60-64 ans	5,4	5,6	5,2	4,8	0	5,6	5,7
	65-69 ans	5,4	5,2	5,7	0	0	5,5	5,8
	70-74 ans	5,1	4,7	5,6	7,1	0	4,5	6
	50-74 ans	5,9	5,8	6	4,7	7,6	6,1	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,8	0	0	1,9
	55-59 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	60-64 ans	0,9	0,9	1	0	5,3	0,9	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,6	0	7,1	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	1,1	0,7	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,8	15,1	7,9	13,3	8,2	18,2	7,4
	55-59 ans	12,6	11,7	13,9	0	23,5	13,4	12,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,3	20,5	13,4	28,6	10,5	19,7	13,7
	65-69 ans	18,6	20,2	16,4	10	0	20,8	16,8
	70-74 ans	14,8	16	13,4	0	0	17,4	14,2
	50-74 ans	15,1	16,9	13	12,1	9,7	18	13,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,5	24,7	13,2	25,8	16,3	22,7	7,4
	55-59 ans	19	25,9	9,9	36	5,9	24,4	10,4
	60-64 ans	23,4	25,6	20,6	38,1	10,5	24,4	21,7
	65-69 ans	21,6	23,8	18,6	10	66,7	24,6	17,5
	70-74 ans	22,5	26,6	17,6	14,3	37,5	27,7	16,4
	50-74 ans	21,3	25,3	16,2	26,8	16,6	25	16,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	2,7	2	2,5	1	3	3,7
	55-59 ans	6,9	9,6	3,3	20	5,9	8,1	3
	60-64 ans	5,1	5,6	4,6	14,3	15,8	4,7	3,4
	65-69 ans	9,9	14,5	3,6	40	0	13,1	3,6
	70-74 ans	11,3	14,8	7	14,3	0	14,8	7,5
	50-74 ans	6,9	9,2	4,1	8,9	3,4	9,3	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,1	0	0	0	3	0
	55-59 ans	1,7	2	1,3	0	0	2,3	1,5
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	2,1	3,1	0,7	0	0	3,3	0,7
	70-74 ans	2,9	3,6	2,1	0	0	3,9	2,2
	50-74 ans	1,5	2	0,8	0	0	2,5	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,7
	60-64 ans	1,6	0,9	2,6	0	0	0,9	2,9
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0	0	0,5	0,7
	70-74 ans	1,6	1,8	1,4	0	12,5	1,9	0,7
	50-74 ans	0,9	0,7	1,2	0,5	0,7	0,8	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9	3,5	9,5	4,4	8,4	2,2
	55-59 ans	6,3	9,1	3,8	10,2	5,5	9	3,6
	60-64 ans	9,4	12,3	6,7	23,3	7,5	11,5	6,7
	65-69 ans	9	12,1	6,2	5,7	5,8	12,4	6,3
	70-74 ans	9,9	13,4	6,9	10,4	16,2	13,6	6,6
	50-74 ans	8	11	5,3	10,6	5,1	11,1	5,4
	50-74 ans **	7,9	10,8	5,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	5,6	2,2	6,3	2,9	4,6	1,1
	55-59 ans	3,8	6,3	1,6	10,2	1,1	5,8	1,6
	60-64 ans	5,4	6,8	4,1	13,3	3,8	6,4	4,1
	65-69 ans	4,8	6,5	3,3	2,9	5,8	6,7	3,2
	70-74 ans	6	8,4	3,9	10,4	16,2	8,3	3,6
	50-74 ans	4,7	6,6	3	7,3	3,2	6,5	2,9
	50-74 ans **	4,6	6,6	2,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,3	2,2	4,6	2,9	3,7	1,1
	55-59 ans	2,7	4,7	1,1	7,9	1,1	4,3	1
	60-64 ans	4,2	5,7	2,9	11,6	1,9	5,3	3
	65-69 ans	3,6	4,7	2,5	2,9	5,8	4,8	2,4
	70-74 ans	4,1	6	2,5	0	16,2	6,2	2,1
	50-74 ans	3,5	5	2,2	5,4	3,1	4,9	2
	50-74 ans **	3,5	5	2,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,3	2,3	5,2	2,9	5,3	1,4
	55-59 ans	3,1	5,3	1,2	7,9	1,1	5	1,2
	60-64 ans	4,7	6,6	3,1	11,6	1,9	6,2	3,1
	65-69 ans	4,7	6,5	3,1	2,9	5,8	6,7	2,9
	70-74 ans	4,9	7,3	2,8	5,2	16,2	7,4	2,4
	50-74 ans	4,2	6,1	2,4	6	3,1	6,1	2,3
	50-74 ans **	4,1	6	2,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,3	0,6	0,2	0,6	0,6
	55-59 ans	1,4	2,3	0,5	5,6	1,1	1,9	0,5
	60-64 ans	1,2	1,5	0,9	5	5,6	1,2	0,6
	65-69 ans	2,2	4	0,6	11,4	0	3,6	0,7
	70-74 ans	3	4,7	1,6	10,4	0	4,5	1,6
	50-74 ans	1,5	2,4	0,8	2,4	0,7	2,4	0,8
	50-74 ans **	1,5	2,3	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,9	8,3	0	0	0	8,7	0
	50-74 ans	1,8	2,4	0	0	0	2,8	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)