

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 8 024 | 3 566 | 4 458 | 2 039 | 2 530 | 1 527 | 1 928 |
| | 55-59 ans | 9 961 | 4 368 | 5 593 | 382 | 450 | 3 986 | 5 143 |
| | 60-64 ans | 11 768 | 5 161 | 6 607 | 337 | 363 | 4 824 | 6 244 |
| | 65-69 ans | 10 827 | 4 728 | 6 099 | 196 | 201 | 4 532 | 5 898 |
| | 70-74 ans | 7 562 | 3 319 | 4 243 | 95 | 110 | 3 224 | 4 133 |
| | 50-74 ans | 48 142 | 21 142 | 27 000 | 3 049 | 3 654 | 18 093 | 23 346 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 390 | 181 | 209 | 102 | 114 | 79 | 95 |
| | 55-59 ans | 472 | 191 | 281 | 41 | 35 | 150 | 246 |
| | 60-64 ans | 515 | 220 | 295 | 32 | 28 | 188 | 267 |
| | 65-69 ans | 482 | 222 | 260 | 16 | 15 | 206 | 245 |
| | 70-74 ans | 393 | 179 | 214 | 3 | 10 | 176 | 204 |
| | 50-74 ans | 2 252 | 993 | 1 259 | 194 | 202 | 799 | 1 057 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 276 | 126 | 150 | 67 | 71 | 59 | 79 |
| | 55-59 ans | 341 | 139 | 202 | 27 | 16 | 112 | 186 |
| | 60-64 ans | 389 | 160 | 229 | 16 | 19 | 144 | 210 |
| | 65-69 ans | 385 | 168 | 217 | 9 | 10 | 159 | 207 |
| | 70-74 ans | 307 | 139 | 168 | 2 | 6 | 137 | 162 |
| | 50-74 ans | 1 698 | 732 | 966 | 121 | 122 | 611 | 844 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 114 | 55 | 59 | 35 | 43 | 20 | 16 |
| | 55-59 ans | 131 | 52 | 79 | 14 | 19 | 38 | 60 |
| | 60-64 ans | 126 | 60 | 66 | 16 | 9 | 44 | 57 |
| | 65-69 ans | 97 | 54 | 43 | 7 | 5 | 47 | 38 |
| | 70-74 ans | 86 | 40 | 46 | 1 | 4 | 39 | 42 |
| | 50-74 ans | 554 | 261 | 293 | 73 | 80 | 188 | 213 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 7 910 | 3 511 | 4 399 | 2 004 | 2 487 | 1 507 | 1 912 |
| | 55-59 ans | 9 830 | 4 316 | 5 514 | 368 | 431 | 3 948 | 5 083 |
| | 60-64 ans | 11 642 | 5 101 | 6 541 | 321 | 354 | 4 780 | 6 187 |
| | 65-69 ans | 10 730 | 4 674 | 6 056 | 189 | 196 | 4 485 | 5 860 |
| | 70-74 ans | 7 476 | 3 279 | 4 197 | 94 | 106 | 3 185 | 4 091 |
| | 50-74 ans | 47 588 | 20 881 | 26 707 | 2 976 | 3 574 | 17 905 | 23 133 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 143 | 80 | 63 | 50 | 45 | 30 | 18 |
| | 55-59 ans | 198 | 112 | 86 | 14 | 6 | 98 | 80 |
| | 60-64 ans | 278 | 133 | 145 | 17 | 11 | 116 | 134 |
| | 65-69 ans | 230 | 104 | 126 | 6 | 3 | 98 | 123 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 218 | 100 | 118 | 4 | 7 | 96 | 111 |
| | 50-74 ans | 1 067 | 529 | 538 | 91 | 72 | 438 | 466 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 142 | 79 | 63 | 49 | 45 | 30 | 18 |
| | 55-59 ans | 197 | 111 | 86 | 14 | 6 | 97 | 80 |
| | 60-64 ans | 273 | 132 | 141 | 16 | 10 | 116 | 131 |
| | 65-69 ans | 227 | 103 | 124 | 6 | 3 | 97 | 121 |
| | 70-74 ans | 213 | 96 | 117 | 4 | 7 | 92 | 110 |
| | 50-74 ans | 1 052 | 521 | 531 | 89 | 71 | 432 | 460 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 120 | 68 | 52 | 40 | 37 | 28 | 15 |
| | 55-59 ans | 175 | 98 | 77 | 12 | 5 | 86 | 72 |
| | 60-64 ans | 241 | 117 | 124 | 15 | 8 | 102 | 116 |
| | 65-69 ans | 198 | 89 | 109 | 4 | 3 | 85 | 106 |
| | 70-74 ans | 185 | 81 | 104 | 1 | 7 | 80 | 97 |
| | 50-74 ans | 919 | 453 | 466 | 72 | 60 | 381 | 406 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 117 | 66 | 51 | 39 | 36 | 27 | 15 |
| | 55-59 ans | 170 | 96 | 74 | 11 | 3 | 85 | 71 |
| | 60-64 ans | 238 | 115 | 123 | 14 | 8 | 101 | 115 |
| | 65-69 ans | 193 | 87 | 106 | 4 | 3 | 83 | 103 |
| | 70-74 ans | 175 | 79 | 96 | 1 | 6 | 78 | 90 |
| | 50-74 ans | 893 | 443 | 450 | 69 | 56 | 374 | 394 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 119 | 67 | 52 | 40 | 37 | 27 | 15 |
| | 55-59 ans | 173 | 98 | 75 | 12 | 4 | 86 | 71 |
| | 60-64 ans | 240 | 117 | 123 | 15 | 8 | 102 | 115 |
| | 65-69 ans | 197 | 89 | 108 | 4 | 3 | 85 | 105 |
| | 70-74 ans | 182 | 81 | 101 | 1 | 7 | 80 | 94 |
| | 50-74 ans | 911 | 452 | 459 | 72 | 59 | 380 | 400 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 50-74 ans | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 120 | 68 | 52 | 40 | 37 | 28 | 15 |
| | 55-59 ans | 175 | 98 | 77 | 12 | 5 | 86 | 72 |
| | 60-64 ans | 241 | 117 | 124 | 15 | 8 | 102 | 116 |
| | 65-69 ans | 198 | 89 | 109 | 4 | 3 | 85 | 106 |
| | 70-74 ans | 185 | 81 | 104 | 1 | 7 | 80 | 97 |
| | 50-74 ans | 919 | 453 | 466 | 72 | 60 | 381 | 406 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 121 | 69 | 52 | 41 | 37 | 28 | 15 |
| | 55-59 ans | 175 | 98 | 77 | 12 | 5 | 86 | 72 |
| | 60-64 ans | 245 | 119 | 126 | 16 | 8 | 103 | 118 |
| | 65-69 ans | 198 | 89 | 109 | 4 | 3 | 85 | 106 |
| | 70-74 ans | 186 | 82 | 104 | 1 | 7 | 81 | 97 |
| | 50-74 ans | 925 | 457 | 468 | 74 | 60 | 383 | 408 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 71 | 29 | 42 | 15 | 28 | 14 | 14 |
| | 55-59 ans | 71 | 29 | 42 | 4 | 2 | 25 | 40 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 116 | 48 | 68 | 5 | 5 | 43 | 63 |
| | 65-69 ans | 87 | 34 | 53 | 1 | 3 | 33 | 50 |
| | 70-74 ans | 89 | 31 | 58 | 0 | 2 | 31 | 56 |
| | 50-74 ans | 434 | 171 | 263 | 25 | 40 | 146 | 223 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| | 55-59 ans | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| | 60-64 ans | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| | 65-69 ans | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| | 70-74 ans | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 76 | 42 | 34 | 4 | 3 | 38 | 31 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| | 55-59 ans | 37 | 25 | 12 | 5 | 0 | 20 | 12 |
| | 60-64 ans | 38 | 22 | 16 | 1 | 0 | 21 | 16 |
| | 65-69 ans | 42 | 22 | 20 | 1 | 0 | 21 | 20 |
| | 70-74 ans | 30 | 14 | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 |
| | 50-74 ans | 158 | 93 | 65 | 13 | 3 | 80 | 62 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 12 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 32 | 24 | 8 | 2 | 0 | 22 | 8 |
| | 60-64 ans | 33 | 19 | 14 | 5 | 1 | 14 | 13 |
| | 65-69 ans | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| | 70-74 ans | 31 | 19 | 12 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| | 50-74 ans | 127 | 81 | 46 | 17 | 4 | 64 | 42 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| | 65-69 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| | 70-74 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| | 50-74 ans | 48 | 29 | 19 | 8 | 4 | 21 | 15 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| | 65-69 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 32 | 14 | 18 | 3 | 1 | 11 | 17 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 23 | 20 | 3 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| | 55-59 ans | 69 | 49 | 20 | 7 | 0 | 42 | 20 |
| | 60-64 ans | 71 | 41 | 30 | 6 | 1 | 35 | 29 |
| | 65-69 ans | 61 | 31 | 30 | 2 | 0 | 29 | 30 |
| | 70-74 ans | 61 | 33 | 28 | 0 | 3 | 33 | 25 |
| | 50-74 ans | 285 | 174 | 111 | 30 | 7 | 144 | 104 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 12 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 32 | 24 | 8 | 2 | 0 | 22 | 8 |
| | 60-64 ans | 33 | 19 | 14 | 5 | 1 | 14 | 13 |
| | 65-69 ans | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| | 70-74 ans | 31 | 19 | 12 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| | 50-74 ans | 127 | 81 | 46 | 17 | 4 | 64 | 42 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 29 | 22 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 |
| | 60-64 ans | 31 | 18 | 13 | 4 | 1 | 14 | 12 |
| | 65-69 ans | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| | 70-74 ans | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| | 50-74 ans | 110 | 72 | 38 | 16 | 2 | 56 | 36 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 14 | 13 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 31 | 24 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 |
| | 60-64 ans | 35 | 21 | 14 | 5 | 1 | 16 | 13 |
| | 65-69 ans | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | 70-74 ans | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| | 50-74 ans | 135 | 88 | 47 | 19 | 2 | 69 | 45 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| | 65-69 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| | 70-74 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| | 50-74 ans | 48 | 29 | 19 | 8 | 4 | 21 | 15 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| | 65-69 ans | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| | 70-74 ans | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| | 50-74 ans | 43 | 25 | 18 | 6 | 4 | 19 | 14 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| | 50-74 ans | 32 | 21 | 11 | 5 | 4 | 16 | 7 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| | 50-74 ans | 31 | 20 | 11 | 4 | 4 | 16 | 7 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 34 | 22 | 12 | 5 | 4 | 17 | 8 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 16 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| | 65-69 ans | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| | 70-74 ans | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| | 50-74 ans | 82 | 44 | 38 | 13 | 7 | 31 | 31 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 5 | 4,5 | 5,2 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 4,7 | 4,4 | 5 | 10,7 | 7,8 | 3,8 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 9,5 | 7,7 | 3,9 | 4,3 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 8,2 | 7,5 | 4,5 | 4,2 |
| | 70-74 ans | 5,2 | 5,4 | 5 | 3,2 | 9,1 | 5,5 | 4,9 |
| | 50-74 ans | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,4 | 5,5 | 4,4 | 4,5 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 3,7 | 4,2 | 1 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 1,2 | 1 | 4,7 | 2,5 | 0,9 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 3,6 | 2,5 | 1 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 3,6 | 1,2 | 1 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 2,2 | 1 | 0,9 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 70,8 | 69,6 | 71,8 | 65,7 | 62,3 | 74,7 | 83,2 |
| | 55-59 ans | 72,2 | 72,8 | 71,9 | 65,9 | 45,7 | 74,7 | 75,6 |
| | 60-64 ans | 75,5 | 72,7 | 77,6 | 50 | 67,9 | 76,6 | 78,7 |
| | 65-69 ans | 79,9 | 75,7 | 83,5 | 56,3 | 66,7 | 77,2 | 84,5 |
| | 70-74 ans | 78,1 | 77,7 | 78,5 | 66,7 | 60 | 77,8 | 79,4 |
| | 50-74 ans | 75,4 | 73,7 | 76,7 | 62,4 | 60,4 | 76,5 | 79,8 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 1,8 | 2 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 2 | 2,6 | 1,6 | 3,8 | 1,4 | 2,5 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 5,3 | 3,1 | 2,4 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 2,2 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 3 | 2,8 | 4,3 | 6,6 | 3 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 2,5 | 2 | 3,1 | 2 | 2,4 | 2 |
| 50-74 ans ** | 2,2 | 2,5 | 1,9 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,3 | 98,8 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,5 | 99,1 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| | 60-64 ans | 98,2 | 99,2 | 97,2 | 94,1 | 90,9 | 100 | 97,8 |
| | 65-69 ans | 98,7 | 99 | 98,4 | 100 | 100 | 99 | 98,4 |
| | 70-74 ans | 97,7 | 96 | 99,2 | 100 | 100 | 95,8 | 99,1 |
| | 50-74 ans | 98,6 | 98,5 | 98,7 | 97,8 | 98,6 | 98,6 | 98,7 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 84,5 | 86,1 | 82,5 | 81,6 | 82,2 | 93,3 | 83,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 88,8 | 88,3 | 89,5 | 85,7 | 83,3 | 88,7 | 90 |
| | 60-64 ans | 88,3 | 88,6 | 87,9 | 93,8 | 80 | 87,9 | 88,5 |
| | 65-69 ans | 87,2 | 86,4 | 87,9 | 66,7 | 100 | 87,6 | 87,6 |
| | 70-74 ans | 86,9 | 84,4 | 88,9 | 25 | 100 | 87 | 88,2 |
| | 50-74 ans | 87,4 | 86,9 | 87,8 | 80,9 | 84,5 | 88,2 | 88,3 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 97,5 | 97,1 | 98,1 | 97,5 | 97,3 | 96,4 | 100 |
| | 55-59 ans | 97,1 | 98 | 96,1 | 91,7 | 60 | 98,8 | 98,6 |
| | 60-64 ans | 98,8 | 98,3 | 99,2 | 93,3 | 100 | 99 | 99,1 |
| | 65-69 ans | 97,5 | 97,8 | 97,2 | 100 | 100 | 97,6 | 97,2 |
| | 70-74 ans | 94,6 | 97,5 | 92,3 | 100 | 85,7 | 97,5 | 92,8 |
| | 50-74 ans | 97,2 | 97,8 | 96,6 | 95,8 | 93,3 | 98,2 | 97 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 92 | 91 | 93 | 99 | 97 | 79 | 84 |
| | 55-59 ans | 82 | 78 | 86 | 98 | 92 | 75 | 86 |
| | 60-64 ans | 86 | 83 | 88 | 99 | 79 | 81 | 89 |
| | 65-69 ans | 80 | 83 | 77 | 90 | 36 | 82 | 78 |
| | 70-74 ans | 77 | 72 | 80 | 64 | 70 | 72 | 81 |
| | 50-74 ans | 83 | 81 | 84 | 98 | 88 | 78 | 84 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 67 (42,5-104,5) | 72,5 (42,5-112) | 62,5 (41,5-90) | 74 (46-115) | 65 (43-96) | 64,5 (37-109) | 57 (40-90) |
| | 55-59 ans | 58 (42-92) | 57,5 (42-90) | 58 (42-92) | 71,5 (36,5-152,5) | 42 (41-72) | 57,5 (43-87) | 58,5 (42-94,5) |
| | 60-64 ans | 60 (41-92) | 63 (43-94) | 60 (37,5-87,5) | 52 (32-84) | 45 (26-93,5) | 63 (43-95) | 60,5 (38,5-87,5) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 57 (41-92) | 63 (44-92) | 54 (38-89) | 73,5 (43-137) | 44 (14-50) | 63 (44-92) | 54,5 (38-91) |
| | 70-74 ans | 63 (41-90) | 57 (42-91) | 63 (41-90) | 64 (64-64) | 64 (48-90) | 57 (42-91) | 63 (41-90) |
| | 50-74 ans | 61 (41-92) | 63 (43-93) | 60 (39-90) | 70 (42,5-120) | 62 (40,5-90) | 60 (43-92) | 60 (39-90) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 11,2 | 10 | 12,7 | 12 | 15,6 | 6,7 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 7,6 | 8 | 7 | 14,3 | 0 | 7,1 | 7,5 |
| | 60-64 ans | 5,4 | 6,8 | 4,1 | 5,9 | 0 | 6,9 | 4,5 |
| | 65-69 ans | 8,3 | 7,7 | 8,7 | 33,3 | 0 | 6,1 | 8,9 |
| | 70-74 ans | 7,8 | 10 | 5,9 | 50 | 0 | 8,3 | 6,3 |
| | 50-74 ans | 7,7 | 8,3 | 7,1 | 14,3 | 9,7 | 7,1 | 6,7 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 58,7 | 42 | 80,8 | 36,6 | 75,7 | 50 | 93,3 |
| | 55-59 ans | 40,6 | 29,6 | 54,5 | 33,3 | 40 | 29,1 | 55,6 |
| | 60-64 ans | 47,3 | 40,3 | 54 | 31,3 | 62,5 | 41,7 | 53,4 |
| | 65-69 ans | 43,9 | 38,2 | 48,6 | 25 | 100 | 38,8 | 47,2 |
| | 70-74 ans | 47,8 | 37,8 | 55,8 | 0 | 28,6 | 38,3 | 57,7 |
| | 50-74 ans | 46,9 | 37,4 | 56,2 | 33,8 | 66,7 | 38,1 | 54,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 8,3 | 11,6 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 21,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 9,1 | 8,2 | 10,4 | 0 | 20 | 9,3 | 9,7 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 9,2 | 6,3 | 6,3 | 0 | 9,7 | 6,8 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 0 | 0 | 8,2 | 8,5 |
| | 70-74 ans | 8,1 | 9,8 | 6,7 | 100 | 0 | 8,6 | 7,2 |
| | 50-74 ans | 8,2 | 9,2 | 7,3 | 5,4 | 5 | 9,9 | 7,6 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,1 | 14,5 | 1,9 | 14,6 | 2,7 | 14,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 21,1 | 25,5 | 15,6 | 41,7 | 0 | 23,3 | 16,7 |
| | 60-64 ans | 15,5 | 18,5 | 12,7 | 6,3 | 0 | 20,4 | 13,6 |
| | 65-69 ans | 21,2 | 24,7 | 18,3 | 25 | 0 | 24,7 | 18,9 |
| | 70-74 ans | 16,1 | 17,1 | 15,4 | 0 | 28,6 | 17,3 | 14,4 |
| | 50-74 ans | 17,1 | 20,4 | 13,9 | 17,6 | 5 | 20,9 | 15,2 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 9,9 | 14,5 | 3,8 | 22 | 5,4 | 3,6 | 0 |
| | 55-59 ans | 18,3 | 24,5 | 10,4 | 16,7 | 0 | 25,6 | 11,1 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 16 | 11,1 | 31,3 | 12,5 | 13,6 | 11 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 10,1 | 9,2 | 25 | 0 | 9,4 | 9,4 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 23,2 | 11,5 | 0 | 14,3 | 23,5 | 11,3 |
| | 50-74 ans | 13,7 | 17,7 | 9,8 | 23 | 6,7 | 16,7 | 10,3 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,1 | 5,8 | 1,9 | 9,8 | 2,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 3,1 | 1,3 | 8,3 | 20 | 2,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,7 | 7,6 | 4 | 12,5 | 0 | 6,8 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 9 | 5,5 | 25 | 0 | 8,2 | 5,7 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 0 | 28,6 | 6,2 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 5,2 | 6,3 | 4,1 | 10,8 | 6,7 | 5,5 | 3,7 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 12,5 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 0 | 1,7 | 1,8 | 0,5 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 5 | 5,8 | 3,8 | 7,3 | 2,7 | 3,6 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 2 | 3,9 | 0 | 0 | 2,3 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 2,5 | 4,8 | 0 | 0 | 2,9 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2,2 | 3,7 | 0 | 0 | 2,4 | 3,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 0 | 0 | 3,7 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 1,7 | 2,9 | 4,2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,9 | 5,7 | 0,7 | 7,5 | 1,2 | 3,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 11,4 | 3,6 | 19 | 0 | 10,6 | 3,9 |
| | 60-64 ans | 6,1 | 8 | 4,6 | 18,7 | 2,8 | 7,3 | 4,7 |
| | 65-69 ans | 5,7 | 6,6 | 5 | 10,6 | 0 | 6,5 | 5,1 |
| | 70-74 ans | 8,2 | 10,1 | 6,7 | 0 | 28,3 | 10,4 | 6,1 |
| | 50-74 ans | 6 | 8,3 | 4,2 | 10,1 | 2 | 8 | 4,5 |
| | 50-74 ans ** | 6 | 8,3 | 3,8 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,5 | 2,8 | 0,5 | 4,5 | 0,8 | 0,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 5,6 | 1,5 | 5,4 | 0 | 5,6 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 15,6 | 2,8 | 2,9 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 5,3 | 0 | 1,8 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,8 | 2,9 | 0 | 9,4 | 6 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 3,9 | 1,7 | 5,7 | 1,1 | 3,6 | 1,8 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 4 | 1,6 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,4 | 2,8 | 0,2 | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 5,1 | 1,3 | 5,4 | 0 | 5,1 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,5 | 2 | 12,5 | 2,8 | 2,9 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 5,3 | 0 | 1,6 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 4,3 | 2,1 | 0 | 0 | 4,4 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 3,4 | 1,4 | 5,4 | 0,6 | 3,1 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,4 | 3,6 | 1,3 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 3,7 | 0,2 | 5,5 | 0,4 | 1,3 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 21 - Côte d'Or

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 3,2 | 5,6 | 1,3 | 5,4 | 0 | 5,6 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 3 | 4,1 | 2,1 | 15,6 | 2,8 | 3,3 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 2,6 | 2 | 5,3 | 0 | 2,5 | 2 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,5 | 3,1 | 0 | 0 | 5,7 | 3,2 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 4,2 | 1,8 | 6,4 | 0,6 | 3,9 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 2,9 | 4,3 | 1,6 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 2,7 | 2,3 | 0,5 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 6,2 | 0 | 1,5 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,3 | 1,7 | 1 | 5,3 | 0 | 1,6 | 1 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0 | 18,9 | 1,6 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 0,6 |
| | 50-74 ans ** | 0,9 | 1,3 | 0,6 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 20 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 50-74 ans | 16,3 | 16 | 16,7 | 16,7 | 0 | 15,8 | 21,4 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)