

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 6 645 | 3 088 | 3 557 | 1 937 | 2 184 | 1 151 | 1 373 |
| | 55-59 ans | 6 120 | 2 848 | 3 272 | 989 | 778 | 1 859 | 2 494 |
| | 60-64 ans | 7 528 | 3 215 | 4 313 | 906 | 913 | 2 309 | 3 400 |
| | 65-69 ans | 8 515 | 3 890 | 4 625 | 654 | 681 | 3 236 | 3 944 |
| | 70-74 ans | 6 223 | 2 845 | 3 378 | 387 | 434 | 2 458 | 2 944 |
| | 50-74 ans | 35 031 | 15 886 | 19 145 | 4 873 | 4 990 | 11 013 | 14 155 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 431 | 209 | 222 | 138 | 142 | 71 | 80 |
| | 55-59 ans | 410 | 194 | 216 | 86 | 75 | 108 | 141 |
| | 60-64 ans | 476 | 214 | 262 | 83 | 85 | 131 | 177 |
| | 65-69 ans | 540 | 248 | 292 | 65 | 70 | 183 | 222 |
| | 70-74 ans | 435 | 178 | 257 | 31 | 53 | 147 | 204 |
| | 50-74 ans | 2 292 | 1 043 | 1 249 | 403 | 425 | 640 | 824 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 297 | 145 | 152 | 91 | 89 | 54 | 63 |
| | 55-59 ans | 307 | 139 | 168 | 56 | 54 | 83 | 114 |
| | 60-64 ans | 377 | 173 | 204 | 58 | 60 | 115 | 144 |
| | 65-69 ans | 421 | 193 | 228 | 46 | 49 | 147 | 179 |
| | 70-74 ans | 348 | 145 | 203 | 21 | 34 | 124 | 169 |
| | 50-74 ans | 1 750 | 795 | 955 | 272 | 286 | 523 | 669 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 134 | 64 | 70 | 47 | 53 | 17 | 17 |
| | 55-59 ans | 103 | 55 | 48 | 30 | 21 | 25 | 27 |
| | 60-64 ans | 99 | 41 | 58 | 25 | 25 | 16 | 33 |
| | 65-69 ans | 119 | 55 | 64 | 19 | 21 | 36 | 43 |
| | 70-74 ans | 87 | 33 | 54 | 10 | 19 | 23 | 35 |
| | 50-74 ans | 542 | 248 | 294 | 131 | 139 | 117 | 155 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 6 511 | 3 024 | 3 487 | 1 890 | 2 131 | 1 134 | 1 356 |
| | 55-59 ans | 6 017 | 2 793 | 3 224 | 959 | 757 | 1 834 | 2 467 |
| | 60-64 ans | 7 429 | 3 174 | 4 255 | 881 | 888 | 2 293 | 3 367 |
| | 65-69 ans | 8 396 | 3 835 | 4 561 | 635 | 660 | 3 200 | 3 901 |
| | 70-74 ans | 6 136 | 2 812 | 3 324 | 377 | 415 | 2 435 | 2 909 |
| | 50-74 ans | 34 489 | 15 638 | 18 851 | 4 742 | 4 851 | 10 896 | 14 000 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 112 | 65 | 47 | 46 | 32 | 19 | 15 |
| | 55-59 ans | 111 | 64 | 47 | 19 | 8 | 45 | 39 |
| | 60-64 ans | 139 | 62 | 77 | 20 | 21 | 42 | 56 |
| | 65-69 ans | 197 | 105 | 92 | 24 | 25 | 81 | 67 |
| | 70-74 ans | 154 | 83 | 71 | 13 | 11 | 70 | 60 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 713 | 379 | 334 | 122 | 97 | 257 | 237 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 112 | 65 | 47 | 46 | 32 | 19 | 15 |
| | 55-59 ans | 110 | 63 | 47 | 19 | 8 | 44 | 39 |
| | 60-64 ans | 139 | 62 | 77 | 20 | 21 | 42 | 56 |
| | 65-69 ans | 197 | 105 | 92 | 24 | 25 | 81 | 67 |
| | 70-74 ans | 151 | 82 | 69 | 13 | 11 | 69 | 58 |
| | 50-74 ans | 709 | 377 | 332 | 122 | 97 | 255 | 235 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 93 | 57 | 36 | 39 | 27 | 18 | 9 |
| | 55-59 ans | 100 | 55 | 45 | 15 | 8 | 40 | 37 |
| | 60-64 ans | 123 | 52 | 71 | 14 | 17 | 38 | 54 |
| | 65-69 ans | 177 | 95 | 82 | 23 | 19 | 72 | 63 |
| | 70-74 ans | 134 | 72 | 62 | 10 | 7 | 62 | 55 |
| | 50-74 ans | 627 | 331 | 296 | 101 | 78 | 230 | 218 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 88 | 52 | 36 | 36 | 27 | 16 | 9 |
| | 55-59 ans | 97 | 54 | 43 | 15 | 7 | 39 | 36 |
| | 60-64 ans | 117 | 51 | 66 | 13 | 17 | 38 | 49 |
| | 65-69 ans | 172 | 92 | 80 | 22 | 18 | 70 | 62 |
| | 70-74 ans | 128 | 67 | 61 | 10 | 7 | 57 | 54 |
| | 50-74 ans | 602 | 316 | 286 | 96 | 76 | 220 | 210 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 93 | 57 | 36 | 39 | 27 | 18 | 9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 100 | 55 | 45 | 15 | 8 | 40 | 37 |
| | 60-64 ans | 123 | 52 | 71 | 14 | 17 | 38 | 54 |
| | 65-69 ans | 177 | 95 | 82 | 23 | 19 | 72 | 63 |
| | 70-74 ans | 133 | 72 | 61 | 10 | 7 | 62 | 54 |
| | 50-74 ans | 626 | 331 | 295 | 101 | 78 | 230 | 217 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 93 | 57 | 36 | 39 | 27 | 18 | 9 |
| | 55-59 ans | 100 | 55 | 45 | 15 | 8 | 40 | 37 |
| | 60-64 ans | 122 | 52 | 70 | 14 | 17 | 38 | 53 |
| | 65-69 ans | 177 | 95 | 82 | 23 | 19 | 72 | 63 |
| | 70-74 ans | 134 | 72 | 62 | 10 | 7 | 62 | 55 |
| | 50-74 ans | 626 | 331 | 295 | 101 | 78 | 230 | 217 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 93 | 57 | 36 | 39 | 27 | 18 | 9 |
| | 55-59 ans | 101 | 56 | 45 | 15 | 8 | 41 | 37 |
| | 60-64 ans | 123 | 52 | 71 | 14 | 17 | 38 | 54 |
| | 65-69 ans | 177 | 95 | 82 | 23 | 19 | 72 | 63 |
| | 70-74 ans | 135 | 72 | 63 | 10 | 7 | 62 | 56 |
| | 50-74 ans | 629 | 332 | 297 | 101 | 78 | 231 | 219 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 54 | 33 | 21 | 22 | 17 | 11 | 4 |
| | 55-59 ans | 58 | 28 | 30 | 7 | 4 | 21 | 26 |
| | 60-64 ans | 59 | 19 | 40 | 4 | 8 | 15 | 32 |
| | 65-69 ans | 84 | 32 | 52 | 6 | 13 | 26 | 39 |
| | 70-74 ans | 64 | 28 | 36 | 5 | 6 | 23 | 30 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 319 | 140 | 179 | 44 | 48 | 96 | 131 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 60-64 ans | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| | 65-69 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 44 | 24 | 20 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 28 | 19 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 |
| | 70-74 ans | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| | 50-74 ans | 83 | 55 | 28 | 18 | 7 | 37 | 21 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 17 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 25 | 12 | 13 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| | 65-69 ans | 43 | 27 | 16 | 7 | 3 | 20 | 13 |
| | 70-74 ans | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 10 | 12 |
| | 50-74 ans | 123 | 70 | 53 | 25 | 13 | 45 | 40 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| | 50-74 ans | 36 | 27 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 27 | 16 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 27 | 18 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 |
| | 60-64 ans | 38 | 19 | 19 | 8 | 5 | 11 | 14 |
| | 65-69 ans | 71 | 46 | 25 | 13 | 6 | 33 | 19 |
| | 70-74 ans | 43 | 26 | 17 | 4 | 0 | 22 | 17 |
| | 50-74 ans | 206 | 125 | 81 | 43 | 20 | 82 | 61 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 17 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 25 | 12 | 13 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| | 65-69 ans | 43 | 27 | 16 | 7 | 3 | 20 | 13 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 10 | 12 |
| | 50-74 ans | 123 | 70 | 53 | 25 | 13 | 45 | 40 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 30 | 19 | 11 | 6 | 1 | 13 | 10 |
| | 70-74 ans | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| | 50-74 ans | 100 | 57 | 43 | 22 | 9 | 35 | 34 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| | 60-64 ans | 22 | 10 | 12 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| | 65-69 ans | 35 | 23 | 12 | 6 | 1 | 17 | 11 |
| | 70-74 ans | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 11 | 11 |
| | 50-74 ans | 111 | 65 | 46 | 24 | 9 | 41 | 37 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| | 70-74 ans | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| | 50-74 ans | 36 | 27 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 34 | 26 | 8 | 7 | 4 | 19 | 4 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 21 | 16 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 24 - Dordogne

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 32 | 24 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 14 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| | 50-74 ans | 62 | 35 | 27 | 17 | 14 | 18 | 13 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 24 - Dordogne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 5,8 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 6,7 | 6,1 | 9,2 | 9,3 | 5,7 | 5,2 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 9,9 | 10,3 | 5,7 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 7 | 6,3 | 7,6 | 8 | 12,2 | 6 | 6,9 |
| | 50-74 ans | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 5,8 | 5,8 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 3 | 2,7 | 1,3 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,7 | 0,7 | 1 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | 3,1 | 1,1 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 4,4 | 0,9 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 1,1 | 1,1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 68,9 | 69,4 | 68,5 | 65,9 | 62,7 | 76,1 | 78,8 |
| | 55-59 ans | 74,9 | 71,6 | 77,8 | 65,1 | 72 | 76,9 | 80,9 |
| | 60-64 ans | 79,2 | 80,8 | 77,9 | 69,9 | 70,6 | 87,8 | 81,4 |
| | 65-69 ans | 78 | 77,8 | 78,1 | 70,8 | 70 | 80,3 | 80,6 |
| | 70-74 ans | 80 | 81,5 | 79 | 67,7 | 64,2 | 84,4 | 82,8 |
| | 50-74 ans | 76,4 | 76,2 | 76,5 | 67,5 | 67,3 | 81,7 | 81,2 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 2 | 1,1 | 2,5 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 2 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 2,7 | 2 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 1,7 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 3 | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 2 | 2,4 | 1,7 |
| 50-74 ans ** | 2 | 2,3 | 1,7 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,1 | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 97,8 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,1 | 98,8 | 97,2 | 100 | 100 | 98,6 | 96,7 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99,5 | 99,4 | 100 | 100 | 99,2 | 99,2 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 83 | 87,7 | 76,6 | 84,8 | 84,4 | 94,7 | 60 |
| | 55-59 ans | 90,9 | 87,3 | 95,7 | 78,9 | 100 | 90,9 | 94,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 24 - Dordogne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 88,5 | 83,9 | 92,2 | 70 | 81 | 90,5 | 96,4 |
| | 65-69 ans | 89,8 | 90,5 | 89,1 | 95,8 | 76 | 88,9 | 94 |
| | 70-74 ans | 88,7 | 87,8 | 89,9 | 76,9 | 63,6 | 89,9 | 94,8 |
| | 50-74 ans | 88,4 | 87,8 | 89,2 | 82,8 | 80,4 | 90,2 | 92,8 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 94,6 | 91,2 | 100 | 92,3 | 100 | 88,9 | 100 |
| | 55-59 ans | 97 | 98,2 | 95,6 | 100 | 87,5 | 97,5 | 97,3 |
| | 60-64 ans | 95,1 | 98,1 | 93 | 92,9 | 100 | 100 | 90,7 |
| | 65-69 ans | 97,2 | 96,8 | 97,6 | 95,7 | 94,7 | 97,2 | 98,4 |
| | 70-74 ans | 95,5 | 93,1 | 98,4 | 100 | 100 | 91,9 | 98,2 |
| | 50-74 ans | 96 | 95,5 | 96,6 | 95 | 97,4 | 95,7 | 96,3 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 98 | 101 | 94 | 103 | 97 | 97 | 84 |
| | 55-59 ans | 101 | 91 | 113 | 86 | 103 | 93 | 115 |
| | 60-64 ans | 91 | 98 | 86 | 143 | 87 | 82 | 85 |
| | 65-69 ans | 105 | 105 | 104 | 111 | 142 | 104 | 92 |
| | 70-74 ans | 97 | 85 | 111 | 135 | 206 | 77 | 99 |
| | 50-74 ans | 99 | 97 | 101 | 111 | 116 | 90 | 96 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 77 (50-115) | 77 (57-114) | 72 (43,5-118) | 77 (52-113) | 73 (44-117) | 80 (57-152) | 57 (43-121) |
| | 55-59 ans | 75,5 (50,5-101) | 79 (50-101) | 71 (52-112) | 83 (56-98) | 44 (36-68) | 78 (48-101) | 77 (56-114) |
| | 60-64 ans | 71 (48-95) | 67 (48,5-95) | 72 (47-95) | 50,5 (39-82) | 80 (38-95) | 74 (56-97) | 70,5 (49-93) |
| | 65-69 ans | 70 (53-98) | 71 (54-101) | 68 (49-92) | 71 (53-101) | 73 (55-114) | 71 (54,5-100) | 65 (48-91) |
| | 70-74 ans | 64 (46-98) | 62 (45,5-93,5) | 76,5 (52-110) | 82 (62-127) | 88 (42-179) | 58,5 (44-86) | 71 (52-106) |
| | 50-74 ans | 71 (49-101) | 71 (50-99) | 71 (48-102) | 71 (53-99) | 75 (44-112) | 67 (49-99) | 69 (49-100) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 12,5 | 12,3 | 12,8 | 15,2 | 9,4 | 5,3 | 20 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 24 - Dordogne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 6,3 | 7,8 | 4,3 | 21,1 | 0 | 2,2 | 5,1 |
| | 60-64 ans | 9,4 | 11,3 | 7,8 | 20 | 19 | 7,1 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 6,7 | 7,6 | 4,2 | 12 | 7,4 | 6 |
| | 70-74 ans | 9,1 | 9,6 | 8,5 | 7,7 | 36,4 | 10 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 8,7 | 9,2 | 8,1 | 13,9 | 14,4 | 7 | 5,5 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,2 | 100 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,8 | 100 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 99,5 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 58,1 | 57,9 | 58,3 | 56,4 | 63 | 61,1 | 44,4 |
| | 55-59 ans | 57,4 | 50 | 66,7 | 46,7 | 50 | 51,2 | 70,3 |
| | 60-64 ans | 48 | 36,5 | 56,3 | 28,6 | 47,1 | 39,5 | 59,3 |
| | 65-69 ans | 47,5 | 33,7 | 63,4 | 26,1 | 68,4 | 36,1 | 61,9 |
| | 70-74 ans | 47,4 | 38,9 | 57,1 | 50 | 85,7 | 37,1 | 53,6 |
| | 50-74 ans | 50,7 | 42,2 | 60,3 | 43,6 | 61,5 | 41,6 | 59,8 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 5,4 | 3,5 | 8,3 | 5,1 | 11,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 12,2 | 10,8 |
| | 60-64 ans | 10,6 | 17,3 | 5,6 | 7,1 | 5,9 | 21,1 | 5,6 |
| | 65-69 ans | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 0 | 6,9 | 7,9 |
| | 70-74 ans | 4,4 | 2,8 | 6,3 | 0 | 0 | 3,2 | 7,1 |
| | 50-74 ans | 7 | 7,2 | 6,7 | 4 | 5,1 | 8,7 | 7,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 1,1 | 0 | 2,8 | 0 | 3,7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,3 | 1 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,9 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 10,8 | 12,3 | 8,3 | 12,8 | 7,4 | 11,1 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 13,9 | 16,1 | 11,1 | 26,7 | 25 | 12,2 | 8,1 |
| | 60-64 ans | 10,6 | 13,5 | 8,5 | 14,3 | 0 | 13,2 | 11,1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 24 - Dordogne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 15,8 | 20 | 11 | 26,1 | 15,8 | 18,1 | 9,5 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 18,1 | 7,9 | 10 | 0 | 19,4 | 8,9 |
| | 50-74 ans | 13,2 | 16,6 | 9,4 | 17,8 | 9 | 16 | 9,6 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 18,3 | 15,8 | 22,2 | 17,9 | 14,8 | 11,1 | 44,4 |
| | 55-59 ans | 12,9 | 16,1 | 8,9 | 13,3 | 12,5 | 17,1 | 8,1 |
| | 60-64 ans | 20,3 | 23,1 | 18,3 | 42,9 | 29,4 | 15,8 | 14,8 |
| | 65-69 ans | 24,3 | 28,4 | 19,5 | 30,4 | 15,8 | 27,8 | 20,6 |
| | 70-74 ans | 18,5 | 18,1 | 19 | 30 | 0 | 16,1 | 21,4 |
| | 50-74 ans | 19,6 | 21,1 | 17,8 | 24,8 | 16,7 | 19,5 | 18,3 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,3 | 7 | 0 | 2,6 | 0 | 16,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 3,6 | 2,2 | 6,7 | 12,5 | 2,4 | 0 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 9,6 | 7 | 7,1 | 17,6 | 10,5 | 3,7 |
| | 65-69 ans | 4,5 | 8,4 | 0 | 13 | 0 | 6,9 | 0 |
| | 70-74 ans | 8,1 | 11,1 | 4,8 | 10 | 0 | 11,3 | 5,4 |
| | 50-74 ans | 5,7 | 8,1 | 3 | 6,9 | 5,1 | 8,7 | 2,3 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,1 | 1,8 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 0,6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 1,8 |
| | 50-74 ans | 1 | 1,2 | 0,7 | 1 | 0 | 1,3 | 0,9 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 3,6 | 0 | 6,7 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 70-74 ans | 5,2 | 6,9 | 3,2 | 0 | 14,3 | 8,1 | 1,8 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 2,4 | 0,7 | 1 | 1,3 | 3 | 0,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 24 - Dordogne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,1 | 5,3 | 3,2 | 6,3 | 2,8 | 3,5 | 3,7 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 6,4 | 2,8 | 6,3 | 4 | 6,5 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 5,1 | 6 | 4,5 | 9,1 | 5,6 | 4,8 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 8,5 | 12 | 5,5 | 20,5 | 9,1 | 10,3 | 4,9 |
| | 70-74 ans | 7 | 9,2 | 5,1 | 10,6 | 0 | 9 | 5,8 |
| | 50-74 ans | 6 | 8 | 4,3 | 9,1 | 4,1 | 7,5 | 4,4 |
| | 50-74 ans ** | 5,6 | 7,3 | 4 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,6 | 3 | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 1,8 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 3,2 | 1,2 | 2,1 | 1,3 | 3,8 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 6,8 | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 7 | 3,5 | 11 | 4,5 | 6,3 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 4,6 | 3,6 | 8 | 0 | 4,1 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 3,6 | 4,5 | 2,8 | 5,3 | 2,7 | 4,1 | 2,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,3 | 4 | 2,6 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | 1,9 | 1,8 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | 0 | 2,7 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 5,7 | 4,5 | 2,2 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 5 | 2,4 | 9,4 | 1,5 | 4,1 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 4,6 | 3,3 | 8 | 0 | 4,1 | 3,8 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 3,6 | 2,3 | 4,6 | 1,9 | 3,2 | 2,4 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 3,3 | 2,1 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,2 | 1,9 | 1,8 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 2 | 3,2 | 0,9 | 3,1 | 0 | 3,3 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 3 | 3,2 | 2,8 | 5,7 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 4,2 | 6 | 2,6 | 9,4 | 1,5 | 5,3 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 4,2 | 5,3 | 3,3 | 10,6 | 0 | 4,5 | 3,8 |
| | 50-74 ans | 3,2 | 4,2 | 2,4 | 5,1 | 1,9 | 3,8 | 2,6 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 3,8 | 2,3 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 1,3 | 0 | 0,5 | 0 | 2,6 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 24 - Dordogne

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1 | 1,3 | 0,5 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 3,4 | 1,7 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1 | 2,1 | 0 | 4,7 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 2,7 | 0 | 2,9 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 0,4 |
| | 50-74 ans ** | 1 | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 75 | 75 | 0 | 100 | 0 | 66,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 50 | 60 | 40 | 0 | 33,3 | 75 | 50 |
| | 65-69 ans | 57,1 | 57,1 | 0 | 33,3 | 0 | 75 | 0 |
| | 70-74 ans | 70 | 62,5 | 100 | 100 | 0 | 57,1 | 100 |
| | 50-74 ans | 61,8 | 61,5 | 62,5 | 57,1 | 50 | 63,2 | 75 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)