

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) *	50-54 ans	1 130 667	521 914	608 753	318 250	357 452	203 664	251 301
	55-59 ans	1 021 160	453 715	567 445	98 508	111 473	355 207	455 972
	60-64 ans	1 150 184	512 798	637 386	97 718	107 700	415 080	529 686
	65-69 ans	931 532	421 208	510 324	65 179	71 569	356 029	438 755
	70-74 ans	704 822	315 036	389 786	41 484	48 612	273 552	341 174
	50-74 ans	4 938 365	2 224 671	2 713 694	621 139	696 806	1 603 532	2 016 888
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	69 025	32 712	36 313	22 153	24 091	10 559	12 222
	55-59 ans	61 677	27 791	33 886	8 937	9 863	18 854	24 023
	60-64 ans	67 049	29 895	37 154	8 663	9 492	21 232	27 662
	65-69 ans	56 294	25 182	31 112	6 155	6 922	19 027	24 190
	70-74 ans	49 638	21 169	28 469	4 808	5 731	16 361	22 738
	50-74 ans	303 683	136 749	166 934	50 716	56 099	86 033	110 835
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	44 283	21 091	23 192	13 174	14 189	7 917	9 003
	55-59 ans	41 904	18 946	22 958	4 828	5 287	14 118	17 671
	60-64 ans	47 715	21 207	26 508	4 861	5 349	16 346	21 159
	65-69 ans	40 298	18 157	22 141	3 483	3 811	14 674	18 330
	70-74 ans	34 948	15 014	19 934	2 571	3 078	12 443	16 856
	50-74 ans	209 148	94 415	114 733	28 917	31 714	65 498	83 019
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	24 742	11 621	13 121	8 979	9 902	2 642	3 219
	55-59 ans	19 773	8 845	10 928	4 109	4 576	4 736	6 352
	60-64 ans	19 334	8 688	10 646	3 802	4 143	4 886	6 503
	65-69 ans	15 996	7 025	8 971	2 672	3 111	4 353	5 860
	70-74 ans	14 690	6 155	8 535	2 237	2 653	3 918	5 882
	50-74 ans	94 535	42 334	52 201	21 799	24 385	20 535	27 816
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 105 925	510 293	595 632	309 271	347 550	201 022	248 082
	55-59 ans	1 001 387	444 870	556 517	94 399	106 897	350 471	449 620
	60-64 ans	1 130 849	504 110	626 739	93 916	103 557	410 194	523 182
	65-69 ans	915 536	414 183	501 353	62 507	68 458	351 676	432 895
	70-74 ans	690 131	308 881	381 250	39 247	45 959	269 634	335 291
	50-74 ans	4 843 828	2 182 337	2 661 491	599 340	672 421	1 582 997	1 989 070
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	20 303	10 805	9 498	6 863	5 959	3 942	3 539
	55-59 ans	20 099	10 520	9 579	2 765	2 191	7 755	7 388

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24 656	12 772	11 884	3 030	2 473	9 742	9 411
	65-69 ans	21 639	11 156	10 483	2 095	1 765	9 061	8 718
	70-74 ans	18 053	9 196	8 857	1 550	1 283	7 646	7 574
	50-74 ans	104 750	54 449	50 301	16 303	13 671	38 146	36 630
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	20 099	10 705	9 394	6 810	5 896	3 895	3 498
	55-59 ans	19 873	10 404	9 469	2 734	2 162	7 670	7 307
	60-64 ans	24 336	12 599	11 737	2 985	2 446	9 614	9 291
	65-69 ans	21 279	10 960	10 319	2 051	1 730	8 909	8 589
	70-74 ans	17 641	8 959	8 682	1 498	1 260	7 461	7 422
	50-74 ans	103 228	53 627	49 601	16 078	13 494	37 549	36 107
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	17 113	9 052	8 061	5 619	4 969	3 433	3 092
	55-59 ans	17 265	8 983	8 282	2 179	1 769	6 804	6 513
	60-64 ans	21 356	10 987	10 369	2 439	2 047	8 548	8 322
	65-69 ans	18 793	9 615	9 178	1 702	1 466	7 913	7 712
	70-74 ans	15 390	7 763	7 627	1 230	1 056	6 533	6 571
	50-74 ans	89 917	46 400	43 517	13 169	11 307	33 231	32 210
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	16 165	8 580	7 585	5 327	4 677	3 253	2 908
	55-59 ans	16 154	8 435	7 719	2 024	1 633	6 411	6 086
	60-64 ans	19 976	10 288	9 688	2 225	1 885	8 063	7 803
	65-69 ans	17 468	8 919	8 549	1 532	1 346	7 387	7 203
	70-74 ans	14 169	7 154	7 015	1 107	939	6 047	6 076
	50-74 ans	83 932	43 376	40 556	12 215	10 480	31 161	30 076
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	39	23	16	15	10	8	6
	55-59 ans	44	36	8	14	2	22	6
	60-64 ans	74	46	28	16	6	30	22
	65-69 ans	58	33	25	6	6	27	19
	70-74 ans	53	36	17	6	2	30	15
	50-74 ans	268	174	94	57	26	117	68
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	12	5	7	3	4	2	3
	55-59 ans	8	7	1	4	0	3	1
	60-64 ans	11	5	6	0	0	5	6
	65-69 ans	15	7	8	0	1	7	7
	70-74 ans	18	9	9	4	1	5	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	64	33	31	11	6	22	25
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	17 008	9 012	7 996	5 593	4 929	3 419	3 067
	55-59 ans	17 130	8 928	8 202	2 161	1 753	6 767	6 449
	60-64 ans	21 131	10 895	10 236	2 418	2 023	8 477	8 213
	65-69 ans	18 557	9 498	9 059	1 674	1 451	7 824	7 608
	70-74 ans	15 146	7 653	7 493	1 211	1 036	6 442	6 457
	50-74 ans	88 972	45 986	42 986	13 057	11 192	32 929	31 794
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	105	40	65	26	40	14	25
	55-59 ans	135	55	80	18	16	37	64
	60-64 ans	225	92	133	21	24	71	109
	65-69 ans	236	117	119	28	15	89	104
	70-74 ans	244	110	134	19	20	91	114
	50-74 ans	945	414	531	112	115	302	416
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	51	26	25	15	16	11	9
	55-59 ans	53	24	29	11	10	13	19
	60-64 ans	89	44	45	13	9	31	36
	65-69 ans	109	55	54	3	10	52	44
	70-74 ans	158	89	69	19	13	70	56
	50-74 ans	460	238	222	61	58	177	164

* inclus les personnes ayant réalisé un test de dépistage dont le resultat a été reporté inconnu (n=2)

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,3	6,0	7,0	6,7	5,2	4,9
	55-59 ans	6,0	6,1	6,0	9,1	8,8	5,3	5,3
	60-64 ans	5,8	5,8	5,8	8,9	8,8	5,1	5,2
	65-69 ans	6,0	6,0	6,1	9,4	9,7	5,3	5,5
	70-74 ans	7,0	6,7	7,3	11,6	11,8	6,0	6,7
	50-74 ans	6,1	6,1	6,2	8,2	8,1	5,4	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,8	2,8	1,3	1,3
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	4,2	4,1	1,3	1,4
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	3,9	3,8	1,2	1,2
	65-69 ans	1,7	1,7	1,8	4,1	4,3	1,2	1,3
	70-74 ans	2,1	2,0	2,2	5,4	5,5	1,4	1,7
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	3,5	3,5	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	64,5	63,9	59,5	58,9	75,0	73,7
	55-59 ans	67,9	68,2	67,8	54,0	53,6	74,9	73,6
	60-64 ans	71,2	70,9	71,3	56,1	56,4	77,0	76,5
	65-69 ans	71,6	72,1	71,2	56,6	55,1	77,1	75,8
	70-74 ans	70,4	70,9	70,0	53,5	53,7	76,1	74,1
	50-74 ans	68,9	69,0	68,7	57,0	56,5	76,1	74,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	2,2	1,7	2,0	1,4
	55-59 ans	2,0	2,4	1,7	2,9	2,0	2,2	1,6
	60-64 ans	2,2	2,5	1,9	3,2	2,4	2,4	1,8
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	3,4	2,6	2,6	2,0
	70-74 ans	2,6	3,0	2,3	3,9	2,8	2,8	2,3
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,7	2,0	2,4	1,8
50-74 ans **	2,2	2,5	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,1	98,9	99,2	98,9	98,8	98,8
	55-59 ans	98,9	98,9	98,9	98,9	98,7	98,9	98,9
	60-64 ans	98,7	98,6	98,8	98,5	98,9	98,7	98,7
	65-69 ans	98,3	98,2	98,4	97,9	98,0	98,3	98,5
	70-74 ans	97,7	97,4	98,0	96,6	98,2	97,6	98,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,5	98,5	98,6	98,6	98,7	98,4	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,1	84,6	85,8	82,5	84,3	88,1	88,4
	55-59 ans	86,9	86,3	87,5	79,7	81,8	88,7	89,1
	60-64 ans	87,8	87,2	88,3	81,7	83,7	88,9	89,6
	65-69 ans	88,3	87,7	88,9	83,0	84,7	88,8	89,8
	70-74 ans	87,2	86,7	87,8	82,1	83,8	87,6	88,5
	50-74 ans	87,1	86,5	87,7	81,9	83,8	88,5	89,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,5	94,8	94,1	94,8	94,1	94,8	94,0
	55-59 ans	93,6	93,9	93,2	92,9	92,3	94,2	93,4
	60-64 ans	93,5	93,6	93,4	91,2	92,1	94,3	93,8
	65-69 ans	92,9	92,8	93,1	90,0	91,8	93,4	93,4
	70-74 ans	92,1	92,2	92,0	90,0	88,9	92,6	92,5
	50-74 ans	93,3	93,5	93,2	92,8	92,7	93,8	93,4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)