

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 7-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013, pour 53 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	376	232	144	160	104	72	40
	55-59 ans	536	322	214	96	53	226	161
	60-64 ans	902	572	330	170	102	402	228
	65-69 ans	939	601	338	145	63	456	275
	70-74 ans	926	570	356	107	67	463	289
	50-74 ans	3679	2297	1382	678	389	1619	993
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	30	20	10	17	5	3	5
	55-59 ans	48	31	17	14	5	17	12
	60-64 ans	84	58	26	13	8	45	18
	65-69 ans	91	61	30	18	9	43	21
	70-74 ans	79	54	25	11	8	43	17
	50-74 ans	332	224	108	73	35	151	73
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	346	212	134	143	99	69	35
	55-59 ans	488	291	197	82	48	209	149
	60-64 ans	818	514	304	157	94	357	210
	65-69 ans	848	540	308	127	54	413	254
	70-74 ans	847	516	331	96	59	420	272
	50-74 ans	3347	2073	1274	605	354	1468	920
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	233	138	95	96	75	42	20
	55-59 ans	349	203	146	60	37	143	109
	60-64 ans	605	373	232	114	79	259	153
	65-69 ans	627	393	234	93	42	300	192
	70-74 ans	674	409	265	79	45	330	220
	50-74 ans	2488	1516	972	442	278	1074	694
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	113	74	39	47	24	27	15
	55-59 ans	139	88	51	22	11	66	40
	60-64 ans	213	141	72	43	15	98	57
	65-69 ans	221	147	74	34	12	113	62
	70-74 ans	173	107	66	17	14	90	52
	50-74 ans	859	557	302	163	76	394	226
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	106	66	40	42	29	24	11
	55-59 ans	126	81	45	17	9	64	36
	60-64 ans	214	142	72	39	23	103	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 7-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013, pour 53 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	242	162	80	30	15	132	65
	70-74 ans	206	130	76	20	15	110	61
	50-74 ans	894	581	313	148	91	433	222
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	44	28	16	23	12	5	4
	55-59 ans	80	48	32	13	7	35	25
	60-64 ans	167	97	70	30	26	67	44
	65-69 ans	143	83	60	16	13	67	47
	70-74 ans	199	126	73	25	10	101	63
	50-74 ans	633	382	251	107	68	275	183
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	63	31	32	23	29	8	3
	55-59 ans	103	49	54	20	15	29	39
	60-64 ans	144	89	55	30	16	59	39
	65-69 ans	166	97	69	32	11	65	58
	70-74 ans	184	104	80	22	11	82	69
	50-74 ans	660	370	290	127	82	243	208
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	20	13	7	8	5	5	2
	55-59 ans	40	25	15	10	6	15	9
	60-64 ans	80	45	35	15	14	30	21
	65-69 ans	76	51	25	15	3	36	22
	70-74 ans	85	49	36	12	9	37	27
	50-74 ans	301	183	118	60	37	123	81

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

‡ Départements ayant moins de 30% de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 7-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013, pour 53 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8	8,6	6,9	10,6	4,8	4,2	12,5
	55-59 ans	9	9,6	7,9	14,6	9,4	7,5	7,5
	60-64 ans	9,3	10,1	7,9	7,6	7,8	11,2	7,9
	65-69 ans	9,7	10,1	8,9	12,4	14,3	9,4	7,6
	70-74 ans	8,5	9,5	7	10,3	11,9	9,3	5,9
	50-74 ans	9	9,8	7,8	10,8	9	9,3	7,4
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	32,7	34,9	29,1	32,9	24,2	39,1	42,9
	55-59 ans	28,5	30,2	25,9	26,8	22,9	31,6	26,8
	60-64 ans	26	27,4	23,7	27,4	16	27,5	27,1
	65-69 ans	26,1	27,2	24	26,8	22,2	27,4	24,4
	70-74 ans	20,4	20,7	19,9	17,7	23,7	21,4	19,1
	50-74 ans	25,7	26,9	23,7	26,9	21,5	26,8	24,6
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	67,3	65,1	70,9	67,1	75,8	60,9	57,1
	55-59 ans	71,5	69,8	74,1	73,2	77,1	68,4	73,2
	60-64 ans	74	72,6	76,3	72,6	84	72,5	72,9
	65-69 ans	73,9	72,8	76	73,2	77,8	72,6	75,6
	70-74 ans	79,6	79,3	80,1	82,3	76,3	78,6	80,9
	50-74 ans	74,3	73,1	76,3	73,1	78,5	73,2	75,4
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	45,5	47,8	42,1	43,8	38,7	57,1	55
	55-59 ans	36,1	39,9	30,8	28,3	24,3	44,8	33
	60-64 ans	35,4	38,1	31	34,2	29,1	39,8	32
	65-69 ans	38,6	41,2	34,2	32,3	35,7	44	33,9
	70-74 ans	30,6	31,8	28,7	25,3	33,3	33,3	27,7
	50-74 ans	35,9	38,3	32,3	33,5	32,7	40,3	32
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	18,9	20,3	16,8	24	16	11,9	20
	55-59 ans	22,9	23,6	21,9	21,7	18,9	24,5	22,9
	60-64 ans	27,6	26	30,2	26,3	32,9	25,9	28,8
	65-69 ans	22,8	21,1	25,6	17,2	31	22,3	24,5
	70-74 ans	29,5	30,8	27,5	31,6	22,2	30,6	28,6
	50-74 ans	25,4	25,2	25,8	24,2	24,5	25,6	26,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 7-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013, pour 53 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	27	22,5	33,7	24	38,7	19	15
	55-59 ans	29,5	24,1	37	33,3	40,5	20,3	35,8
	60-64 ans	23,8	23,9	23,7	26,3	20,3	22,8	25,5
	65-69 ans	26,5	24,7	29,5	34,4	26,2	21,7	30,2
	70-74 ans	27,3	25,4	30,2	27,8	24,4	24,8	31,4
	50-74 ans	26,5	24,4	29,8	28,7	29,5	22,6	30
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	8,6	9,4	7,4	8,3	6,7	11,9	10
	55-59 ans	11,5	12,3	10,3	16,7	16,2	10,5	8,3
	60-64 ans	13,2	12,1	15,1	13,2	17,7	11,6	13,7
	65-69 ans	12,1	13	10,7	16,1	7,1	12	11,5
	70-74 ans	12,6	12	13,6	15,2	20	11,2	12,3
	50-74 ans	12,2	12,1	12,1	13,6	13,3	11,5	11,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Départements ayant moins 30% de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire