

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 75 - Région: AQUITAINE\_LIMOUSIN\_POITOU\_CHARENTES

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 601	875	726	543	475	332	251	
	55-59 ans	1 659	894	765	254	203	640	562	
	60-64 ans	2 188	1 176	1 012	289	239	887	773	
	65-69 ans	1 895	1 010	885	223	150	787	735	
	70-74 ans	1 528	794	734	127	105	667	629	
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 871</b>	<b>4 749</b>	<b>4 122</b>	<b>1 436</b>	<b>1 172</b>	<b>3 313</b>	<b>2 950</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 610	880	730	544	478	336	252	
	55-59 ans	1 678	902	776	255	209	647	567	
	60-64 ans	2 213	1 190	1 023	291	242	899	781	
	65-69 ans	1 925	1 026	899	226	152	800	747	
	70-74 ans	1 551	808	743	129	106	679	637	
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 977</b>	<b>4 806</b>	<b>4 171</b>	<b>1 445</b>	<b>1 187</b>	<b>3 361</b>	<b>2 984</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	859	403	456	256	296	147	160	
	55-59 ans	788	356	432	87	106	269	326	
	60-64 ans	997	453	544	95	124	358	420	
	65-69 ans	813	342	471	67	69	275	402	
	70-74 ans	697	295	402	48	53	247	349	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 154</b>	<b>1 849</b>	<b>2 305</b>	<b>553</b>	<b>648</b>	<b>1 296</b>	<b>1 657</b>	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	111	58	53	35	39	23	14	
	55-59 ans	96	57	39	12	9	45	30	
	60-64 ans	146	67	79	12	16	55	63	
	65-69 ans	97	56	41	7	8	49	33	
	70-74 ans	72	33	39	4	8	29	31	
	<b>50-74 ans</b>	<b>522</b>	<b>271</b>	<b>251</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>201</b>	<b>171</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1	
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1	
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2	
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2	
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	167	114	53	59	34	55	19	
	55-59 ans	211	121	90	38	25	83	65	
	60-64 ans	274	175	99	45	20	130	79	
	65-69 ans	272	167	105	32	23	135	82	
	70-74 ans	186	105	81	17	11	88	70	

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 110</b>	<b>682</b>	<b>428</b>	<b>191</b>	<b>113</b>	<b>491</b>	<b>315</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	297	197	100	126	62	71	38
	55-59 ans	330	225	105	75	28	150	77
	60-64 ans	468	300	168	77	38	223	130
	65-69 ans	419	270	149	64	22	206	127
	70-74 ans	339	206	133	31	22	175	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 853</b>	<b>1 198</b>	<b>655</b>	<b>373</b>	<b>172</b>	<b>825</b>	<b>483</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	69	46	23	30	20	16	3
	55-59 ans	101	64	37	23	17	41	20
	60-64 ans	173	104	69	38	25	66	44
	65-69 ans	177	117	60	40	15	77	45
	70-74 ans	156	109	47	22	8	87	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>676</b>	<b>440</b>	<b>236</b>	<b>153</b>	<b>85</b>	<b>287</b>	<b>151</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	11	5	6	1	3	4	3
	60-64 ans	15	7	8	2	3	5	5
	65-69 ans	13	6	7	0	1	6	6
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	48	31	17	18	11	13	6
	55-59 ans	55	35	20	12	5	23	15
	60-64 ans	72	43	29	13	5	30	24
	65-69 ans	67	38	29	9	7	29	22
	70-74 ans	52	28	24	4	2	24	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>175</b>	<b>119</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>119</b>	<b>89</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	16	9	7	4	4	5	3
	55-59 ans	27	13	14	2	8	11	6
	60-64 ans	27	16	11	3	4	13	7
	65-69 ans	29	14	15	5	2	9	13
	70-74 ans	20	14	6	2	0	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>35</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	466	312	154	186	97	126	57
	55-59 ans	545	349	196	114	54	235	142

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	751	481	270	124	58	357	212
	65-69 ans	695	439	256	96	46	343	210
	70-74 ans	529	314	215	48	33	266	182
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 986</b>	<b>1 895</b>	<b>1 091</b>	<b>568</b>	<b>288</b>	<b>1 327</b>	<b>803</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	297	197	100	126	62	71	38
	55-59 ans	330	225	105	75	28	150	77
	60-64 ans	468	300	168	77	38	223	130
	65-69 ans	419	270	149	64	22	206	127
	70-74 ans	339	206	133	31	22	175	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 853</b>	<b>1 198</b>	<b>655</b>	<b>373</b>	<b>172</b>	<b>825</b>	<b>483</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	248	169	79	107	49	62	30
	55-59 ans	261	187	74	62	16	125	58
	60-64 ans	373	247	126	65	30	182	96
	65-69 ans	334	215	119	57	18	158	101
	70-74 ans	270	162	108	26	16	136	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 486</b>	<b>980</b>	<b>506</b>	<b>317</b>	<b>129</b>	<b>663</b>	<b>377</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	265	182	83	115	52	67	31
	55-59 ans	296	207	89	69	20	138	69
	60-64 ans	432	287	145	73	35	214	110
	65-69 ans	383	249	134	62	20	187	114
	70-74 ans	316	197	119	35	19	162	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 692</b>	<b>1 122</b>	<b>570</b>	<b>354</b>	<b>146</b>	<b>768</b>	<b>424</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	69	46	23	30	20	16	3
	55-59 ans	101	64	37	23	17	41	20
	60-64 ans	174	104	70	38	26	66	44
	65-69 ans	177	117	60	40	15	77	45
	70-74 ans	156	109	47	22	8	87	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>677</b>	<b>440</b>	<b>237</b>	<b>153</b>	<b>86</b>	<b>287</b>	<b>151</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,5	99,6	99,8	99,6	99,1	99,6
	55-59 ans	99,1	99,4	98,7	99,6	97,6	99,4	99,1
	60-64 ans	99,3	99,2	99,3	99,7	99,2	99,1	99,4
	65-69 ans	99,0	99,0	99,0	99,1	99,3	99,0	98,9
	70-74 ans	99,1	99,1	99,1	100,0	99,1	99,0	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>99,7</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	45,8	62,5	47,1	61,9	43,8	63,5
	55-59 ans	47,0	39,5	55,7	34,1	50,7	41,6	57,5
	60-64 ans	45,1	38,1	53,2	32,6	51,2	39,8	53,8
	65-69 ans	42,2	33,3	52,4	29,6	45,4	34,4	53,8
	70-74 ans	44,9	36,5	54,1	37,2	50,0	36,4	54,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,3</b>	<b>38,5</b>	<b>55,3</b>	<b>38,3</b>	<b>54,6</b>	<b>38,6</b>	<b>55,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	6,6	7,3	6,4	8,2	6,8	5,6
	55-59 ans	5,7	6,3	5,0	4,7	4,3	7,0	5,3
	60-64 ans	6,6	5,6	7,7	4,1	6,6	6,1	8,1
	65-69 ans	5,0	5,5	4,6	3,1	5,3	6,1	4,4
	70-74 ans	4,6	4,1	5,2	3,1	7,5	4,3	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,3	0,4
	55-59 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
	65-69 ans	0,2	0,1	0,3	0,0	0,7	0,1	0,3
	70-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,4	13,0	7,3	10,8	7,1	16,4	7,5
	55-59 ans	12,6	13,4	11,6	14,9	12,0	12,8	11,5
	60-64 ans	12,4	14,7	9,7	15,5	8,3	14,5	10,1
	65-69 ans	14,1	16,3	11,7	14,2	15,1	16,9	11,0
	70-74 ans	12,0	13,0	10,9	13,2	10,4	13,0	11,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>14,2</b>	<b>10,3</b>	<b>13,2</b>	<b>9,5</b>	<b>14,6</b>	<b>10,6</b>

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	18,4	22,4	13,7	23,2	13,0	21,1	15,1
	55-59 ans	19,7	24,9	13,5	29,4	13,4	23,2	13,6
	60-64 ans	21,1	25,2	16,4	26,5	15,7	24,8	16,6
	65-69 ans	21,8	26,3	16,6	28,3	14,5	25,8	17,0
	70-74 ans	21,9	25,5	17,9	24,0	20,8	25,8	17,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>24,9</b>	<b>15,7</b>	<b>25,8</b>	<b>14,5</b>	<b>24,5</b>	<b>16,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	5,2	3,2	5,5	4,2	4,8	1,2
	55-59 ans	6,0	7,1	4,8	9,0	8,1	6,3	3,5
	60-64 ans	7,8	8,7	6,7	13,1	10,3	7,3	5,6
	65-69 ans	9,2	11,4	6,7	17,7	9,9	9,6	6,0
	70-74 ans	10,1	13,5	6,3	17,1	7,5	12,8	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>5,7</b>	<b>10,6</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,0	0,8
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4	0,6	0,5
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	0,7	1,2	0,6	0,6
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	0,7	0,8	0,8
	70-74 ans	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,0	3,5	2,3	3,3	2,3	3,9	2,4
	55-59 ans	3,3	3,9	2,6	4,7	2,4	3,6	2,6
	60-64 ans	3,3	3,6	2,8	4,5	2,1	3,3	3,1
	65-69 ans	3,5	3,7	3,2	4,0	4,6	3,6	2,9
	70-74 ans	3,4	3,5	3,2	3,1	1,9	3,5	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	1,5	1,2
	55-59 ans	1,6	1,4	1,8	0,8	3,8	1,7	1,1
	60-64 ans	1,2	1,3	1,1	1,0	1,7	1,4	0,9
	65-69 ans	1,5	1,4	1,7	2,2	1,3	1,1	1,7
	70-74 ans	1,3	1,7	0,8	1,6	0,0	1,8	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,7	2,9	6,3	3,0	7,4	2,7
	55-59 ans	5,6	8,2	3,6	10,4	4,2	7,5	3,4
	60-64 ans	6,2	9,0	4,1	10,4	4,3	8,6	4,0
	65-69 ans	7,2	10,0	4,9	12,2	5,4	9,5	4,8
	70-74 ans	7,5	9,7	5,6	10,1	6,1	9,7	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>8,7</b>	<b>4,1</b>	<b>8,8</b>	<b>3,9</b>	<b>8,6</b>	<b>4,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>6,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,0</b>	.	.	.	.	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	4,2	1,9	4,3	1,9	4,1	1,8
	55-59 ans	3,4	5,3	1,9	6,8	2,2	4,8	1,8
	60-64 ans	3,9	5,6	2,5	6,4	2,8	5,4	2,4
	65-69 ans	4,4	6,2	2,8	8,1	2,6	5,7	2,9
	70-74 ans	4,8	6,4	3,5	6,5	4,1	6,4	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>2,5</b>	<b>5,8</b>	<b>2,4</b>	<b>5,4</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,5	3,7	1,5	3,6	1,4
	55-59 ans	2,7	4,4	1,3	5,7	1,3	4,0	1,4
	60-64 ans	3,1	4,6	1,9	5,4	2,2	4,4	1,8
	65-69 ans	3,5	4,9	2,3	7,2	2,1	4,4	2,3
	70-74 ans	3,8	5,0	2,8	5,5	3,0	4,9	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>1,9</b>	<b>4,9</b>	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,9	1,5	3,9	1,6	3,9	1,5
	55-59 ans	3,0	4,9	1,6	6,3	1,6	4,4	1,6
	60-64 ans	3,6	5,4	2,2	6,1	2,6	5,1	2,1
	65-69 ans	4,0	5,7	2,6	7,9	2,3	5,2	2,6
	70-74 ans	4,5	6,1	3,1	7,4	3,5	5,9	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,0	0,4	1,0	0,6	0,9	0,1
	55-59 ans	1,0	1,5	0,7	2,1	1,3	1,3	0,5
	60-64 ans	1,4	1,9	1,1	3,2	1,9	1,6	0,8
	65-69 ans	1,8	2,7	1,1	5,1	1,8	2,1	1,0
	70-74 ans	2,2	3,4	1,2	4,6	1,5	3,2	1,2

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)