Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013			Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel									
qu'en soit le résultat) *	50-54 ans	140 499	65 629	74 870	39 073	43 317	26 556	31 553	
	55-59 ans	128 270	57 134	71 136	11 489	12 970	45 645	58 166	
	60-64 ans	138 572	61 816	76 756	11 180	12 296	50 636	64 460	
	65-69 ans	116 816	52 879	63 937	7 568	8 437	45 311	55 500	
	70-74 ans	89 437	39 872	49 565	4 865	6 000	35 007	43 565	
	50-74 ans	613 594	277 330	336 264	74 175	83 020	203 155	253 244	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	6 449	3 119	3 330	2 043	2 110	1 076	1 220	
	55-59 ans	5 917	2 667	3 250	786	899	1 881	2 351	
	60-64 ans	6 460	2 886	3 574	762	878	2 124	2 696	
	65-69 ans	5 954	2 739	3 215	595	678	2 144	2 537	
	70-74 ans	5 482	2 391	3 091	513	577	1 878	2 514	
	50-74 ans	30 262	13 802	16 460	4 699	5 142	9 103	11 318	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test									
NA	50-54 ans	4 457	2 169	2 288	1 349	1 357	820	931	
	55-59 ans	4 236	1 950	2 286	490	524	1 460	1 762	
	60-64 ans	4 763	2 153	2 610	468	519	1 685	2 091	
	65-69 ans	4 417	2 055	2 362	353	404	1 702	1 958	
	70-74 ans	4 095	1 808	2 287	313	353	1 495	1 934	
	50-74 ans	21 968	10 135	11 833	2 973	3 157	7 162	8 676	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 992	950	1 042	694	753	256	289	
	55-59 ans	1 681	717	964	296	375	421	589	
	60-64 ans	1 697	733	964	294	359	439	605	
	65-69 ans	1 537	684	853	242	274	442	579	
	70-74 ans	1 387	583	804	200	224	383	580	
	50-74 ans	8 294	3 667	4 627	1 726	1 985	1 941	2 642	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	138 507	64 679	73 828	38 379	42 564	26 300	31 264	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	55-59 ans	126 589	56 417	70 172	11 193	12 595	45 224	57 577	
	60-64 ans	136 874	61 083	75 791	10 886	11 937	50 197	63 854	
	65-69 ans	115 279	52 195	63 084	7 326	8 163	44 869	54 921	
	70-74 ans	88 050	39 289	48 761	4 665	5 776	34 624	42 985	
	50-74 ans	605 299	273 663	331 636	72 449	81 035	201 214	250 601	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 334	1 247	1 087	793	659	454	428	
Trombre de personnes dyant an test positii	55-59 ans	2 382	1 215	1 167	289	228	926	939	
	60-64 ans	2 840	1 397	1 443	326	256	520	1 187	

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépistage	e initial §	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2 587	1 273	1 314	231	183	1 042	1 131
	70-74 ans	2 090	1 014	1 076	159	137	855	939
	50-74 ans	12 233	6 146	6 087	1 798	1 463	4 348	4 624
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	2 314	1 238	1 076	790	655	448	421
	55-59 ans	2 357	1 203	1 154	288	225	915	929
	60-64 ans	2 793	1 373	1 420	318	251	1 055	1 169
	65-69 ans	2 546	1 259	1 287	227	178	1 032	1 109
	70-74 ans	2 049	993	1 056	155	135	838	921
	50-74 ans	12 059	6 066	5 993	1 778	1 444	4 288	4 549
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 027	1 094	933	679	562	415	371
	55-59 ans	2 112	1 076	1 036	246	193	830	843
	60-64 ans	2 534	1 236	1 298	271	220	965	1 078
	65-69 ans	2 328	1 147	1 181	194	159	953	1 022
	70-74 ans	1 843	896	947	140	111	756	836
	50-74 ans	10 844	5 449	5 395	1 530	1 245	3 919	4 150
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 896	1 037	859	638	514	399	345
	55-59 ans	1 952	1 007	945	229	168	778	777
	60-64 ans	2 348	1 134	1 214	242	204	892	1 010
	65-69 ans	2 193	1 076	1 117	176	146	900	971
	70-74 ans	1 692	817	875	116	97	701	778
	50-74 ans	10 081	5 071	5 010	1 401	1 129	3 670	3 881
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une								
complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	14	7	7	1	0	6	7
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	7	5	2	3	1	2	
	50-74 ans	42	27	15	7	3	20	12
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72								
h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
iii ou dooodj	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	50-74 ans	13	8	5	4	1	4	4

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

50-54 ans 55-59 ans	Tous sexes 2 015	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	2 015						1 611111162
	2 015						
55-59 ans		1 090	925	677	557	413	368
	2 093	1 067	1 026	243	190	824	836
60-64 ans	2 512	1 224	1 288	269	218	955	1 070
65-69 ans	2 297	1 129	1 168	187	156	942	1 012
70-74 ans	1 804	881	923	137	111	744	812
50-74 ans	10 721	5 391	5 330	1 513	1 232	3 878	4 098
50-54 ans	12	4	8	2	5	2	3
55-59 ans	19	9	10	3	3	6	7
60-64 ans	22	12	10	2	2	10	8
				7	3	11	10
	-		-	3	0		24
				17	13		52
00 1 1 4110							
50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	7	4	3	1	0	3	3
	12	5	7	2	2	3	5
		5	5	0	0	5	5
	-	-	12	0	2	11	10
				<i>A</i>	2		25
	65-69 ans 70-74 ans 50-74 ans 50-54 ans	65-69 ans 2 297 70-74 ans 1 804 50-74 ans 10 721 50-54 ans 12 55-59 ans 19 60-64 ans 22 65-69 ans 31 70-74 ans 123 50-54 ans 5 55-59 ans 7 60-64 ans 12 65-69 ans 12 65-69 ans 12	65-69 ans 2 297 1 129 70-74 ans 1 804 881 50-74 ans 10 721 5 391 50-54 ans 12 4 55-59 ans 19 9 60-64 ans 22 12 65-69 ans 31 18 70-74 ans 39 15 50-74 ans 123 58 50-54 ans 5 1 55-59 ans 7 4 60-64 ans 12 5 65-69 ans 10 5 70-74 ans 23 11	65-69 ans 2 297 1 129 1 168 70-74 ans 1 804 881 923 50-74 ans 10 721 5 391 5 330 50-54 ans 12 4 8 55-59 ans 19 9 10 60-64 ans 22 12 10 65-69 ans 31 18 13 70-74 ans 39 15 24 50-74 ans 123 58 65 50-54 ans 5 1 4 55-59 ans 7 4 3 60-64 ans 12 5 7 65-69 ans 10 5 5 70-74 ans 23 11 12	65-69 ans 2 297 1 129 1 168 187 70-74 ans 1 804 881 923 137 50-74 ans 10 721 5 391 5 330 1 513 50-54 ans 12 4 8 2 55-59 ans 19 9 10 3 60-64 ans 22 12 10 2 65-69 ans 31 18 13 7 70-74 ans 39 15 24 3 50-74 ans 123 58 65 17 50-54 ans 5 1 4 1 55-59 ans 7 4 3 1 60-64 ans 12 5 7 2 65-69 ans 10 5 5 0 70-74 ans 23 11 12 0	65-69 ans 2 297 1 129 1 168 187 156 70-74 ans 1 804 881 923 137 111 50-74 ans 10 721 5 391 5 330 1 513 1 232 50-54 ans 12 4 8 2 5 55-59 ans 19 9 10 3 3 3 60-64 ans 22 12 10 2 2 65-69 ans 31 18 13 7 3 70-74 ans 39 15 24 3 0 50-74 ans 123 58 65 17 13 50-54 ans 5 1 4 1 2 55-59 ans 7 4 3 1 0 60-64 ans 12 5 7 2 2 65-69 ans 10 5 5 0 0 70-74 ans 23 11 12 0 2	65-69 ans 2 297 1 129 1 168 187 156 942 70-74 ans 1 804 881 923 137 111 744 50-74 ans 10 721 5 391 5 330 1 513 1 232 3 878 50-54 ans 12 4 8 2 5 2 55-59 ans 19 9 10 3 3 6 60-64 ans 22 12 10 2 2 10 65-69 ans 31 18 13 7 3 11 70-74 ans 39 15 24 3 0 12 50-74 ans 123 58 65 17 13 41 50-54 ans 5 1 4 1 2 0 55-59 ans 7 4 3 1 0 3 60-64 ans 12 5 7 2 2 3 65-69 ans

^{*} inclus une personne ayant réalisé un test de dépistage dont le resultat a été reporté inconnu

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépistage	e initial §	Dépistages Subséquents †	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	4,8	4,4	5,2	4,9	4,1	3,9
	55-59 ans	4,6	4,7	4,6	6,8	6,9	4,1	4,0
	60-64 ans	4,7	4,7	4,7	6,8	7,1	4,2	4,2
	65-69 ans	5,1	5,2	5,0	7,9	8,0	4,7	4,6
	70-74 ans	6,1	6,0	6,2	10,5	9,6	5,4	5,8
	50-74 ans	4,9	5,0	4,9	6,3	6,2	4,5	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi				·				
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,4	1,8	1,7	1,0	0,9
	55-59 ans	1,3	1,3	1,4	2,6	2,9	0,9	1,0
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	2,6	2,9	0,9	0,9
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	3,2	3,2	1,0	1,0
	70-74 ans	1,6	1,5	1,6	4,1	3,7	1,1	1,3
	50-74 ans	1,4	1,3	1,4	2,3	2,4	1,0	1,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un			,		,		,	,
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,1	69,5	68,7	66,0	64,3	76,2	76,3
,	55-59 ans	71,6	73,1	70,3	62,3	58,3	77,6	74,9
	60-64 ans	73,7	74,6	73,0	61,4	59,1	79,3	77,6
	65-69 ans	74,2	75,0	73,5	59,3	59,6	79,4	77,2
	70-74 ans	74,7	75,6	74,0	61,0	61,2	79,6	76,9
	50-74 ans	72,6	73,4	71,9	63,3	61,4	78,7	76,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes		,-	-,	,-	,-	- ,	-,	-,
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,5	1,7	1,4
	55-59 ans	1,9	2,2	1,7	2,6	1,8	2,0	1,6
	60-64 ans	2,1	2,3	1,9	3,0	2,1	2,1	1,9
	65-69 ans	2,2	2,4	2,1	3,2	2,2	2,3	2,1
	70-74 ans	2,4	2,6	2,2	3,4	2,4	2,5	2,2
	50-74 ans	2,0	2,2	1,8	2,5	1,8	2,2	1,8
	50-74 ans **	2,0	2,2	1,8				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant		_,-	_,	-,-	-	-	-	-
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,3	99,0	99,6	99,4	98.7	98,4
	55-59 ans	99,0	99,0	98,9	99,7	98,7	98,8	98,9
	60-64 ans	98,3	98,3	98,4	97,5	98,0	98,5	98,5
	65-69 ans	98,4	98,9	97,9	98,3	97,3	99,0	98,1
	70-74 ans	98,0	97,9	98,1	97,5	98,5	98,0	98,1
	50-74 ans	98,6	98,7	98,5	98,9	98,7	98,6	98,4
	557.4110	20,0	30,1	20,0	20,0	50,1	50,0	30,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après								
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	88,4	86,7	85,9	85,8	92,6	88,1
an test positi (parini les personires engisies à la coloscopie)	JU 07 8118	07,0	50,4	50,7	00,0	00,0	32,0	50,1

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total			Dépistage initial §		ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	89,6	89,4	89,8	85,4	85,8	90,7	90,7
	60-64 ans	90,7	90,0	91,4	85,2	87,6	91,5	92,2
	65-69 ans	91,4	91,1	91,8	85,5	89,3	92,3	92,2
	70-74 ans	89,9	90,2	89,7	90,3	82,2	90,2	90,8
	50-74 ans	89,9	89,8	90,0	86,1	86,2	91,4	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	93,5	94,8	92,1	94,0	91,5	96,1	93,0
	55-59 ans	92,4	93,6	91,2	93,1	87,0	93,7	92,2
	60-64 ans	92,7	91,7	93,5	89,3	92,7	92,4	93,7
	65-69 ans	94,2	93,8	94,6	90,7	91,8	94,4	95,0
	70-74 ans	91,8	91,2	92,4	82,9	87,4	92,7	93,1
	50-74 ans	93,0	93,1	92,9	91,6	90,7	93,6	93,5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)