

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 27 - Région: BOURGONE_FRANCHE_COMTE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	964	499	465	275	263	224	202	
	55-59 ans	1 128	623	505	115	59	508	446	
	60-64 ans	1 449	758	691	112	80	646	611	
	65-69 ans	1 214	609	605	78	64	531	541	
	70-74 ans	1 043	527	516	72	41	455	475	
	50-74 ans	5 798	3 016	2 782	652	507	2 364	2 275	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	981	507	474	280	268	227	206	
	55-59 ans	1 138	626	512	117	60	509	452	
	60-64 ans	1 474	770	704	114	83	656	621	
	65-69 ans	1 243	625	618	81	68	544	550	
	70-74 ans	1 066	533	533	73	44	460	489	
	50-74 ans	5 902	3 061	2 841	665	523	2 396	2 318	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	570	252	318	140	182	112	136	
	55-59 ans	557	257	300	40	34	217	266	
	60-64 ans	735	300	435	39	50	261	385	
	65-69 ans	581	226	355	25	41	201	314	
	70-74 ans	502	200	302	23	18	177	284	
	50-74 ans	2 945	1 235	1 710	267	325	968	1 385	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	60	36	24	20	14	16	10	
	55-59 ans	81	45	36	9	5	36	31	
	60-64 ans	72	42	30	3	2	39	28	
	65-69 ans	61	32	29	3	2	29	27	
	70-74 ans	52	21	31	2	3	19	28	
	50-74 ans	326	176	150	37	26	139	124	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1	
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5	
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1	
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2	
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3	
	50-74 ans	29	15	14	2	2	13	12	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	101	64	37	31	13	33	24	
	55-59 ans	164	98	66	12	4	86	62	
	60-64 ans	205	130	75	19	6	111	69	
	65-69 ans	193	114	79	11	5	103	74	
	70-74 ans	144	94	50	7	3	87	47	

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	807	500	307	80	31	420	276
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	153	99	54	58	32	41	22
	55-59 ans	205	149	56	33	7	116	49
	60-64 ans	269	182	87	28	10	154	77
	65-69 ans	226	147	79	18	7	129	72
	70-74 ans	194	123	71	17	6	106	65
	50-74 ans	1 047	700	347	154	62	546	285
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	32	21	11	13	9	8	2
	55-59 ans	55	35	20	14	5	21	15
	60-64 ans	83	53	30	13	8	40	22
	65-69 ans	97	59	38	19	8	40	30
	70-74 ans	100	59	41	15	7	44	34
	50-74 ans	367	227	140	74	37	153	103
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	28	17	11	3	1	14	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	20	11	9	4	4	7	5
	55-59 ans	33	19	14	3	2	16	12
	60-64 ans	33	19	14	5	2	14	12
	65-69 ans	19	12	7	1	1	11	6
	70-74 ans	30	18	12	4	2	14	10
	50-74 ans	135	79	56	17	11	62	45
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	11	6	5	3	3	3	2
	55-59 ans	9	5	4	3	0	2	4
	60-64 ans	24	13	11	1	2	12	9
	65-69 ans	19	9	10	3	3	6	7
	70-74 ans	12	3	9	1	2	2	7
	50-74 ans	75	36	39	11	10	25	29
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	256	165	91	89	45	76	46
	55-59 ans	371	248	123	45	12	203	111

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	477	315	162	47	16	268	146
	65-69 ans	424	265	159	29	12	236	147
	70-74 ans	340	218	122	24	9	194	113
	50-74 ans	1 868	1 211	657	234	94	977	563
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	153	99	54	58	32	41	22
	55-59 ans	205	149	56	33	7	116	49
	60-64 ans	269	182	87	28	10	154	77
	65-69 ans	226	147	79	18	7	129	72
	70-74 ans	194	123	71	17	6	106	65
	50-74 ans	1 047	700	347	154	62	546	285
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	129	87	42	52	25	35	17
	55-59 ans	167	123	44	31	6	92	38
	60-64 ans	211	142	69	23	8	119	61
	65-69 ans	166	108	58	12	5	96	53
	70-74 ans	150	97	53	13	5	84	48
	50-74 ans	823	557	266	131	49	426	217
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	143	97	46	56	26	41	20
	55-59 ans	190	142	48	33	7	109	41
	60-64 ans	244	168	76	28	8	140	68
	65-69 ans	210	135	75	17	5	118	70
	70-74 ans	179	116	63	13	6	103	57
	50-74 ans	966	658	308	147	52	511	256
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	32	21	11	13	9	8	2
	55-59 ans	55	35	20	14	5	21	15
	60-64 ans	83	53	30	13	8	40	22
	65-69 ans	97	59	38	19	8	40	30
	70-74 ans	100	59	41	15	7	44	34
	50-74 ans	367	227	140	74	37	153	103

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	98,8	98,9	98,9	98,5	98,7	99,5
	55-59 ans	99,4	99,5	99,2	98,3	100,0	99,8	99,1
	60-64 ans	98,6	98,8	98,3	99,1	96,4	98,8	98,5
	65-69 ans	98,1	98,1	98,1	96,3	94,1	98,3	98,5
	70-74 ans	98,8	99,6	97,9	100,0	97,6	99,6	97,9
	50-74 ans	98,7	99,0	98,4	98,6	97,7	99,0	98,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,1	49,7	67,1	50,0	67,9	49,3	66,0
	55-59 ans	48,9	41,1	58,6	34,2	56,7	42,6	58,8
	60-64 ans	49,9	39,0	61,8	34,2	60,2	39,8	62,0
	65-69 ans	46,7	36,2	57,4	30,9	60,3	36,9	57,1
	70-74 ans	47,1	37,5	56,7	31,5	40,9	38,5	58,1
	50-74 ans	49,9	40,3	60,2	40,2	62,1	40,4	59,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	7,1	5,1	7,1	5,2	7,0	4,9
	55-59 ans	7,1	7,2	7,0	7,7	8,3	7,1	6,9
	60-64 ans	4,9	5,5	4,3	2,6	2,4	5,9	4,5
	65-69 ans	4,9	5,1	4,7	3,7	2,9	5,3	4,9
	70-74 ans	4,9	3,9	5,8	2,7	6,8	4,1	5,7
	50-74 ans	5,5	5,7	5,3	5,6	5,0	5,8	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	55-59 ans	0,7	0,5	1,0	0,9	0,0	0,4	1,1
	60-64 ans	0,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,6	0,2
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0,0	1,5	0,6	0,4
	70-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,7	0,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,3	12,6	7,8	11,1	4,9	14,5	11,7
	55-59 ans	14,4	15,7	12,9	10,3	6,7	16,9	13,7
	60-64 ans	13,9	16,9	10,7	16,7	7,2	16,9	11,1
	65-69 ans	15,5	18,2	12,8	13,6	7,4	18,9	13,5
	70-74 ans	13,5	17,6	9,4	9,6	6,8	18,9	9,6
	50-74 ans	13,7	16,3	10,8	12,0	5,9	17,5	11,9

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,6	19,5	11,4	20,7	11,9	18,1	10,7
	55-59 ans	18,0	23,8	10,9	28,2	11,7	22,8	10,8
	60-64 ans	18,2	23,6	12,4	24,6	12,0	23,5	12,4
	65-69 ans	18,2	23,5	12,8	22,2	10,3	23,7	13,1
	70-74 ans	18,2	23,1	13,3	23,3	13,6	23,0	13,3
	50-74 ans	17,7	22,9	12,2	23,2	11,9	22,8	12,3
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	4,1	2,3	4,6	3,4	3,5
55-59 ans		4,8	5,6	3,9	12,0	8,3	4,1	3,3
60-64 ans		5,6	6,9	4,3	11,4	9,6	6,1	3,5
65-69 ans		7,8	9,4	6,1	23,5	11,8	7,4	5,5
70-74 ans		9,4	11,1	7,7	20,5	15,9	9,6	7,0
50-74 ans		6,2	7,4	4,9	11,1	7,1	6,4	4,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,9
	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5
	65-69 ans	0,6	0,6	0,5	0,0	0,0	0,7	0,5
	70-74 ans	0,7	0,8	0,6	2,7	0,0	0,4	0,6
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,5	0,2	0,6	0,4
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,0	2,2	1,9	1,4	1,5	3,1
55-59 ans		2,9	3,0	2,7	2,6	3,3	3,1	2,7
60-64 ans		2,2	2,5	2,0	4,4	2,4	2,1	1,9
65-69 ans		1,5	1,9	1,1	1,2	1,5	2,0	1,1
70-74 ans		2,8	3,4	2,3	5,5	4,5	3,0	2,0
50-74 ans		2,3	2,6	2,0	2,6	2,1	2,6	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	2,6	0,0	0,4	0,9
	60-64 ans	1,6	1,7	1,6	0,9	2,4	1,8	1,4
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	3,7	4,4	1,1	1,3
	70-74 ans	1,1	0,6	1,7	1,4	4,5	0,4	1,4
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	1,7	1,9	1,0	1,3

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,5	2,9	6,2	2,7	6,9	3,3
	55-59 ans	6,2	9,4	3,7	11,3	2,7	9,1	3,9
	60-64 ans	6,8	9,9	4,2	10,9	3,7	9,8	4,3
	65-69 ans	7,4	10,2	5,2	10,0	4,3	10,2	5,2
	70-74 ans	7,9	11,2	5,2	13,8	5,0	11,0	5,2
	50-74 ans	6,5	9,4	4,2	8,5	3,1	9,6	4,4
50-74 ans **	6,5	9,1	4,1	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,9	1,7	4,0	1,9	3,7	1,6
	55-59 ans	3,4	5,6	1,7	8,3	1,6	5,2	1,7
	60-64 ans	3,8	5,7	2,3	6,5	2,3	5,6	2,3
	65-69 ans	4,0	5,6	2,6	6,2	2,5	5,6	2,6
	70-74 ans	4,5	6,3	3,0	9,8	3,3	6,0	3,0
	50-74 ans	3,7	5,4	2,2	5,6	2,1	5,4	2,3
50-74 ans **	3,7	5,3	2,2	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,4	1,4	3,6	1,5	3,2	1,2
	55-59 ans	2,8	4,7	1,3	7,8	1,4	4,1	1,3
	60-64 ans	3,0	4,5	1,8	5,3	1,8	4,3	1,8
	65-69 ans	2,9	4,1	1,9	4,2	1,8	4,1	1,9
	70-74 ans	3,5	5,0	2,2	7,5	2,8	4,8	2,2
	50-74 ans	2,9	4,3	1,7	4,8	1,6	4,2	1,7
50-74 ans **	2,9	4,3	1,7	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,8	1,5	3,9	1,5	3,7	1,4
	55-59 ans	3,2	5,4	1,5	8,3	1,6	4,9	1,4
	60-64 ans	3,5	5,3	2,0	6,5	1,8	5,1	2,0
	65-69 ans	3,7	5,2	2,4	5,9	1,8	5,1	2,5
	70-74 ans	4,2	6,0	2,7	7,5	3,3	5,8	2,6
	50-74 ans	3,4	5,1	2,0	5,4	1,7	5,0	2,0
50-74 ans **	3,4	5,0	1,9	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0,5	0,7	0,1
	55-59 ans	0,9	1,3	0,6	3,5	1,1	0,9	0,5
	60-64 ans	1,2	1,7	0,8	3,0	1,8	1,5	0,6
	65-69 ans	1,7	2,3	1,2	6,6	2,9	1,7	1,1
	70-74 ans	2,3	3,0	1,7	8,6	3,9	2,5	1,6

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	2,7	1,2	1,5	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)