

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 192	1 122	1 070	738	671	384	399
	55-59 ans	2 062	1 005	1 057	285	258	720	799
	60-64 ans	2 280	1 172	1 108	314	235	858	873
	65-69 ans	1 888	994	894	206	192	788	702
	70-74 ans	1 482	708	774	137	147	571	627
	50-74 ans	9 904	5 001	4 903	1 680	1 503	3 321	3 400
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 232	1 147	1 085	752	682	395	403
	55-59 ans	2 099	1 022	1 077	291	263	731	814
	60-64 ans	2 321	1 194	1 127	320	241	874	886
	65-69 ans	1 928	1 019	909	207	195	812	714
	70-74 ans	1 538	738	800	143	151	595	649
	50-74 ans	10 118	5 120	4 998	1 713	1 532	3 407	3 466
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 226	561	665	373	432	188	233
	55-59 ans	1 046	417	629	113	142	304	487
	60-64 ans	1 079	445	634	124	137	321	497
	65-69 ans	831	349	482	78	110	271	372
	70-74 ans	656	264	392	52	71	212	321
	50-74 ans	4 838	2 036	2 802	740	892	1 296	1 910
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	141	71	70	51	38	20	32
	55-59 ans	126	60	66	15	14	45	52
	60-64 ans	151	76	75	16	16	60	59
	65-69 ans	106	59	47	9	12	50	35
	70-74 ans	70	33	37	3	9	30	28
	50-74 ans	594	299	295	94	89	205	206
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	16	10	6	3	0	7	6
	65-69 ans	10	4	6	0	1	4	5
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	52	26	26	8	5	18	21
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	234	139	95	82	59	57	36
	55-59 ans	256	143	113	43	31	100	82
	60-64 ans	306	176	130	49	24	127	106
	65-69 ans	297	179	118	38	22	141	96
	70-74 ans	217	114	103	30	15	84	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 310	751	559	242	151	509	408
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	370	235	135	155	83	80	52
	55-59 ans	392	250	142	79	39	171	103
	60-64 ans	450	305	145	76	29	229	116
	65-69 ans	383	247	136	43	28	204	108
	70-74 ans	326	189	137	32	26	157	111
	50-74 ans	1 921	1 226	695	385	205	841	490
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	78	46	32	32	18	14	14
	55-59 ans	97	56	41	14	14	42	27
	60-64 ans	163	109	54	39	18	70	36
	65-69 ans	151	101	50	27	6	74	44
	70-74 ans	154	84	70	13	15	71	55
	50-74 ans	643	396	247	125	71	271	176
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	35	15	20	10	10	5	10
	55-59 ans	16	6	10	1	2	5	8
	60-64 ans	18	9	9	0	2	9	7
	65-69 ans	17	9	8	1	2	8	6
	70-74 ans	14	6	8	1	2	5	6
	50-74 ans	100	45	55	13	18	32	37
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	34	19	15	12	9	7	6
	55-59 ans	44	28	16	10	4	18	12
	60-64 ans	39	19	20	6	5	13	15
	65-69 ans	38	24	14	8	6	16	8
	70-74 ans	25	14	11	5	3	9	8
	50-74 ans	180	104	76	41	27	63	49
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	28	18	10	11	6	7	4
	55-59 ans	29	13	16	4	5	9	11
	60-64 ans	19	7	12	2	3	5	9
	65-69 ans	20	13	7	0	2	13	5
	70-74 ans	24	10	14	3	3	7	11
	50-74 ans	120	61	59	20	19	41	40
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	605	375	230	237	142	138	88
	55-59 ans	653	396	257	123	71	273	186

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	763	484	279	126	53	358	226
	65-69 ans	683	428	255	81	51	347	204
	70-74 ans	546	304	242	63	42	241	200
	50-74 ans	3 250	1 987	1 263	630	359	1 357	904
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	370	235	135	155	83	80	52
	55-59 ans	392	250	142	79	39	171	103
	60-64 ans	450	305	145	76	29	229	116
	65-69 ans	383	247	136	43	28	204	108
	70-74 ans	326	189	137	32	26	157	111
	50-74 ans	1 921	1 226	695	385	205	841	490
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	282	181	101	127	66	54	35
	55-59 ans	303	192	111	65	27	127	84
	60-64 ans	358	250	108	66	21	184	87
	65-69 ans	314	211	103	33	23	178	80
	70-74 ans	248	148	100	28	23	120	77
	50-74 ans	1 505	982	523	319	160	663	363
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	312	201	111	138	70	63	41
	55-59 ans	339	219	120	72	30	147	90
	60-64 ans	406	283	123	71	22	212	101
	65-69 ans	365	244	121	45	26	199	95
	70-74 ans	288	174	114	35	23	139	91
	50-74 ans	1 710	1 121	589	361	171	760	418
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	78	46	32	32	18	14	14
	55-59 ans	99	58	41	14	14	44	27
	60-64 ans	163	109	54	39	18	70	36
	65-69 ans	154	103	51	28	6	75	45
	70-74 ans	155	85	70	13	15	72	55
	50-74 ans	649	401	248	126	71	275	177

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,2	98,9	98,4	98,8	98,0	99,0
	55-59 ans	98,6	98,7	98,4	99,0	98,1	98,6	98,5
	60-64 ans	99,1	99,2	99,0	99,4	98,7	99,1	99,1
	65-69 ans	98,7	98,5	99,0	99,5	98,5	98,3	99,2
	70-74 ans	98,3	98,3	98,2	98,6	98,7	98,3	98,1
	50-74 ans	98,7	98,6	98,7	98,8	98,6	98,5	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,9	48,9	61,3	49,6	63,3	47,6	57,8
	55-59 ans	49,8	40,8	58,4	38,8	54,0	41,6	59,8
	60-64 ans	46,5	37,3	56,3	38,8	56,8	36,7	56,1
	65-69 ans	43,1	34,2	53,0	37,7	56,4	33,4	52,1
	70-74 ans	42,7	35,8	49,0	36,4	47,0	35,6	49,5
	50-74 ans	47,8	39,8	56,1	43,2	58,2	38,0	55,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,3	6,2	6,5	6,8	5,6	5,1	7,9
	55-59 ans	6,0	5,9	6,1	5,2	5,3	6,2	6,4
	60-64 ans	6,5	6,4	6,7	5,0	6,6	6,9	6,7
	65-69 ans	5,5	5,8	5,2	4,3	6,2	6,2	4,9
	70-74 ans	4,6	4,5	4,6	2,1	6,0	5,0	4,3
	50-74 ans	5,9	5,8	5,9	5,5	5,8	6,0	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,2
	55-59 ans	0,4	0,3	0,5	0,3	0,0	0,3	0,6
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	0,9	0,0	0,8	0,7
	65-69 ans	0,5	0,4	0,7	0,0	0,5	0,5	0,7
	70-74 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	12,1	8,8	10,9	8,7	14,4	8,9
	55-59 ans	12,2	14,0	10,5	14,8	11,8	13,7	10,1
	60-64 ans	13,2	14,7	11,5	15,3	10,0	14,5	12,0
	65-69 ans	15,4	17,6	13,0	18,4	11,3	17,4	13,4
	70-74 ans	14,1	15,4	12,9	21,0	9,9	14,1	13,6
	50-74 ans	12,9	14,7	11,2	14,1	9,9	14,9	11,8

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex)	50-54 ans	16,6	20,5	12,4	20,6	12,2	20,3	12,9
	55-59 ans	18,7	24,5	13,2	27,1	14,8	23,4	12,7
	60-64 ans	19,4	25,5	12,9	23,8	12,0	26,2	13,1
	65-69 ans	19,9	24,2	15,0	20,8	14,4	25,1	15,1
	70-74 ans	21,2	25,6	17,1	22,4	17,2	26,4	17,1
	50-74 ans	19,0	23,9	13,9	22,5	13,4	24,7	14,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,0	2,9	4,3	2,6	3,5	3,5
	55-59 ans	4,6	5,5	3,8	4,8	5,3	5,7	3,3
	60-64 ans	7,0	9,1	4,8	12,2	7,5	8,0	4,1
	65-69 ans	7,8	9,9	5,5	13,0	3,1	9,1	6,2
	70-74 ans	10,0	11,4	8,8	9,1	9,9	11,9	8,5
	50-74 ans	6,4	7,7	4,9	7,3	4,6	8,0	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,3	1,8	1,3	1,5	1,3	2,5
	55-59 ans	0,8	0,6	0,9	0,3	0,8	0,7	1,0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	1,0	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	0,5	1,0	1,0	0,8
	70-74 ans	0,9	0,8	1,0	0,7	1,3	0,8	0,9
	50-74 ans	1,0	0,9	1,1	0,8	1,2	0,9	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1,7	1,4	1,6	1,3	1,8	1,5
	55-59 ans	2,1	2,7	1,5	3,4	1,5	2,5	1,5
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	1,9	2,1	1,5	1,7
	65-69 ans	2,0	2,4	1,5	3,9	3,1	2,0	1,1
	70-74 ans	1,6	1,9	1,4	3,5	2,0	1,5	1,2
	50-74 ans	1,8	2,0	1,5	2,4	1,8	1,8	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,6	0,9	1,5	0,9	1,8	1,0
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	1,4	1,9	1,2	1,4
	60-64 ans	0,8	0,6	1,1	0,6	1,2	0,6	1,0
	65-69 ans	1,0	1,3	0,8	0,0	1,0	1,6	0,7
	70-74 ans	1,6	1,4	1,8	2,1	2,0	1,2	1,7
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,2	2,7	5,2	2,7	5,3	2,7
	55-59 ans	5,1	7,0	3,6	8,3	4,0	6,5	3,4
	60-64 ans	5,8	8,4	3,8	9,5	3,4	8,0	3,9
	65-69 ans	6,7	9,3	4,6	9,4	5,1	9,3	4,5
	70-74 ans	7,3	9,2	5,8	11,3	6,2	8,7	5,7
	50-74 ans	5,5	7,5	3,9	7,2	3,5	7,7	4,0
	50-74 ans **	5,6	7,5	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,3	1,6	3,4	1,6	3,0	1,6
	55-59 ans	3,0	4,4	2,0	5,3	2,2	4,1	1,9
	60-64 ans	3,4	5,3	2,0	5,8	1,9	5,1	2,0
	65-69 ans	3,8	5,4	2,4	5,0	2,8	5,5	2,4
	70-74 ans	4,4	5,7	3,3	5,8	3,8	5,7	3,2
	50-74 ans	3,2	4,6	2,1	4,4	2,0	4,7	2,2
	50-74 ans **	3,3	4,6	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,5	1,2	2,8	1,3	2,1	1,1
	55-59 ans	2,3	3,4	1,5	4,4	1,5	3,0	1,5
	60-64 ans	2,7	4,3	1,5	5,0	1,4	4,1	1,5
	65-69 ans	3,1	4,6	1,8	3,8	2,3	4,8	1,7
	70-74 ans	3,3	4,5	2,4	5,0	3,4	4,4	2,2
	50-74 ans	2,5	3,7	1,6	3,6	1,6	3,7	1,6
	50-74 ans **	2,6	3,7	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	2,8	1,3	3,0	1,4	2,4	1,3
	55-59 ans	2,6	3,9	1,7	4,8	1,7	3,5	1,7
	60-64 ans	3,1	4,9	1,7	5,4	1,4	4,8	1,8
	65-69 ans	3,6	5,3	2,2	5,2	2,6	5,4	2,1
	70-74 ans	3,8	5,3	2,7	6,3	3,4	5,0	2,6
	50-74 ans	2,9	4,2	1,8	4,1	1,7	4,3	1,9
	50-74 ans **	3,0	4,2	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,7	0,3	0,5	0,4
	55-59 ans	0,8	1,0	0,6	0,9	0,8	1,1	0,5
	60-64 ans	1,2	1,9	0,7	3,0	1,2	1,6	0,6
	65-69 ans	1,5	2,2	0,9	3,2	0,6	2,0	1,0
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,3	2,2	2,6	1,6

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,1	1,5	0,8	1,4	0,7	1,6	0,8
	50-74 ans **	1,1	1,5	0,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)