

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 633	5 849	7 784	4 265	5 437	1 584	2 347
	55-59 ans	8 696	3 845	4 851	1 550	1 763	2 295	3 088
	60-64 ans	7 171	3 203	3 968	1 085	1 253	2 118	2 715
	65-69 ans	5 401	2 484	2 917	703	764	1 781	2 153
	70-74 ans	3 873	1 686	2 187	448	563	1 238	1 624
	50-74 ans	38 774	17 067	21 707	8 051	9 780	9 016	11 927
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 301	610	691	469	540	141	151
	55-59 ans	878	412	466	189	181	223	285
	60-64 ans	631	325	306	151	130	174	176
	65-69 ans	522	230	292	92	108	138	184
	70-74 ans	508	213	295	80	84	133	211
	50-74 ans	3 840	1 790	2 050	981	1 043	809	1 007
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	818	368	450	266	334	102	116
	55-59 ans	610	280	330	115	109	165	221
	60-64 ans	413	200	213	80	79	120	134
	65-69 ans	341	146	195	48	58	98	137
	70-74 ans	306	123	183	32	42	91	141
	50-74 ans	2 488	1 117	1 371	541	622	576	749
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	483	242	241	203	206	39	35
	55-59 ans	268	132	136	74	72	58	64
	60-64 ans	218	125	93	71	51	54	42
	65-69 ans	181	84	97	44	50	40	47
	70-74 ans	202	90	112	48	42	42	70
	50-74 ans	1 352	673	679	440	421	233	258
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 150	5 607	7 543	4 062	5 231	1 545	2 312
	55-59 ans	8 428	3 713	4 715	1 476	1 691	2 237	3 024
	60-64 ans	6 953	3 078	3 875	1 014	1 202	2 064	2 673
	65-69 ans	5 220	2 400	2 820	659	714	1 741	2 106
	70-74 ans	3 671	1 596	2 075	400	521	1 196	1 554
	50-74 ans	37 422	16 394	21 028	7 611	9 359	8 783	11 669
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	300	157	143	126	110	31	33
	55-59 ans	233	104	129	42	48	62	81
	60-64 ans	176	90	86	32	24	58	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	141	72	69	17	19	55	50
	70-74 ans	93	51	42	18	13	33	29
	50-74 ans	943	474	469	235	214	239	255
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	300	157	143	126	110	31	33
	55-59 ans	233	104	129	42	48	62	81
	60-64 ans	176	90	86	32	24	58	62
	65-69 ans	141	72	69	17	19	55	50
	70-74 ans	92	50	42	17	13	33	29
	50-74 ans	942	473	469	234	214	239	255
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	270	141	129	111	102	30	27
	55-59 ans	215	96	119	40	47	56	72
	60-64 ans	161	80	81	27	20	53	61
	65-69 ans	133	66	67	15	19	51	48
	70-74 ans	83	43	40	15	12	28	28
	50-74 ans	862	426	436	208	200	218	236
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	267	139	128	109	101	30	27
	55-59 ans	211	95	116	40	47	55	69
	60-64 ans	159	79	80	26	20	53	60
	65-69 ans	132	66	66	15	19	51	47
	70-74 ans	82	43	39	15	11	28	28
	50-74 ans	851	422	429	205	198	217	231
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	269	140	129	110	102	30	27
	55-59 ans	214	96	118	40	47	56	71
	60-64 ans	161	80	81	27	20	53	61
	65-69 ans	132	66	66	15	19	51	47
	70-74 ans	83	43	40	15	12	28	28
	50-74 ans	859	425	434	207	200	218	234
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	10,4	8,9	11,0	9,9	8,9	6,4
	55-59 ans	10,1	10,7	9,6	12,2	10,3	9,7	9,2
	60-64 ans	8,8	10,1	7,7	13,9	10,4	8,2	6,5
	65-69 ans	9,7	9,3	10,0	13,1	14,1	7,7	8,5
	70-74 ans	13,1	12,6	13,5	17,9	14,9	10,7	13,0
	50-74 ans	9,9	10,5	9,4	12,2	10,7	9,0	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	4,1	3,1	4,8	3,8	2,5	1,5
	55-59 ans	3,1	3,4	2,8	4,8	4,1	2,5	2,1
	60-64 ans	3,0	3,9	2,3	6,5	4,1	2,5	1,5
	65-69 ans	3,4	3,4	3,3	6,3	6,5	2,2	2,2
	70-74 ans	5,2	5,3	5,1	10,7	7,5	3,4	4,3
	50-74 ans	3,5	3,9	3,1	5,5	4,3	2,6	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,9	60,3	65,1	56,7	61,9	72,3	76,8
	55-59 ans	69,5	68,0	70,8	60,8	60,2	74,0	77,5
	60-64 ans	65,5	61,5	69,6	53,0	60,8	69,0	76,1
	65-69 ans	65,3	63,5	66,8	52,2	53,7	71,0	74,5
	70-74 ans	60,2	57,7	62,0	40,0	50,0	68,4	66,8
	50-74 ans	64,8	62,4	66,9	55,1	59,6	71,2	74,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,9	3,1	2,1	2,0	1,4
	55-59 ans	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3,2	2,0	2,8	2,3
	65-69 ans	2,7	3,0	2,4	2,6	2,7	3,2	2,4
	70-74 ans	2,5	3,2	2,0	4,5	2,5	2,8	1,9
	50-74 ans	2,5	2,9	2,2	3,1	2,3	2,7	2,2
50-74 ans **	2,6	2,9	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,9	98,0	100,0	94,4	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,0	89,8	90,2	88,1	92,7	96,8	81,8
	55-59 ans	92,3	92,3	92,2	95,2	97,9	90,3	88,9
	60-64 ans	91,5	88,9	94,2	84,4	83,3	91,4	98,4
	65-69 ans	94,3	91,7	97,1	88,2	100,0	92,7	96,0
	70-74 ans	90,2	86,0	95,2	88,2	92,3	84,8	96,6
	50-74 ans	91,5	90,1	93,0	88,9	93,5	91,2	92,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,6	99,2	98,2	99,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,1	99,0	97,5	100,0	100,0	98,2	95,8
	60-64 ans	98,8	98,8	98,8	96,3	100,0	100,0	98,4
	65-69 ans	99,2	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0	97,9
	70-74 ans	98,8	100,0	97,5	100,0	91,7	100,0	100,0
	50-74 ans	98,7	99,1	98,4	98,6	99,0	99,5	97,9

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)