

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 76 - Région: LANGUEDOC_ROUSSILLON_MIDI_PYRENEES

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 118	593	525	365	324	228	201	
	55-59 ans	1 143	608	535	166	145	442	390	
	60-64 ans	1 507	759	748	215	184	544	564	
	65-69 ans	1 525	779	746	149	143	630	603	
	70-74 ans	1 182	622	560	107	94	515	466	
	50-74 ans	6 475	3 361	3 114	1 002	890	2 359	2 224	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 141	605	536	369	334	236	202	
	55-59 ans	1 173	622	551	171	149	451	402	
	60-64 ans	1 544	775	769	220	189	555	580	
	65-69 ans	1 561	793	768	149	146	644	622	
	70-74 ans	1 209	636	573	112	96	524	477	
	50-74 ans	6 628	3 431	3 197	1 021	914	2 410	2 283	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	601	285	316	184	186	101	130	
	55-59 ans	586	267	319	71	80	196	239	
	60-64 ans	724	281	443	82	102	199	341	
	65-69 ans	706	281	425	44	86	237	339	
	70-74 ans	521	221	300	28	52	193	248	
	50-74 ans	3 138	1 335	1 803	409	506	926	1 297	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	66	41	25	26	19	15	6	
	55-59 ans	63	35	28	11	8	24	20	
	60-64 ans	84	39	45	7	10	32	35	
	65-69 ans	87	50	37	12	6	38	31	
	70-74 ans	56	33	23	6	4	27	19	
	50-74 ans	356	198	158	62	47	136	111	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	9	7	2	3	0	4	2	
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0	
	60-64 ans	10	6	4	2	2	4	2	
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3	
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2	
	50-74 ans	38	25	13	6	4	19	9	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	110	62	48	36	28	26	20	
	55-59 ans	113	70	43	18	10	52	33	
	60-64 ans	172	101	71	30	22	71	49	
	65-69 ans	179	108	71	22	13	86	58	
	70-74 ans	153	86	67	15	10	71	57	

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	727	427	300	121	83	306	217
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	165	104	61	63	41	41	20
	55-59 ans	177	120	57	36	15	84	42
	60-64 ans	265	177	88	50	30	127	58
	65-69 ans	257	161	96	30	17	131	79
	70-74 ans	205	139	66	26	11	113	55
	50-74 ans	1 069	701	368	205	114	496	254
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	47	30	17	13	13	17	4
	55-59 ans	75	47	28	18	12	29	16
	60-64 ans	99	57	42	17	10	40	32
	65-69 ans	134	83	51	17	7	66	44
	70-74 ans	128	79	49	20	9	59	40
	50-74 ans	483	296	187	85	51	211	136
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	3	4	1	2	2	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	23	9	14	3	2	6	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	71	39	32	20	20	19	12
	55-59 ans	92	53	39	10	14	43	25
	60-64 ans	105	68	37	19	4	49	33
	65-69 ans	104	62	42	18	10	44	32
	70-74 ans	81	46	35	12	7	34	28
	50-74 ans	453	268	185	79	55	189	130
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	19	10	9	5	8	5	1
	55-59 ans	26	13	13	4	3	9	10
	60-64 ans	32	14	18	2	5	12	13
	65-69 ans	28	12	16	0	2	12	14
	70-74 ans	25	13	12	5	2	8	10
	50-74 ans	130	62	68	16	20	46	48
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	283	172	111	103	70	69	41
	55-59 ans	308	204	104	58	28	146	76

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	450	289	161	81	53	208	108
	65-69 ans	453	278	175	54	33	224	142
	70-74 ans	372	231	141	43	24	188	117
	50-74 ans	1 866	1 174	692	339	208	835	484
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	165	104	61	63	41	41	20
	55-59 ans	177	120	57	36	15	84	42
	60-64 ans	265	177	88	50	30	127	58
	65-69 ans	257	161	96	30	17	131	79
	70-74 ans	205	139	66	26	11	113	55
	50-74 ans	1 069	701	368	205	114	496	254
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	135	86	49	49	34	37	15
	55-59 ans	136	94	42	28	9	66	33
	60-64 ans	207	142	65	40	21	102	44
	65-69 ans	210	130	80	24	15	106	65
	70-74 ans	146	107	39	18	6	89	33
	50-74 ans	834	559	275	159	85	400	190
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	151	98	53	54	37	44	16
	55-59 ans	160	109	51	30	13	79	38
	60-64 ans	248	167	81	44	28	123	53
	65-69 ans	245	156	89	30	16	126	73
	70-74 ans	185	129	56	25	11	104	45
	50-74 ans	989	659	330	183	105	476	225
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	47	30	17	13	13	17	4
	55-59 ans	76	47	29	18	13	29	16
	60-64 ans	99	57	42	17	10	40	32
	65-69 ans	135	84	51	18	7	66	44
	70-74 ans	129	79	50	20	9	59	41
	50-74 ans	486	297	189	86	52	211	137

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	98,3	97,9	98,9	97,0	97,4	99,5
	55-59 ans	97,8	98,1	97,4	97,6	98,0	98,2	97,3
	60-64 ans	97,9	98,2	97,5	98,6	97,4	98,0	97,6
	65-69 ans	98,1	98,5	97,8	100,0	97,9	98,1	97,7
	70-74 ans	98,1	98,4	97,7	97,3	97,9	98,7	97,7
	50-74 ans	98,0	98,3	97,7	98,6	97,5	98,2	97,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,7	47,1	59,0	49,9	55,7	42,8	64,4
	55-59 ans	50,0	42,9	57,9	41,5	53,7	43,5	59,5
	60-64 ans	46,9	36,3	57,6	37,3	54,0	35,9	58,8
	65-69 ans	45,2	35,4	55,3	29,5	58,9	36,8	54,5
	70-74 ans	43,1	34,7	52,4	25,0	54,2	36,8	52,0
	50-74 ans	47,3	38,9	56,4	40,1	55,4	38,4	56,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	6,8	4,7	7,0	5,7	6,4	3,0
	55-59 ans	5,4	5,6	5,1	6,4	5,4	5,3	5,0
	60-64 ans	5,4	5,0	5,9	3,2	5,3	5,8	6,0
	65-69 ans	5,6	6,3	4,8	8,1	4,1	5,9	5,0
	70-74 ans	4,6	5,2	4,0	5,4	4,2	5,2	4,0
	50-74 ans	5,4	5,8	4,9	6,1	5,1	5,6	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,2	0,4	0,8	0,0	1,7	1,0
	55-59 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	1,3	0,2	0,0
	60-64 ans	0,6	0,8	0,5	0,9	1,1	0,7	0,3
	65-69 ans	0,6	0,8	0,4	0,7	0,0	0,8	0,5
	70-74 ans	0,6	0,8	0,3	0,0	0,0	1,0	0,4
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,6	0,4	0,8	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,6	10,2	9,0	9,8	8,4	11,0	9,9
	55-59 ans	9,6	11,3	7,8	10,5	6,7	11,5	8,2
	60-64 ans	11,1	13,0	9,2	13,6	11,6	12,8	8,4
	65-69 ans	11,5	13,6	9,2	14,8	8,9	13,4	9,3
	70-74 ans	12,7	13,5	11,7	13,4	10,4	13,5	11,9
	50-74 ans	11,0	12,4	9,4	11,9	9,1	12,7	9,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14,5	17,2	11,4	17,1	12,3	17,4	9,9
	55-59 ans	15,1	19,3	10,3	21,1	10,1	18,6	10,4
	60-64 ans	17,2	22,8	11,4	22,7	15,9	22,9	10,0
	65-69 ans	16,5	20,3	12,5	20,1	11,6	20,3	12,7
	70-74 ans	17,0	21,9	11,5	23,2	11,5	21,6	11,5
	50-74 ans	16,1	20,4	11,5	20,1	12,5	20,6	11,1
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	5,0	3,2	3,5	3,9	7,2
55-59 ans		6,4	7,6	5,1	10,5	8,1	6,4	4,0
60-64 ans		6,4	7,4	5,5	7,7	5,3	7,2	5,5
65-69 ans		8,6	10,5	6,6	11,4	4,8	10,2	7,1
70-74 ans		10,6	12,4	8,6	17,9	9,4	11,3	8,4
50-74 ans		7,3	8,6	5,8	8,3	5,6	8,8	6,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	0,8
	55-59 ans	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	60-64 ans	0,5	0,4	0,5	0,9	0,0	0,2	0,7
	65-69 ans	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3
	70-74 ans	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,2	6,4	6,0	5,4	6,0	8,1
55-59 ans		7,8	8,5	7,1	5,8	9,4	9,5	6,2
60-64 ans		6,8	8,8	4,8	8,6	2,1	8,8	5,7
65-69 ans		6,7	7,8	5,5	12,1	6,8	6,8	5,1
70-74 ans		6,7	7,2	6,1	10,7	7,3	6,5	5,9
50-74 ans		6,8	7,8	5,8	7,7	6,0	7,8	5,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,4	2,4	2,1
	55-59 ans	2,2	2,1	2,4	2,3	2,0	2,0	2,5
	60-64 ans	2,1	1,8	2,3	0,9	2,6	2,2	2,2
	65-69 ans	1,8	1,5	2,1	0,0	1,4	1,9	2,3
	70-74 ans	2,1	2,0	2,1	4,5	2,1	1,5	2,1
	50-74 ans	2,0	1,8	2,1	1,6	2,2	1,9	2,1

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,5	2,6	4,2	2,7	5,2	2,4
	55-59 ans	4,2	6,2	2,6	6,2	2,8	6,2	2,5
	60-64 ans	5,2	7,4	3,4	8,1	5,0	7,2	2,9
	65-69 ans	6,0	8,1	4,2	7,4	4,5	8,2	4,2
	70-74 ans	6,7	9,1	4,7	9,7	5,1	8,9	4,7
	50-74 ans	5,0	6,9	3,4	6,1	3,5	7,3	3,4
50-74 ans **	4,9	6,7	3,3	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	2,7	1,4	2,6	1,6	3,1	1,2
	55-59 ans	2,4	3,6	1,4	3,8	1,5	3,6	1,4
	60-64 ans	3,1	4,6	1,8	5,0	2,8	4,4	1,6
	65-69 ans	3,4	4,7	2,3	4,1	2,3	4,8	2,3
	70-74 ans	3,7	5,5	2,2	5,9	2,3	5,4	2,2
	50-74 ans	2,9	4,1	1,8	3,7	1,9	4,4	1,8
50-74 ans **	2,8	4,0	1,8	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,3	1,1	2,0	1,3	2,8	0,9
	55-59 ans	1,9	2,9	1,0	3,0	0,9	2,8	1,1
	60-64 ans	2,4	3,7	1,4	4,0	2,0	3,5	1,2
	65-69 ans	2,8	3,8	1,9	3,3	2,0	3,9	1,9
	70-74 ans	2,6	4,2	1,3	4,1	1,3	4,2	1,3
	50-74 ans	2,2	3,3	1,4	2,9	1,4	3,5	1,3
50-74 ans **	2,2	3,2	1,3	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,6	1,2	2,2	1,4	3,3	0,9
	55-59 ans	2,2	3,3	1,3	3,2	1,3	3,4	1,3
	60-64 ans	2,9	4,3	1,7	4,4	2,6	4,3	1,4
	65-69 ans	3,2	4,5	2,2	4,1	2,2	4,6	2,1
	70-74 ans	3,4	5,1	1,9	5,7	2,3	4,9	1,8
	50-74 ans	2,7	3,9	1,6	3,3	1,8	4,2	1,6
50-74 ans **	2,6	3,8	1,6	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,5	0,5	1,3	0,2
	55-59 ans	1,0	1,4	0,7	1,9	1,3	1,2	0,5
	60-64 ans	1,1	1,5	0,9	1,7	0,9	1,4	0,9
	65-69 ans	1,8	2,4	1,2	2,5	0,9	2,4	1,3
	70-74 ans	2,3	3,1	1,7	4,5	1,9	2,8	1,6

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,3	1,7	0,9	1,5	0,9	1,9	1,0
	50-74 ans **	1,3	1,6	0,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)