

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 089	3 183	5 906	2 188	3 709	995	2 197
	55-59 ans	7 313	2 477	4 836	980	1 544	1 497	3 292
	60-64 ans	6 789	2 448	4 341	797	1 163	1 651	3 178
	65-69 ans	4 799	1 873	2 926	450	576	1 423	2 350
	70-74 ans	3 984	1 421	2 563	269	423	1 152	2 140
	50-74 ans	31 974	11 402	20 572	4 684	7 415	6 718	13 157
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	817	342	475	263	319	79	156
	55-59 ans	741	290	451	154	192	136	259
	60-64 ans	722	324	398	128	159	196	239
	65-69 ans	546	217	329	58	103	159	226
	70-74 ans	473	175	298	54	75	121	223
	50-74 ans	3 299	1 348	1 951	657	848	691	1 103
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	483	191	292	134	180	57	112
	55-59 ans	462	168	294	80	121	88	173
	60-64 ans	468	200	268	67	96	133	172
	65-69 ans	323	136	187	32	50	104	137
	70-74 ans	256	101	155	28	37	73	118
	50-74 ans	1 992	796	1 196	341	484	455	712
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	334	151	183	129	139	22	44
	55-59 ans	279	122	157	74	71	48	86
	60-64 ans	254	124	130	61	63	63	67
	65-69 ans	223	81	142	26	53	55	89
	70-74 ans	217	74	143	26	38	48	105
	50-74 ans	1 307	552	755	316	364	236	391
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 755	3 032	5 723	2 059	3 570	973	2 153
	55-59 ans	7 034	2 355	4 679	906	1 473	1 449	3 206
	60-64 ans	6 535	2 324	4 211	736	1 100	1 588	3 111
	65-69 ans	4 576	1 792	2 784	424	523	1 368	2 261
	70-74 ans	3 767	1 347	2 420	243	385	1 104	2 035
	50-74 ans	30 667	10 850	19 817	4 368	7 051	6 482	12 766
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	73	32	41	22	35	10	6
	55-59 ans	75	29	46	12	21	17	25
	60-64 ans	62	31	31	11	8	20	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	42	23	19	9	6	14	13
	70-74 ans	36	18	18	3	3	15	15
	50-74 ans	288	133	155	57	73	76	82
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	73	32	41	22	35	10	6
	55-59 ans	75	29	46	12	21	17	25
	60-64 ans	61	30	31	11	8	19	23
	65-69 ans	40	22	18	8	6	14	12
	70-74 ans	36	18	18	3	3	15	15
	50-74 ans	285	131	154	56	73	75	81
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11
	70-74 ans	30	13	17	3	2	10	15
	50-74 ans	245	108	137	48	60	60	77
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	44	14	30	11	24	3	6
	55-59 ans	40	19	21	10	11	9	10
	60-64 ans	38	15	23	4	3	11	20
	65-69 ans	26	14	12	3	4	11	8
	70-74 ans	20	5	15	2	2	3	13
	50-74 ans	168	67	101	30	44	37	57
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11
	70-74 ans	29	13	16	3	2	10	14
	50-74 ans	244	108	136	48	60	60	76
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,0	10,7	8,0	12,0	8,6	7,9	7,1
	55-59 ans	10,1	11,7	9,3	15,7	12,4	9,1	7,9
	60-64 ans	10,6	13,2	9,2	16,1	13,7	11,9	7,5
	65-69 ans	11,4	11,6	11,2	12,9	17,9	11,2	9,6
	70-74 ans	11,9	12,3	11,6	20,1	17,7	10,5	10,4
	50-74 ans	10,3	11,8	9,5	14,0	11,4	10,3	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	4,7	3,1	5,9	3,7	2,2	2,0
	55-59 ans	3,8	4,9	3,2	7,6	4,6	3,2	2,6
	60-64 ans	3,7	5,1	3,0	7,7	5,4	3,8	2,1
	65-69 ans	4,6	4,3	4,9	5,8	9,2	3,9	3,8
	70-74 ans	5,4	5,2	5,6	9,7	9,0	4,2	4,9
	50-74 ans	4,1	4,8	3,7	6,7	4,9	3,5	3,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,1	55,8	61,5	51,0	56,4	72,2	71,8
	55-59 ans	62,3	57,9	65,2	51,9	63,0	64,7	66,8
	60-64 ans	64,8	61,7	67,3	52,3	60,4	67,9	72,0
	65-69 ans	59,2	62,7	56,8	55,2	48,5	65,4	60,6
	70-74 ans	54,1	57,7	52,0	51,9	49,3	60,3	52,9
	50-74 ans	60,4	59,1	61,3	51,9	57,1	65,8	64,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	0,8	1,1	0,7	1,1	1,0	1,0	0,3
	55-59 ans	1,1	1,2	1,0	1,3	1,4	1,2	0,8
	60-64 ans	0,9	1,3	0,7	1,5	0,7	1,3	0,7
	65-69 ans	0,9	1,3	0,7	2,1	1,1	1,0	0,6
	70-74 ans	1,0	1,3	0,7	1,2	0,8	1,4	0,7
	50-74 ans	0,9	1,2	0,8	1,3	1,0	1,2	0,6
50-74 ans **	1,0	1,2	0,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,4	96,8	100,0	100,0	100,0	95,0	100,0
	65-69 ans	95,2	95,7	94,7	88,9	100,0	100,0	92,3
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 2 - Région: MARTINIQUE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,0	98,5	99,4	98,2	100,0	98,7	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,5	75,0	82,9	77,3	80,0	70,0	100,0
	55-59 ans	90,7	93,1	89,1	91,7	85,7	94,1	92,0
	60-64 ans	86,9	83,3	90,3	90,9	75,0	78,9	95,7
	65-69 ans	90,0	86,4	94,4	87,5	100,0	85,7	91,7
	70-74 ans	83,3	72,2	94,4	100,0	66,7	66,7	100,0
	50-74 ans	86,0	82,4	89,0	85,7	82,2	80,0	95,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	75,9	58,3	88,2	64,7	85,7	42,9	100,0
	55-59 ans	58,8	70,4	51,2	90,9	61,1	56,3	43,5
	60-64 ans	71,7	60,0	82,1	40,0	50,0	73,3	90,9
	65-69 ans	72,2	73,7	70,6	42,9	66,7	91,7	72,7
	70-74 ans	66,7	38,5	88,2	66,7	100,0	30,0	86,7
	50-74 ans	68,6	62,0	73,7	62,5	73,3	61,7	74,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)