

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 593	1 351	1 242	982	855	369	387
	55-59 ans	2 545	1 283	1 262	547	443	736	819
	60-64 ans	2 929	1 486	1 443	542	434	944	1 009
	65-69 ans	2 226	1 165	1 061	339	304	826	757
	70-74 ans	1 934	957	977	287	245	670	732
	50-74 ans	12 227	6 242	5 985	2 697	2 281	3 545	3 704
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 638	1 378	1 260	1 001	870	377	390
	55-59 ans	2 587	1 302	1 285	557	458	745	827
	60-64 ans	2 981	1 516	1 465	552	443	964	1 022
	65-69 ans	2 276	1 193	1 083	345	312	848	771
	70-74 ans	2 003	1 000	1 003	304	253	696	750
	50-74 ans	12 485	6 389	6 096	2 759	2 336	3 630	3 760
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 450	656	794	477	548	179	246
	55-59 ans	1 281	545	736	238	238	307	498
	60-64 ans	1 386	589	797	198	240	391	557
	65-69 ans	1 006	398	608	125	173	273	435
	70-74 ans	837	341	496	97	119	244	377
	50-74 ans	5 960	2 529	3 431	1 135	1 318	1 394	2 113
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	160	96	64	70	44	26	20
	55-59 ans	154	76	78	25	32	51	46
	60-64 ans	159	78	81	27	19	51	62
	65-69 ans	110	65	45	17	10	48	35
	70-74 ans	83	39	44	10	8	29	36
	50-74 ans	666	354	312	149	113	205	199
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	15	10	5	8	4	2	1
	55-59 ans	16	9	7	5	1	4	6
	60-64 ans	20	12	8	4	0	8	8
	65-69 ans	14	9	5	1	0	8	5
	70-74 ans	8	3	5	2	0	1	5
	50-74 ans	73	43	30	20	5	23	25
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	282	168	114	119	82	49	32
	55-59 ans	317	175	142	69	58	106	84

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	391	214	177	74	49	140	128
	65-69 ans	329	186	143	53	48	133	95
	70-74 ans	286	160	126	45	30	115	96
	50-74 ans	1 605	903	702	360	267	543	435
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	415	267	148	194	100	73	48
	55-59 ans	467	300	167	137	59	163	108
	60-64 ans	609	389	220	151	72	238	148
	65-69 ans	488	326	162	83	48	243	114
	70-74 ans	466	270	196	87	55	183	141
	50-74 ans	2 445	1 552	893	652	334	900	559
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	112	66	46	47	32	19	14
	55-59 ans	147	85	62	41	26	44	36
	60-64 ans	214	132	82	63	30	69	52
	65-69 ans	178	121	57	46	15	75	42
	70-74 ans	191	117	74	36	21	81	53
	50-74 ans	842	521	321	233	124	288	197
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	33	14	19	11	12	3	7
	55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
	60-64 ans	14	7	7	1	1	6	6
	65-69 ans	14	7	7	1	2	6	5
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	94	46	48	17	16	29	32
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	45	25	20	20	14	5	6
	55-59 ans	50	32	18	13	7	19	11
	60-64 ans	57	31	26	10	9	21	17
	65-69 ans	41	25	16	7	5	18	11
	70-74 ans	40	21	19	8	6	13	13
	50-74 ans	233	134	99	58	41	76	58
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	30	18	12	13	9	5	3
	55-59 ans	32	14	18	5	12	9	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	25	13	12	6	6	7	6
	65-69 ans	17	14	3	3	2	11	1
	70-74 ans	26	15	11	7	3	8	8
	50-74 ans	130	74	56	34	32	40	24
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	699	437	262	314	182	123	80
	55-59 ans	788	477	311	207	118	270	193
	60-64 ans	1 007	606	401	227	122	379	279
	65-69 ans	819	512	307	136	97	376	210
	70-74 ans	752	430	322	132	85	298	237
	50-74 ans	4 065	2 462	1 603	1 016	604	1 446	999
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	415	267	148	194	100	73	48
	55-59 ans	467	300	167	137	59	163	108
	60-64 ans	609	389	220	151	72	238	148
	65-69 ans	488	326	162	83	48	243	114
	70-74 ans	466	270	196	87	55	183	141
	50-74 ans	2 445	1 552	893	652	334	900	559
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	308	203	105	152	72	51	33
	55-59 ans	359	241	118	111	40	130	78
	60-64 ans	467	301	166	119	57	182	109
	65-69 ans	395	269	126	69	34	200	92
	70-74 ans	342	201	141	67	45	134	96
	50-74 ans	1 871	1 215	656	518	248	697	408
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	112	66	46	47	32	19	14
	55-59 ans	147	85	62	41	26	44	36
	60-64 ans	214	132	82	63	30	69	52
	65-69 ans	180	122	58	46	15	76	43
	70-74 ans	192	118	74	36	21	82	53
	50-74 ans	845	523	322	233	124	290	198

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,5	98,9	98,6	98,7	98,4	99,2
	55-59 ans	98,8	98,9	98,7	98,7	97,6	99,1	99,4
	60-64 ans	99,0	98,9	99,0	98,9	98,4	99,0	99,3
	65-69 ans	98,9	98,6	99,3	98,8	98,4	98,6	99,6
	70-74 ans	98,4	98,2	98,7	97,3	98,8	98,5	98,7
	50-74 ans	98,8	98,7	98,9	98,6	98,4	98,7	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,0	47,6	63,0	47,7	63,0	47,5	63,1
	55-59 ans	49,5	41,9	57,3	42,7	52,0	41,2	60,2
	60-64 ans	46,5	38,9	54,4	35,9	54,2	40,6	54,5
	65-69 ans	44,2	33,4	56,1	36,2	55,4	32,2	56,4
	70-74 ans	41,8	34,1	49,5	31,9	47,0	35,1	50,3
	50-74 ans	47,7	39,6	56,3	41,1	56,4	38,4	56,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	7,0	5,1	7,0	5,1	6,9	5,1
	55-59 ans	6,0	5,8	6,1	4,5	7,0	6,8	5,6
	60-64 ans	5,3	5,1	5,5	4,9	4,3	5,3	6,1
	65-69 ans	4,8	5,4	4,2	4,9	3,2	5,7	4,5
	70-74 ans	4,1	3,9	4,4	3,3	3,2	4,2	4,8
	50-74 ans	5,3	5,5	5,1	5,4	4,8	5,6	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,7	0,4	0,8	0,5	0,5	0,3
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	0,9	0,2	0,5	0,7
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	0,7	0,0	0,8	0,8
	65-69 ans	0,6	0,8	0,5	0,3	0,0	0,9	0,6
	70-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,7	0,0	0,1	0,7
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,2	0,6	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,7	12,2	9,0	11,9	9,4	13,0	8,2
	55-59 ans	12,3	13,4	11,1	12,4	12,7	14,2	10,2
	60-64 ans	13,1	14,1	12,1	13,4	11,1	14,5	12,5
	65-69 ans	14,5	15,6	13,2	15,4	15,4	15,7	12,3
	70-74 ans	14,3	16,0	12,6	14,8	11,9	16,5	12,8
	50-74 ans	12,9	14,1	11,5	13,0	11,4	15,0	11,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,7	19,4	11,7	19,4	11,5	19,4	12,3
	55-59 ans	18,1	23,0	13,0	24,6	12,9	21,9	13,1
	60-64 ans	20,4	25,7	15,0	27,4	16,3	24,7	14,5
	65-69 ans	21,4	27,3	15,0	24,1	15,4	28,7	14,8
	70-74 ans	23,3	27,0	19,5	28,6	21,7	26,3	18,8
	50-74 ans	19,6	24,3	14,6	23,6	14,3	24,8	14,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,8	3,7	4,7	3,7	5,0	3,6
	55-59 ans	5,7	6,5	4,8	7,4	5,7	5,9	4,4
	60-64 ans	7,2	8,7	5,6	11,4	6,8	7,2	5,1
	65-69 ans	7,8	10,1	5,3	13,3	4,8	8,8	5,4
	70-74 ans	9,5	11,7	7,4	11,8	8,3	11,6	7,1
	50-74 ans	6,7	8,2	5,3	8,4	5,3	7,9	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,0	1,5	1,1	1,4	0,8	1,8
	55-59 ans	0,7	0,7	0,8	0,2	0,2	1,1	1,1
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,6	0,6
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,7	0,6
	70-74 ans	0,7	0,9	0,5	1,0	0,0	0,9	0,7
	50-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,0	1,6	1,3	1,5
	55-59 ans	1,9	2,5	1,4	2,3	1,5	2,6	1,3
	60-64 ans	1,9	2,0	1,8	1,8	2,0	2,2	1,7
	65-69 ans	1,8	2,1	1,5	2,0	1,6	2,1	1,4
	70-74 ans	2,0	2,1	1,9	2,6	2,4	1,9	1,7
	50-74 ans	1,9	2,1	1,6	2,1	1,8	2,1	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,3	1,0	1,3	1,0	1,3	0,8
	55-59 ans	1,2	1,1	1,4	0,9	2,6	1,2	0,7
	60-64 ans	0,8	0,9	0,8	1,1	1,4	0,7	0,6
	65-69 ans	0,7	1,2	0,3	0,9	0,6	1,3	0,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées		70-74 ans	1,3	1,5	1,1	2,3	1,2	1,1	1,1
		50-74 ans	1,0	1,2	0,9	1,2	1,4	1,1	0,6
		50-54 ans	4,4	6,0	3,0	6,1	3,2	5,6	2,8
		55-59 ans	5,9	8,1	4,1	9,3	4,7	7,4	3,8
		60-64 ans	7,2	9,7	5,1	11,6	5,4	8,9	5,0
		65-69 ans	8,3	11,5	5,6	11,6	7,1	11,4	5,1
		70-74 ans	9,6	12,4	7,3	15,4	8,3	11,4	7,0
		50-74 ans	6,6	9,0	4,7	9,0	4,7	9,0	4,8
	50-74 ans **	6,8	9,0	4,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	2,6	3,7	1,7	3,8	1,7	3,3	1,7
		55-59 ans	3,5	5,1	2,2	6,2	2,3	4,4	2,1
		60-64 ans	4,3	6,2	2,8	7,7	3,2	5,6	2,6
		65-69 ans	4,9	7,3	3,0	7,1	3,5	7,4	2,8
		70-74 ans	5,9	7,8	4,4	10,2	5,4	7,0	4,2
		50-74 ans	4,0	5,7	2,6	5,8	2,6	5,6	2,7
		50-74 ans **	4,1	5,7	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	1,9	2,8	1,2	3,0	1,2	2,3	1,2
		55-59 ans	2,7	4,1	1,6	5,0	1,6	3,5	1,5
		60-64 ans	3,3	4,8	2,1	6,1	2,5	4,3	2,0
		65-69 ans	4,0	6,0	2,3	5,9	2,5	6,1	2,2
		70-74 ans	4,3	5,8	3,2	7,8	4,4	5,1	2,8
		50-74 ans	3,1	4,4	1,9	4,6	1,9	4,3	1,9
		50-74 ans **	3,1	4,4	2,0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,6	0,9	0,5
		55-59 ans	1,1	1,4	0,8	1,9	1,0	1,2	0,7
		60-64 ans	1,5	2,1	1,0	3,2	1,3	1,6	0,9
		65-69 ans	1,8	2,7	1,1	3,9	1,1	2,3	1,0
		70-74 ans	2,4	3,4	1,7	4,2	2,1	3,1	1,6
		50-74 ans	1,4	1,9	1,0	2,1	1,0	1,8	0,9
		50-74 ans **	1,4	1,9	1,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)