

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 32 - Région: NORD_PAS_DE_CALAIS_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 348	698	650	428	368	270	282
	55-59 ans	1 457	758	699	176	127	582	572
	60-64 ans	1 810	905	905	161	153	744	752
	65-69 ans	1 550	806	744	112	100	694	644
	70-74 ans	1 159	597	562	86	64	511	498
	50-74 ans	7 324	3 764	3 560	963	812	2 801	2 748
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 363	703	660	432	371	271	289
	55-59 ans	1 470	761	709	178	128	583	581
	60-64 ans	1 837	916	921	162	155	754	766
	65-69 ans	1 572	815	757	114	102	701	655
	70-74 ans	1 183	610	573	87	66	523	507
	50-74 ans	7 425	3 805	3 620	973	822	2 832	2 798
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	780	342	438	208	241	134	197
	55-59 ans	770	314	456	60	70	254	386
	60-64 ans	900	364	536	55	87	309	449
	65-69 ans	727	310	417	37	52	273	365
	70-74 ans	554	258	296	29	30	229	266
	50-74 ans	3 731	1 588	2 143	389	480	1 199	1 663
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	56	34	22	13	9	21	13
	55-59 ans	56	30	26	10	7	20	19
	60-64 ans	59	34	25	9	4	25	21
	65-69 ans	49	23	26	4	3	19	23
	70-74 ans	40	14	26	2	3	12	23
	50-74 ans	260	135	125	38	26	97	99
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	28	17	11	8	2	9	9
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	193	125	68	79	43	46	25
	55-59 ans	209	142	67	32	14	110	53
	60-64 ans	294	172	122	25	22	147	100
	65-69 ans	262	158	104	21	9	137	95
	70-74 ans	186	104	82	11	11	93	71

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 32 - Région: NORD_PAS_DE_CALAIS_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 144	701	443	168	99	533	344
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	167	104	63	70	40	34	23
	55-59 ans	227	154	73	41	22	113	51
	60-64 ans	311	194	117	34	19	160	98
	65-69 ans	275	179	96	30	11	149	85
	70-74 ans	206	125	81	20	6	105	75
	50-74 ans	1 186	756	430	195	98	561	332
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	63	39	24	22	17	17	7
	55-59 ans	95	54	41	20	8	34	33
	60-64 ans	125	79	46	29	12	50	34
	65-69 ans	139	79	60	17	13	62	47
	70-74 ans	118	70	48	18	10	52	38
	50-74 ans	540	321	219	106	60	215	159
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	9	8	1	2	0	6	1
	60-64 ans	18	7	11	1	2	6	9
	65-69 ans	15	3	12	1	4	2	8
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	51	22	29	5	7	17	22
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	8	5	4	4	4	1
	55-59 ans	19	10	9	0	2	10	7
	60-64 ans	16	7	9	1	3	6	6
	65-69 ans	14	10	4	1	0	9	4
	70-74 ans	19	8	11	2	0	6	11
	50-74 ans	81	43	38	8	9	35	29
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	6	1	5	0	2	1	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	19	5	14	1	4	4	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	360	229	131	149	83	80	48
	55-59 ans	436	296	140	73	36	223	104

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 32 - Région: NORD_PAS_DE_CALAIS_PICARDIE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	605	366	239	59	41	307	198
	65-69 ans	537	337	200	51	20	286	180
	70-74 ans	392	229	163	31	17	198	146
	50-74 ans	2 330	1 457	873	363	197	1 094	676
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	167	104	63	70	40	34	23
	55-59 ans	227	154	73	41	22	113	51
	60-64 ans	311	194	117	34	19	160	98
	65-69 ans	275	179	96	30	11	149	85
	70-74 ans	206	125	81	20	6	105	75
	50-74 ans	1 186	756	430	195	98	561	332
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	126	79	47	54	31	25	16
	55-59 ans	161	106	55	27	18	79	37
	60-64 ans	218	135	83	25	12	110	71
	65-69 ans	187	129	58	23	6	106	52
	70-74 ans	144	88	56	14	5	74	51
	50-74 ans	836	537	299	143	72	394	227
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	157	100	57	66	38	34	19
	55-59 ans	209	144	65	41	20	103	45
	60-64 ans	278	171	107	30	18	141	89
	65-69 ans	249	168	81	32	9	136	72
	70-74 ans	185	111	74	18	7	93	67
	50-74 ans	1 078	694	384	187	92	507	292
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	63	39	24	22	17	17	7
	55-59 ans	95	54	41	20	8	34	33
	60-64 ans	125	79	46	29	12	50	34
	65-69 ans	142	80	62	17	15	63	47
	70-74 ans	120	71	49	18	10	53	39
	50-74 ans	545	323	222	106	62	217	160

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,9	98,8	99,8	99,5	100,0	97,9
	55-59 ans	99,5	99,9	99,0	99,4	100,0	100,0	98,8
	60-64 ans	99,0	99,2	98,8	99,4	98,7	99,2	98,8
	65-69 ans	99,3	99,5	99,1	98,2	99,0	99,7	99,1
	70-74 ans	99,3	99,7	98,9	100,0	98,5	99,6	99,0
	50-74 ans	99,3	99,6	98,9	99,5	99,3	99,6	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,2	48,6	66,4	48,1	65,0	49,4	68,2
	55-59 ans	52,4	41,3	64,3	33,7	54,7	43,6	66,4
	60-64 ans	49,0	39,7	58,2	34,0	56,1	41,0	58,6
	65-69 ans	46,2	38,0	55,1	32,5	51,0	38,9	55,7
	70-74 ans	46,8	42,3	51,7	33,3	45,5	43,8	52,5
	50-74 ans	50,2	41,7	59,2	40,0	58,4	42,3	59,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,1	4,8	3,3	3,0	2,4	7,7	4,5
	55-59 ans	3,8	3,9	3,7	5,6	5,5	3,4	3,3
	60-64 ans	3,2	3,7	2,7	5,6	2,6	3,3	2,7
	65-69 ans	3,1	2,8	3,4	3,5	2,9	2,7	3,5
	70-74 ans	3,4	2,3	4,5	2,3	4,5	2,3	4,5
	50-74 ans	3,5	3,5	3,5	3,9	3,2	3,4	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,7	0,3	0,0	0,3
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	1,1	0,0	0,2	0,5
	60-64 ans	0,3	0,7	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0
	65-69 ans	0,4	0,2	0,5	0,0	1,0	0,3	0,5
	70-74 ans	0,4	0,5	0,3	1,1	0,0	0,4	0,4
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,8	0,2	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,2	17,8	10,3	18,3	11,6	17,0	8,7
	55-59 ans	14,2	18,7	9,4	18,0	10,9	18,9	9,1
	60-64 ans	16,0	18,8	13,2	15,4	14,2	19,5	13,1
	65-69 ans	16,7	19,4	13,7	18,4	8,8	19,5	14,5
	70-74 ans	15,7	17,0	14,3	12,6	16,7	17,8	14,0
	50-74 ans	15,4	18,4	12,2	17,3	12,0	18,8	12,3

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12,3	14,8	9,5	16,2	10,8	12,5	8,0
	55-59 ans	15,4	20,2	10,3	23,0	17,2	19,4	8,8
	60-64 ans	16,9	21,2	12,7	21,0	12,3	21,2	12,8
	65-69 ans	17,5	22,0	12,7	26,3	10,8	21,3	13,0
	70-74 ans	17,4	20,5	14,1	23,0	9,1	20,1	14,8
	50-74 ans	16,0	19,9	11,9	20,0	11,9	19,8	11,9
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,5	3,6	5,1	4,6	6,3
55-59 ans		6,5	7,1	5,8	11,2	6,3	5,8	5,7
60-64 ans		6,8	8,6	5,0	17,9	7,7	6,6	4,4
65-69 ans		8,8	9,7	7,9	14,9	12,7	8,8	7,2
70-74 ans		10,0	11,5	8,4	20,7	15,2	9,9	7,5
50-74 ans		7,3	8,4	6,0	10,9	7,3	7,6	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4
	55-59 ans	0,6	1,1	0,1	1,1	0,0	1,0	0,2
	60-64 ans	1,0	0,8	1,2	0,6	1,3	0,8	1,2
	65-69 ans	1,0	0,4	1,6	0,9	3,9	0,3	1,2
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,5	0,9	0,6	0,8
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,0	1,1	0,8	0,9	1,1	1,5
55-59 ans		1,3	1,3	1,3	0,0	1,6	1,7	1,2
60-64 ans		0,9	0,8	1,0	0,6	1,9	0,8	0,8
65-69 ans		0,9	1,2	0,5	0,9	0,0	1,3	0,6
70-74 ans		1,6	1,3	1,9	2,3	0,0	1,1	2,2
50-74 ans		1,1	1,1	1,0	0,8	1,1	1,2	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	60-64 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	1,3	0,1	0,4
	65-69 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	70-74 ans	0,3	0,5	0,2	0,0	1,5	0,6	0,0
	50-74 ans	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1	0,4

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,0	5,6	2,7	6,1	3,0	4,7	2,3
	55-59 ans	5,2	8,0	3,0	10,5	4,5	7,4	2,6
	60-64 ans	6,3	8,6	4,5	9,0	5,7	8,5	4,3
	65-69 ans	7,4	10,2	5,0	12,7	4,4	9,9	5,1
	70-74 ans	7,7	10,3	5,7	12,9	5,9	9,9	5,7
	50-74 ans	5,9	8,3	4,0	8,2	3,9	8,3	4,0
50-74 ans **	6,0	8,2	4,0	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,5	1,3	2,9	1,5	2,0	1,1
	55-59 ans	2,7	4,2	1,5	5,9	2,8	3,8	1,3
	60-64 ans	3,3	4,6	2,2	5,2	2,6	4,5	2,1
	65-69 ans	3,8	5,4	2,4	7,5	2,4	5,2	2,4
	70-74 ans	4,1	5,6	2,8	8,3	2,1	5,3	2,9
	50-74 ans	3,0	4,3	2,0	4,4	2,0	4,3	2,0
50-74 ans **	3,0	4,2	2,0	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,9	1,0	2,2	1,1	1,5	0,8
	55-59 ans	1,9	2,9	1,2	3,9	2,3	2,6	0,9
	60-64 ans	2,3	3,2	1,6	3,8	1,7	3,1	1,6
	65-69 ans	2,6	3,9	1,5	5,7	1,3	3,7	1,5
	70-74 ans	2,8	3,9	2,0	5,8	1,7	3,7	2,0
	50-74 ans	2,1	3,1	1,4	3,2	1,4	3,0	1,4
50-74 ans **	2,1	3,0	1,4	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,4	1,2	2,7	1,4	2,0	0,9
	55-59 ans	2,5	3,9	1,4	5,9	2,5	3,4	1,1
	60-64 ans	2,9	4,0	2,0	4,6	2,5	3,9	1,9
	65-69 ans	3,4	5,1	2,0	8,0	2,0	4,7	2,0
	70-74 ans	3,6	5,0	2,6	7,5	2,4	4,7	2,6
	50-74 ans	2,7	3,9	1,8	4,2	1,8	3,8	1,7
50-74 ans **	2,8	3,9	1,7	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,6	1,0	0,3
	55-59 ans	1,1	1,5	0,9	2,9	1,0	1,1	0,8
	60-64 ans	1,3	1,9	0,9	4,4	1,7	1,4	0,7
	65-69 ans	1,9	2,4	1,6	4,2	3,3	2,2	1,3
	70-74 ans	2,4	3,2	1,7	7,5	3,5	2,7	1,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,4	1,8	1,0	2,4	1,2	1,6	1,0
	50-74 ans **	1,4	1,8	1,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)