

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 236	653	583	433	365	220	218
	55-59 ans	1 258	655	603	195	150	460	453
	60-64 ans	1 790	886	904	211	214	675	690
	65-69 ans	1 786	881	905	175	187	706	718
	70-74 ans	1 593	747	846	134	147	613	699
	50-74 ans	7 663	3 822	3 841	1 148	1 063	2 674	2 778
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 254	662	592	441	371	221	221
	55-59 ans	1 286	665	621	196	158	469	463
	60-64 ans	1 819	898	921	214	221	684	700
	65-69 ans	1 822	896	926	178	194	718	732
	70-74 ans	1 633	761	872	138	151	623	721
	50-74 ans	7 814	3 882	3 932	1 167	1 095	2 715	2 837
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	741	346	395	224	252	122	143
	55-59 ans	739	340	399	92	97	248	302
	60-64 ans	975	396	579	100	142	296	437
	65-69 ans	935	371	564	66	114	305	450
	70-74 ans	800	310	490	56	86	254	404
	50-74 ans	4 190	1 763	2 427	538	691	1 225	1 736
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	53	31	22	26	15	5	7
	55-59 ans	47	24	23	8	5	16	18
	60-64 ans	82	44	38	9	14	35	24
	65-69 ans	67	39	28	8	7	31	21
	70-74 ans	55	28	27	6	2	22	25
	50-74 ans	304	166	138	57	43	109	95
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	9	4	5	3	5	1	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	9	4	5	0	2	4	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	33	18	15	7	8	11	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	159	98	61	70	34	28	27
	55-59 ans	150	92	58	29	18	63	40
	60-64 ans	259	156	103	29	22	127	81
	65-69 ans	264	151	113	36	23	115	90
	70-74 ans	258	129	129	22	25	107	104

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 090	626	464	186	122	440	342
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	141	94	47	58	32	36	15
	55-59 ans	160	98	62	37	15	61	47
	60-64 ans	248	169	79	47	15	122	64
	65-69 ans	279	177	102	32	17	145	85
	70-74 ans	250	147	103	27	16	120	87
	50-74 ans	1 078	685	393	201	95	484	298
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	35	22	13	14	9	8	4
	55-59 ans	66	42	24	17	7	25	17
	60-64 ans	80	45	35	11	10	34	25
	65-69 ans	99	63	36	17	11	46	25
	70-74 ans	120	74	46	13	11	61	35
	50-74 ans	400	246	154	72	48	174	106
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	9	5	4	4	1	1	3
	60-64 ans	15	10	5	0	0	10	5
	65-69 ans	7	4	3	1	2	3	1
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	44	27	17	8	5	19	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	33	21	12	13	6	8	6
	55-59 ans	26	16	10	2	1	14	9
	60-64 ans	46	25	21	9	5	16	16
	65-69 ans	48	26	22	6	4	20	18
	70-74 ans	41	23	18	6	3	17	15
	50-74 ans	194	111	83	36	19	75	64
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	19	11	8	10	4	1	4
	55-59 ans	24	10	14	1	6	9	8
	60-64 ans	28	12	16	3	6	9	10
	65-69 ans	27	13	14	3	5	10	9
	70-74 ans	25	9	16	2	3	7	13
	50-74 ans	123	55	68	19	24	36	44
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	301	193	108	129	66	64	42
	55-59 ans	310	190	120	66	33	124	87

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région:

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	509	325	184	76	38	249	146
	65-69 ans	546	330	216	69	41	261	175
	70-74 ans	510	278	232	50	41	228	191
	50-74 ans	2 176	1 316	860	390	219	926	641
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	141	94	47	58	32	36	15
	55-59 ans	160	98	62	37	15	61	47
	60-64 ans	248	169	79	47	15	122	64
	65-69 ans	279	177	102	32	17	145	85
	70-74 ans	250	147	103	27	16	120	87
	50-74 ans	1 078	685	393	201	95	484	298
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	75	44	31	27	20	17	11
	55-59 ans	76	50	26	26	8	24	18
	60-64 ans	132	90	42	34	12	56	30
	65-69 ans	132	90	42	25	11	65	31
	70-74 ans	155	101	54	22	8	79	46
	50-74 ans	570	375	195	134	59	241	136
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	120	80	40	51	27	29	13
	55-59 ans	129	84	45	35	10	49	35
	60-64 ans	230	155	75	43	16	112	59
	65-69 ans	237	166	71	29	12	137	59
	70-74 ans	233	142	91	30	10	112	81
	50-74 ans	949	627	322	188	75	439	247
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	35	22	13	14	9	8	4
	55-59 ans	66	42	24	17	7	25	17
	60-64 ans	80	45	35	11	10	34	25
	65-69 ans	99	63	36	17	11	46	25
	70-74 ans	120	74	46	13	11	61	35
	50-74 ans	400	246	154	72	48	174	106

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 93 - Région :

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,6	98,8	98,2	98,9	99,5	98,6
	55-59 ans	98,1	98,5	97,6	99,5	96,8	98,1	97,8
	60-64 ans	98,6	98,8	98,5	98,6	97,3	98,8	98,9
	65-69 ans	98,7	98,8	98,6	98,3	97,4	98,9	98,9
	70-74 ans	98,5	99,1	98,0	98,5	99,3	99,2	97,8
	50-74 ans	98,5	98,8	98,3	98,5	98,1	98,9	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,1	52,3	66,7	50,8	67,9	55,2	64,7
	55-59 ans	57,5	51,1	64,3	46,9	61,4	52,9	65,2
	60-64 ans	53,6	44,1	62,9	46,7	64,3	43,3	62,4
	65-69 ans	51,3	41,4	60,9	37,1	58,8	42,5	61,5
	70-74 ans	49,0	40,7	56,2	40,6	57,0	40,8	56,0
	50-74 ans	53,6	45,4	61,7	46,1	63,1	45,1	61,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,2	4,7	3,7	5,9	4,0	2,3	3,2
	55-59 ans	3,7	3,6	3,7	4,1	3,2	3,4	3,9
	60-64 ans	4,5	4,9	4,1	4,2	6,3	5,1	3,4
	65-69 ans	3,7	4,4	3,0	4,5	3,6	4,3	2,9
	70-74 ans	3,4	3,7	3,1	4,3	1,3	3,5	3,5
	50-74 ans	3,9	4,3	3,5	4,9	3,9	4,0	3,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,7	1,3	0,5	0,0
	55-59 ans	0,5	0,6	0,3	0,5	0,0	0,6	0,4
	60-64 ans	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,1	0,1
	65-69 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	1,0	0,6	0,4
	70-74 ans	0,3	0,5	0,1	1,4	0,0	0,3	0,1
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,6	0,7	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,7	14,8	10,3	15,9	9,2	12,7	12,2
	55-59 ans	11,7	13,8	9,3	14,8	11,4	13,4	8,6
	60-64 ans	14,2	17,4	11,2	13,6	10,0	18,6	11,6
	65-69 ans	14,5	16,9	12,2	20,2	11,9	16,0	12,3
	70-74 ans	15,8	17,0	14,8	15,9	16,6	17,2	14,4
	50-74 ans	13,9	16,1	11,8	15,9	11,1	16,2	12,1

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	11,2	14,2	7,9	13,2	8,6	16,3	6,8
	55-59 ans	12,4	14,7	10,0	18,9	9,5	13,0	10,2
	60-64 ans	13,6	18,8	8,6	22,0	6,8	17,8	9,1
	65-69 ans	15,3	19,8	11,0	18,0	8,8	20,2	11,6
	70-74 ans	15,3	19,3	11,8	19,6	10,6	19,3	12,1
	50-74 ans	13,8	17,6	10,0	17,2	8,7	17,8	10,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	3,3	2,2	3,2	2,4	3,6	1,8
	55-59 ans	5,1	6,3	3,9	8,7	4,4	5,3	3,7
	60-64 ans	4,4	5,0	3,8	5,1	4,5	5,0	3,6
	65-69 ans	5,4	7,0	3,9	9,6	5,7	6,4	3,4
	70-74 ans	7,3	9,7	5,3	9,4	7,3	9,8	4,9
	50-74 ans	5,1	6,3	3,9	6,2	4,4	6,4	3,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,2	0,5	0,2	0,5	0,0	0,5
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	2,0	0,6	0,2	0,6
	60-64 ans	0,8	1,1	0,5	0,0	0,0	1,5	0,7
	65-69 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	1,0	0,4	0,1
	70-74 ans	0,6	0,9	0,2	1,4	0,0	0,8	0,3
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0,7	0,5	0,7	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	3,2	2,0	2,9	1,6	3,6	2,7
	55-59 ans	2,0	2,4	1,6	1,0	0,6	3,0	1,9
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	4,2	2,3	2,3	2,3
	65-69 ans	2,6	2,9	2,4	3,4	2,1	2,8	2,5
	70-74 ans	2,5	3,0	2,1	4,3	2,0	2,7	2,1
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,1	1,7	2,8	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,5	1,7	1,4	2,3	1,1	0,5	1,8
	55-59 ans	1,9	1,5	2,3	0,5	3,8	1,9	1,7
	60-64 ans	1,5	1,3	1,7	1,4	2,7	1,3	1,4
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	1,7	2,6	1,4	1,2
	70-74 ans	1,5	1,2	1,8	1,4	2,0	1,1	1,8
	50-74 ans	1,6	1,4	1,7	1,6	2,2	1,3	1,6

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,8	2,4	5,2	2,4	4,1	2,4
	55-59 ans	4,1	5,5	2,9	8,9	3,9	4,6	2,6
	60-64 ans	5,7	8,1	3,7	10,0	4,4	7,7	3,6
	65-69 ans	6,6	8,9	4,8	12,5	6,3	8,3	4,5
	70-74 ans	7,8	9,3	6,5	13,4	9,4	8,7	6,1
	50-74 ans	5,5	7,2	4,0	7,9	3,9	7,0	4,0
	50-74 ans **	5,3	6,9	3,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,3	1,0	2,3	1,1	2,3	0,8
	55-59 ans	2,1	2,9	1,5	5,0	1,8	2,3	1,4
	60-64 ans	2,8	4,2	1,6	6,2	1,7	3,8	1,6
	65-69 ans	3,4	4,8	2,3	5,8	2,6	4,6	2,2
	70-74 ans	3,8	4,9	2,9	7,3	3,7	4,6	2,8
	50-74 ans	2,7	3,8	1,8	4,1	1,7	3,7	1,8
	50-74 ans **	2,6	3,6	1,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,6
	55-59 ans	1,0	1,5	0,6	3,5	0,9	0,9	0,5
	60-64 ans	1,5	2,3	0,8	4,5	1,4	1,7	0,7
	65-69 ans	1,6	2,4	0,9	4,5	1,7	2,1	0,8
	70-74 ans	2,4	3,4	1,5	5,9	1,8	3,0	1,5
	50-74 ans	1,4	2,1	0,9	2,7	1,1	1,8	0,8
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,9
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,0	0,9	2,0	1,0	1,9	0,7
	55-59 ans	1,7	2,4	1,1	4,7	1,2	1,8	1,1
	60-64 ans	2,6	3,9	1,5	5,7	1,9	3,5	1,4
	65-69 ans	2,9	4,5	1,6	5,2	1,8	4,3	1,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,5	4,7	2,5	8,1	2,3	4,3	2,6
	50-74 ans	2,4	3,5	1,5	3,8	1,3	3,3	1,5
	50-74 ans **	2,3	3,2	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,2
	55-59 ans	0,9	1,2	0,6	2,3	0,8	0,9	0,5
	60-64 ans	0,9	1,1	0,7	1,5	1,2	1,0	0,6
	65-69 ans	1,2	1,7	0,8	3,1	1,7	1,5	0,6
	70-74 ans	1,8	2,5	1,3	3,5	2,5	2,3	1,1
	50-74 ans	1,0	1,4	0,7	1,5	0,9	1,3	0,7
	50-74 ans **	1,0	1,3	0,7

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)