

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7683	3583	4100	2136	2275	1447	1825
	55-59 ans	7278	3284	3994	618	646	2666	3348
	60-64 ans	8342	3699	4643	568	631	3131	4012
	65-69 ans	6539	3055	3484	386	407	2669	3077
	70-74 ans	5201	2445	2756	247	314	2198	2442
	50-74 ans	35043	16066	18977	3955	4273	12111	14704
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	415	191	224	136	143	55	81
	55-59 ans	423	209	214	76	67	133	147
	60-64 ans	403	200	203	50	50	150	153
	65-69 ans	312	141	171	25	49	116	122
	70-74 ans	291	129	162	28	32	101	130
	50-74 ans	1844	870	974	315	341	555	633
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	306	142	164	97	98	45	66
	55-59 ans	325	149	176	44	49	105	127
	60-64 ans	327	171	156	39	24	132	132
	65-69 ans	257	117	140	17	37	100	103
	70-74 ans	218	99	119	19	21	80	98
	50-74 ans	1433	678	755	216	229	462	526
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	109	49	60	39	45	10	15
	55-59 ans	98	60	38	32	18	28	20
	60-64 ans	76	29	47	11	26	18	21
	65-69 ans	55	24	31	8	12	16	19
	70-74 ans	73	30	43	9	11	21	32
	50-74 ans	411	192	219	99	112	93	107
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7574	3534	4040	2097	2230	1437	1810
	55-59 ans	7180	3224	3956	586	628	2638	3328
	60-64 ans	8266	3670	4596	557	605	3113	3991
	65-69 ans	6484	3031	3453	378	395	2653	3058
	70-74 ans	5127	2415	2712	238	303	2177	2409

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34631	15874	18757	3856	4161	12018	14596
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	205	104	101	61	63	43	38
	55-59 ans	208	110	98	26	22	84	76
	60-64 ans	220	120	100	19	18	101	82
	65-69 ans	216	119	97	22	14	97	83
	70-74 ans	185	100	85	10	6	90	79
	50-74 ans	1034	553	481	138	123	415	358
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	202	103	99	61	62	42	37
	55-59 ans	205	108	97	26	22	82	75
	60-64 ans	219	120	99	19	18	101	81
	65-69 ans	209	115	94	21	12	94	82
	70-74 ans	176	96	80	9	6	87	74
	50-74 ans	1011	542	469	136	120	406	349
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	183	93	90	54	56	39	34
	55-59 ans	186	96	90	18	22	78	68
	60-64 ans	203	109	94	15	16	94	78
	65-69 ans	181	95	86	16	10	79	76
	70-74 ans	160	90	70	8	5	82	65
	50-74 ans	913	483	430	111	109	372	321
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	175	89	86	52	54	37	32
	55-59 ans	175	90	85	16	21	74	64
	60-64 ans	191	101	90	13	16	88	74
	65-69 ans	160	82	78	13	9	69	69
	70-74 ans	143	80	63	8	4	72	59
	50-74 ans	844	442	402	102	104	340	298
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	183	93	90	54	56	39	34
	55-59 ans	186	96	90	18	22	78	68
	60-64 ans	203	109	94	15	16	94	78
	65-69 ans	178	95	83	16	10	79	73
	70-74 ans	160	90	70	8	5	82	65
	50-74 ans	910	483	427	111	109	372	318
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	182	93	89	54	55	39	34
		55-59 ans	186	96	90	18	22	78	68
		60-64 ans	200	107	93	15	16	92	77
		65-69 ans	181	95	86	16	10	79	76
		70-74 ans	160	90	70	8	5	82	65
		50-74 ans	909	481	428	111	108	370	320
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	183	93	90	54	56	39	34
		55-59 ans	186	96	90	18	22	78	68
		60-64 ans	203	109	94	15	16	94	78
		65-69 ans	181	95	86	16	10	79	76
		70-74 ans	160	90	70	8	5	82	65
		50-74 ans	913	483	430	111	109	372	321
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	101	42	59	22	38	20	21
		55-59 ans	87	37	50	3	14	34	36
		60-64 ans	95	41	54	2	9	39	45
		65-69 ans	88	36	52	5	5	31	47
		70-74 ans	64	27	37	2	2	25	35
		50-74 ans	435	183	252	34	68	149	184
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	13	9	4	5	3	4	1
		55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
		60-64 ans	17	8	9	1	1	7	8
		65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
		70-74 ans	11	5	6	0	1	5	5
		50-74 ans	54	29	25	7	6	22	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	28	18	10	10	7	8	3
	55-59 ans	25	13	12	2	3	11	9
	60-64 ans	31	19	12	3	2	16	10
	65-69 ans	28	17	11	3	1	14	10
	70-74 ans	19	15	4	2	0	13	4
	50-74 ans	131	82	49	20	13	62	36
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	17	9	13	3	4	6
	55-59 ans	43	32	11	10	3	22	8
	60-64 ans	38	26	12	5	2	21	10
	65-69 ans	38	23	15	4	3	19	12
	70-74 ans	35	20	15	0	0	20	15
	50-74 ans	180	118	62	32	11	86	51
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
	65-69 ans	6	6	0	2	0	4	0
	70-74 ans	21	16	5	4	1	12	4
	50-74 ans	50	36	14	10	4	26	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	18	14	4	2	3	12	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	54	35	19	23	10	12	9
	55-59 ans	68	45	23	12	6	33	17
	60-64 ans	69	45	24	8	4	37	20
	65-69 ans	66	40	26	7	4	33	22
	70-74 ans	54	35	19	2	0	33	19
	50-74 ans	311	200	111	52	24	148	87
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26	17	9	13	3	4	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	43	32	11	10	3	22	8
	60-64 ans	38	26	12	5	2	21	10
	65-69 ans	38	23	15	4	3	19	12
	70-74 ans	35	20	15	0	0	20	15
	50-74 ans	180	118	62	32	11	86	51
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	15	6	11	2	4	4
	55-59 ans	35	30	5	9	1	21	4
	60-64 ans	28	22	6	4	2	18	4
	65-69 ans	29	16	13	3	3	13	10
	70-74 ans	24	12	12	0	0	12	12
	50-74 ans	137	95	42	27	8	68	34
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	15	6	11	2	4	4
	55-59 ans	37	30	7	9	1	21	6
	60-64 ans	32	24	8	5	2	19	6
	65-69 ans	35	21	14	4	3	17	11
	70-74 ans	32	19	13	0	0	19	13
	50-74 ans	157	109	48	29	8	80	40
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
	65-69 ans	6	6	0	2	0	4	0
	70-74 ans	21	16	5	4	1	12	4
	50-74 ans	50	36	14	10	4	26	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	8	3	1	1	7	2
	65-69 ans	6	6	0	2	0	4	0
	70-74 ans	20	16	4	4	1	12	3
	50-74 ans	48	36	12	10	4	26	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	13	10	3	2	1	8	2
	50-74 ans	34	24	10	6	4	18	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	50-74 ans	14	12	2	4	0	8	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	12	10	2	3	0	7	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
	50-74 ans	23	19	4	3	0	16	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	9	5	6	5	3	0
	55-59 ans	17	11	6	7	0	4	6
	60-64 ans	15	10	5	4	2	6	3
	65-69 ans	18	14	4	3	0	11	4
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	50-74 ans	71	47	24	21	8	26	16

* inclus une personne ayant réalisé un test de dépistage dont le resultat a été reporté inconnu

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,3	5,5	6,4	6,3	3,8	4,4
	55-59 ans	5,8	6,4	5,4	12,3	10,4	5	4,4
	60-64 ans	4,8	5,4	4,4	8,8	7,9	4,8	3,8
	65-69 ans	4,8	4,6	4,9	6,5	12	4,3	4
	70-74 ans	5,6	5,3	5,9	11,3	10,2	4,6	5,3
	50-74 ans	5,3	5,4	5,1	8	8	4,6	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,5	1,8	2	0,7	0,8
	55-59 ans	1,3	1,8	1	5,2	2,8	1,1	0,6
	60-64 ans	0,9	0,8	1	1,9	4,1	0,6	0,5
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	2,1	2,9	0,6	0,6
	70-74 ans	1,4	1,2	1,6	3,6	3,5	1	1,3
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,5	2,6	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,7	74,3	73,2	71,3	68,5	81,8	81,5
	55-59 ans	76,8	71,3	82,2	57,9	73,1	78,9	86,4
	60-64 ans	81,1	85,5	76,8	78	48	88	86,3
	65-69 ans	82,4	83	81,9	68	75,5	86,2	84,4
	70-74 ans	74,9	76,7	73,5	67,9	65,6	79,2	75,4
	50-74 ans	77,7	77,9	77,5	68,6	67,2	83,2	83,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	2,9	2,5	2,9	2,8	3	2,1
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	4,4	3,5	3,2	2,3
	60-64 ans	2,7	3,3	2,2	3,4	3	3,2	2,1
	65-69 ans	3,3	3,9	2,8	5,8	3,5	3,7	2,7
	70-74 ans	3,6	4,1	3,1	4,2	2	4,1	3,3
	50-74 ans	3	3,5	2,6	3,6	3	3,5	2,5
50-74 ans **	3	3,4	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	99	98	100	98,4	97,7	97,4
	55-59 ans	98,6	98,2	99	100	100	97,6	98,7
	60-64 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,8
	65-69 ans	96,8	96,6	96,9	95,5	85,7	96,9	98,8
	70-74 ans	95,1	96	94,1	90	100	96,7	93,7
	50-74 ans	97,8	98	97,5	98,6	97,6	97,8	97,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	90,3	90,9	88,5	90,3	92,9	91,9
	55-59 ans	90,7	88,9	92,8	69,2	100	95,1	90,7
	60-64 ans	92,7	90,8	94,9	78,9	88,9	93,1	96,3
	65-69 ans	86,6	82,6	91,5	76,2	83,3	84	92,7
	70-74 ans	90,9	93,8	87,5	88,9	83,3	94,3	87,8
	50-74 ans	90,3	89,1	91,7	81,6	90,8	91,6	92

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,6	95,7	95,6	96,3	96,4	94,9	94,1
	55-59 ans	94,1	93,8	94,4	88,9	95,5	94,9	94,1
	60-64 ans	94,1	92,7	95,7	86,7	100	93,6	94,9
	65-69 ans	88,4	86,3	90,7	81,3	90	87,3	90,8
	70-74 ans	89,4	88,9	90	100	80	87,8	90,8
	50-74 ans	92,4	91,5	93,5	91,9	95,4	91,4	92,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	124	137	111	123	105	157	120
	55-59 ans	116	118	113	176	81	105	124
	60-64 ans	103	106	100	87	143	109	91
	65-69 ans	105	107	103	154	81	97	106
	70-74 ans	105	105	106	144	99	101	107
	50-74 ans	111	114	107	132	103	109	108
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95 (65-133)	103 (64-145)	91 (69-123)	99.5 (60-139)	90.5 (63.5-120)	109 (74-245)	92 (77-128)
	55-59 ans	89.5 (64-121)	88.5 (65-119)	91 (63-128)	91 (86-188)	82 (52-97)	87 (64-113)	99.5 (70-131)
	60-64 ans	86 (65-108)	88 (68.5-107.5)	78 (59-110)	86 (70-98)	90.5 (49.5-166)	89 (67-108)	78 (62-108)
	65-69 ans	85 (64-112)	92 (61.5-116.5)	83 (66-108)	106 (86-161)	80 (71-89)	84 (59-114)	83 (66-112)
	70-74 ans	92 (69-114)	92 (69-112)	92 (73-115)	129 (77-169.5)	77 (69-119)	90 (69-109)	93 (73.5-114.5)
	50-74 ans	89 (66-118)	91 (65-118)	88 (66-117)	93 (64-139)	87 (59-115)	90 (66-114)	88 (66-118)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,8	8,7	5	9,8	7,9	7	0
	55-59 ans	8,2	10	6,1	26,9	0	4,8	7,9
	60-64 ans	6,8	8,3	5	21,1	11,1	5,9	3,7
	65-69 ans	8,3	11,8	4,1	13,6	0	11,3	4,8
	70-74 ans	3,8	3	4,7	10	16,7	2,2	3,8
	50-74 ans	6,9	8,5	5	15,2	6,5	6,3	4,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100	98,9	100	98,2	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,5	98,2	98,9	100	100	97,9	98,7
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,5	100	99,1	99,5	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,2	45,2	65,6	40,7	67,9	51,3	61,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	46,8	38,5	55,6	16,7	63,6	43,6	52,9
	60-64 ans	46,8	37,6	57,4	13,3	56,3	41,5	57,7
	65-69 ans	48,6	37,9	60,5	31,3	50	39,2	61,8
	70-74 ans	40	30	52,9	25	40	30,5	53,8
	50-74 ans	47,6	37,9	58,6	30,6	62,4	40,1	57,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	9,7	4,4	9,3	5,4	10,3	2,9
	55-59 ans	3,2	3,1	3,3	5,6	0	2,6	4,4
	60-64 ans	8,4	7,3	9,6	6,7	6,3	7,4	10,3
	65-69 ans	3,9	4,2	3,5	0	10	5,1	2,6
	70-74 ans	6,9	5,6	8,6	0	20	6,1	7,7
	50-74 ans	5,9	6	5,8	6,3	5,5	5,9	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	2,2	1,1	1,9	0	2,6	2,9
	55-59 ans	1,1	1	1,1	0	0	1,3	1,5
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,9	1,1	2,9	0	0	1,2	3,1
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	0,9	0	0,8	1,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,3	19,4	11,1	18,5	12,5	20,5	8,8
	55-59 ans	13,4	13,5	13,3	11,1	13,6	14,1	13,2
	60-64 ans	15,3	17,4	12,8	20	12,5	17	12,8
	65-69 ans	15,5	17,9	12,8	18,8	10	17,7	13,2
	70-74 ans	11,9	16,7	5,7	25	0	15,9	6,2
	50-74 ans	14,3	17	11,4	18	11,9	16,7	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,2	18,3	10	24,1	5,4	10,3	17,6
	55-59 ans	23,1	33,3	12,2	55,6	13,6	28,2	11,8
	60-64 ans	18,7	23,9	12,8	33,3	12,5	22,3	12,8
	65-69 ans	21	24,2	17,4	25	30	24,1	15,8
	70-74 ans	21,9	22,2	21,4	0	0	24,4	23,1
	50-74 ans	19,7	24,4	14,4	28,8	10,1	23,1	15,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	3,7	1,8	0	2,9
	55-59 ans	3,8	4,2	3,3	5,6	4,5	3,8	2,9
	60-64 ans	5,9	7,3	4,3	6,7	6,3	7,4	3,8
	65-69 ans	3,3	6,3	0	12,5	0	5,1	0
	70-74 ans	13,1	17,8	7,1	50	20	14,6	6,2
	50-74 ans	5,5	7,5	3,3	9	3,7	7	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,9	0	6,7	0	0	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0,9	0	0,3	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	0	1,8	2,6	0
	55-59 ans	3,2	4,2	2,2	0	4,5	5,1	1,5
	60-64 ans	1	1,8	0	0	0	2,1	0
	65-69 ans	2,8	5,3	0	12,5	0	3,8	0
	70-74 ans	1,9	2,2	1,4	0	20	2,4	0
	50-74 ans	2	2,9	0,9	1,8	2,8	3,2	0,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	1,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	1,8	1,1	0	0	2,1	1,3
	65-69 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,4	0,7	0	0,9	0,5	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,9	4,7	11	4,5	8,4	5
	55-59 ans	9,5	14	5,8	20,5	9,6	12,5	5,1
	60-64 ans	8,3	12,3	5,2	14,4	6,6	11,9	5
	65-69 ans	10,2	13,2	7,5	18,5	10,1	12,4	7,2
	70-74 ans	10,5	14,5	7	8,4	0	15,2	7,9
	50-74 ans	9	12,6	5,9	13,5	5,8	12,3	6
	50-74 ans **	9,1	12,5	5,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,8	2,2	6,2	1,3	2,8	3,3
	55-59 ans	6	9,9	2,8	17,1	4,8	8,3	2,4
	60-64 ans	4,6	7,1	2,6	9	3,3	6,7	2,5
	65-69 ans	5,9	7,6	4,3	10,6	7,6	7,2	3,9
	70-74 ans	6,8	8,3	5,5	0	0	9,2	6,2
	50-74 ans	5,2	7,4	3,3	8,3	2,6	7,2	3,5
	50-74 ans **	5,3	7,5	3,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,5	5,2	0,9	2,8	2,2
	55-59 ans	4,9	9,3	1,3	15,4	1,6	8	1,2
	60-64 ans	3,4	6	1,3	7,2	3,3	5,8	1
	65-69 ans	4,5	5,3	3,8	7,9	7,6	4,9	3,3
	70-74 ans	4,7	5	4,4	0	0	5,5	5
	50-74 ans	4	6	2,2	7	1,9	5,7	2,3
	50-74 ans **	4,1	6,1	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 79 - Deux-Sèvres

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,5	5,2	0,9	2,8	2,2
	55-59 ans	5,2	9,3	1,8	15,4	1,6	8	1,8
	60-64 ans	3,9	6,5	1,7	9	3,3	6,1	1,5
	65-69 ans	5,4	6,9	4,1	10,6	7,6	6,4	3,6
	70-74 ans	6,2	7,9	4,8	0	0	8,7	5,4
	50-74 ans	4,5	6,9	2,6	7,5	1,9	6,7	2,7
	50-74 ans **	4,6	6,9	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,5	1	0,4	0	0,6
	55-59 ans	1	1,2	0,8	1,7	1,6	1,1	0,6
	60-64 ans	1,5	2,2	0,9	1,8	1,7	2,2	0,8
	65-69 ans	0,9	2	0	5,3	0	1,5	0
	70-74 ans	4,1	6,6	1,8	16,8	3,3	5,5	1,7
	50-74 ans	1,4	2,3	0,7	2,6	1	2,2	0,7
	50-74 ans **	4,6	2,1	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009