

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3004	1370	1634	836	967	534	667
	55-59 ans	3837	1652	2185	475	521	1177	1664
	60-64 ans	4739	2090	2649	609	614	1481	2035
	65-69 ans	3970	1799	2171	473	444	1326	1727
	70-74 ans	3142	1366	1776	335	317	1031	1459
	50-74 ans	18692	8277	10415	2728	2863	5549	7552
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	171	78	93	55	53	23	40
	55-59 ans	234	96	138	31	41	65	97
	60-64 ans	274	125	149	45	45	80	104
	65-69 ans	269	106	163	37	38	69	125
	70-74 ans	250	100	150	24	34	76	116
	50-74 ans	1198	505	693	192	211	313	482
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	123	59	64	37	34	22	30
	55-59 ans	175	79	96	23	22	56	74
	60-64 ans	215	98	117	31	32	67	85
	65-69 ans	214	84	130	26	24	58	106
	70-74 ans	205	85	120	18	24	67	96
	50-74 ans	932	405	527	135	136	270	391
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	48	19	29	18	19	1	10
	55-59 ans	59	17	42	8	19	9	23
	60-64 ans	59	27	32	14	13	13	19
	65-69 ans	55	22	33	11	14	11	19
	70-74 ans	45	15	30	6	10	9	20
	50-74 ans	266	100	166	57	75	43	91
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2956	1351	1605	818	948	533	657
	55-59 ans	3778	1635	2143	467	502	1168	1641
	60-64 ans	4680	2063	2617	595	601	1468	2016
	65-69 ans	3915	1777	2138	462	430	1315	1708
	70-74 ans	3097	1351	1746	329	307	1022	1439

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	18426	8177	10249	2671	2788	5506	7461
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	66	32	34	19	24	13	10
	55-59 ans	91	50	41	14	7	36	34
	60-64 ans	117	58	59	14	14	44	45
	65-69 ans	137	66	71	19	17	47	54
	70-74 ans	106	55	51	19	11	36	40
	50-74 ans	517	261	256	85	73	176	183
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	66	32	34	19	24	13	10
	55-59 ans	90	50	40	14	7	36	33
	60-64 ans	115	58	57	14	14	44	43
	65-69 ans	137	66	71	19	17	47	54
	70-74 ans	104	53	51	19	11	34	40
	50-74 ans	512	259	253	85	73	174	180
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	56	26	30	16	22	10	8
	55-59 ans	71	40	31	13	7	27	24
	60-64 ans	99	46	53	12	14	34	39
	65-69 ans	117	57	60	16	15	41	45
	70-74 ans	85	44	41	16	8	28	33
	50-74 ans	428	213	215	73	66	140	149
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	53	24	29	14	21	10	8
	55-59 ans	70	39	31	12	7	27	24
	60-64 ans	97	45	52	12	14	33	38
	65-69 ans	113	57	56	16	14	41	42
	70-74 ans	80	42	38	15	7	27	31
	50-74 ans	413	207	206	69	63	138	143
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	56	26	30	16	22	10	8
	55-59 ans	71	40	31	13	7	27	24
	60-64 ans	99	46	53	12	14	34	39
	65-69 ans	116	57	59	16	15	41	44
	70-74 ans	85	44	41	16	8	28	33
	50-74 ans	427	213	214	73	66	140	148
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	56	26	30	16	22	10	8
		55-59 ans	71	40	31	13	7	27	24
		60-64 ans	99	46	53	12	14	34	39
		65-69 ans	117	57	60	16	15	41	45
		70-74 ans	85	44	41	16	8	28	33
		50-74 ans	428	213	215	73	66	140	149
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	56	26	30	16	22	10	8
		55-59 ans	71	40	31	13	7	27	24
		60-64 ans	99	46	53	12	14	34	39
		65-69 ans	117	57	60	16	15	41	45
		70-74 ans	87	46	41	16	8	30	33
		50-74 ans	430	215	215	73	66	142	149
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	38	13	25	9	19	4	6
		55-59 ans	38	17	21	5	5	12	16
		60-64 ans	58	23	35	6	9	17	26
		65-69 ans	68	29	39	9	11	20	28
		70-74 ans	42	18	24	3	4	15	20
		50-74 ans	244	100	144	32	48	68	96
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
		65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
		70-74 ans	6	1	5	0	3	1	2
		50-74 ans	23	11	12	1	5	10	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	12	5	7	2	1	3	6
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	13	6	7	0	1	6	6
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	46	23	23	3	2	20	21
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	7	1	5	1	2	0
	55-59 ans	13	12	1	3	0	9	1
	60-64 ans	13	6	7	1	2	5	5
	65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5
	70-74 ans	13	8	5	4	1	4	4
	50-74 ans	63	44	19	15	4	29	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	7	5	2	2	2	3	0
	65-69 ans	7	6	1	4	1	2	0
	70-74 ans	9	7	2	5	0	2	2
	50-74 ans	28	21	7	14	4	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	2	2	4	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	8	3	5	1	3	2
	55-59 ans	25	17	8	5	1	12	7
	60-64 ans	22	11	11	2	2	9	9
	65-69 ans	29	17	12	2	1	15	11
	70-74 ans	22	14	8	4	1	10	7
	50-74 ans	109	67	42	18	6	49	36
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	7	1	5	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	12	1	3	0	9	1
	60-64 ans	13	6	7	1	2	5	5
	65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5
	70-74 ans	13	8	5	4	1	4	4
	50-74 ans	63	44	19	15	4	29	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	7	1	5	1	2	0
	55-59 ans	12	11	1	3	0	8	1
	60-64 ans	10	6	4	1	1	5	3
	65-69 ans	15	10	5	2	0	8	5
	70-74 ans	12	8	4	4	0	4	4
	50-74 ans	57	42	15	15	2	27	13
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	7	1	5	1	2	0
	55-59 ans	12	11	1	3	0	8	1
	60-64 ans	12	6	6	1	1	5	5
	65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5
	70-74 ans	12	8	4	4	0	4	4
	50-74 ans	60	43	17	15	2	28	15
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	7	5	2	2	2	3	0
	65-69 ans	7	6	1	4	1	2	0
	70-74 ans	9	7	2	5	0	2	2
	50-74 ans	28	21	7	14	4	7	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	7	6	1	4	1	2	0
	70-74 ans	8	6	2	4	0	2	2
	50-74 ans	25	19	6	13	3	6	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	6	6	0	4	0	2	0
	70-74 ans	8	6	2	4	0	2	2
	50-74 ans	22	18	4	12	1	6	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	6	6	0	4	0	2	0
	70-74 ans	7	6	1	4	0	2	1
	50-74 ans	20	17	3	11	1	6	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	3	1	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	7	6	1	4	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	6	2	4	0	2	2
	50-74 ans	25	19	6	13	3	6	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	9	3	6	0	0	3	6
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	9	4	5	2	0	2	5
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	36	19	17	5	0	14	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,7	5,7	6,6	5,5	4,3	6
	55-59 ans	6,1	5,8	6,3	6,5	7,9	5,5	5,8
	60-64 ans	5,8	6	5,6	7,4	7,3	5,4	5,1
	65-69 ans	6,8	5,9	7,5	7,8	8,6	5,2	7,2
	70-74 ans	8	7,3	8,4	7,2	10,7	7,4	8
	50-74 ans	6,4	6,1	6,7	7	7,4	5,6	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	2,2	2	0,2	1,5
	55-59 ans	1,5	1	1,9	1,7	3,6	0,8	1,4
	60-64 ans	1,2	1,3	1,2	2,3	2,1	0,9	0,9
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	2,3	3,2	0,8	1,1
	70-74 ans	1,4	1,1	1,7	1,8	3,2	0,9	1,4
	50-74 ans	1,4	1,2	1,6	2,1	2,6	0,8	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,9	75,6	68,8	67,3	64,2	95,7	75
	55-59 ans	74,8	82,3	69,6	74,2	53,7	86,2	76,3
	60-64 ans	78,5	78,4	78,5	68,9	71,1	83,8	81,7
	65-69 ans	79,6	79,2	79,8	70,3	63,2	84,1	84,8
	70-74 ans	82	85	80	75	70,6	88,2	82,8
	50-74 ans	77,8	80,2	76	70,3	64,5	86,3	81,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2,1	2,3	2,5	2,4	1,5
	55-59 ans	2,4	3,1	1,9	3	1,4	3,1	2,1
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	2,4	2,3	3	2,2
	65-69 ans	3,5	3,7	3,3	4,1	4	3,6	3,2
	70-74 ans	3,4	4,1	2,9	5,8	3,6	3,5	2,8
	50-74 ans	2,8	3,2	2,5	3,2	2,6	3,2	2,5
50-74 ans**	2,7	3,1	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,9	100	97,6	100	100	100	97,1
	60-64 ans	98,3	100	96,6	100	100	100	95,6
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,1	96,4	100	100	100	94,4	100
	50-74 ans	99	99,2	98,8	100	100	98,9	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,8	81,3	88,2	84,2	91,7	76,9	80
	55-59 ans	78,9	80	77,5	92,9	100	75	72,7
	60-64 ans	86,1	79,3	93	85,7	100	77,3	90,7
	65-69 ans	85,4	86,4	84,5	84,2	88,2	87,2	83,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	81,7	83	80,4	84,2	72,7	82,4	82,5
	50-74 ans	83,6	82,2	85	85,9	90,4	80,5	82,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,6	92,3	96,7	87,5	95,5	100	100
	55-59 ans	98,6	97,5	100	92,3	100	100	100
	60-64 ans	98	97,8	98,1	100	100	97,1	97,4
	65-69 ans	96,6	100	93,3	100	93,3	100	93,3
	70-74 ans	94,1	95,5	92,7	93,8	87,5	96,4	93,9
	50-74 ans	96,5	97,2	95,8	94,5	95,5	98,6	96
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70	75	65	78	66	69	62
	55-59 ans	62	56	68	46	93	61	61
	60-64 ans	68	72	65	76	63	70	66
	65-69 ans	80	69	90	59	103	73	86
	70-74 ans	77	86	67	108	54	73	70
	50-74 ans	72	71	73	74	75	70	72
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	50.5 (32-81)	54.5 (29-126)	49 (34-78)	132.5)	49 (34-72)	57.5 (39-76)	56 (32.5-86)
	55-59 ans	45 (30-81)	46 (29-76)	42 (31-96)	43 (29-66)	48 (14-149)	60 (30-96)	41.5 (33-91)
	60-64 ans	55 (41-81)	53.5 (40-81)	56 (42-73)	53 (38.5-102.5)	56 (54-70)	53.5 (40-76)	55 (33-91)
	65-69 ans	57 (40-91)	56 (34-88)	64 (42-97)	53.5 (43.5-57)	43 (30-80)	57 (25-92)	67 (52-98)
	70-74 ans	55 (34-88)	47 (33.5-87)	58 (36-88)	51 (33.5-109.5)	58.5 (41.5-67)	47 (33-85)	57 (36-88)
	50-74 ans	55 (34-84.5)	54 (32-81)	56 (37-86)	49 (34-77)	54.5 (34-73)	54.5 (31-84.5)	57 (39-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,1	9,4	2,9	10,5	0	7,7	10
	55-59 ans	9,9	6	14,6	0	0	8,3	17,6
	60-64 ans	5,1	10,3	0	7,1	0	11,4	0
	65-69 ans	6,6	6,1	7	10,5	0	4,3	9,3
	70-74 ans	7,5	5,5	9,8	0	0	8,3	12,5
	50-74 ans	7	7,3	6,6	5,9	0	8	9,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	67,9	50	83,3	56,3	86,4	40	75
	55-59 ans	53,5	42,5	67,7	38,5	71,4	44,4	66,7
	60-64 ans	58,6	50	66	50	64,3	50	66,7
	65-69 ans	58,1	50,9	65	56,3	73,3	48,8	62,2
	70-74 ans	48,3	39,1	58,5	18,8	50	50	60,6
	50-74 ans	56,7	46,5	67	43,8	72,7	47,9	64,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	11,5	0	6,3	0	20	0
	55-59 ans	1,4	2,5	0	0	0	3,7	0
	60-64 ans	5,1	4,3	5,7	0	7,1	5,9	5,1
	65-69 ans	6,8	7	6,7	0	6,7	9,8	6,7
	70-74 ans	6,9	2,2	12,2	0	37,5	3,3	6,1
	50-74 ans	5,3	5,1	5,6	1,4	7,6	7	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	3,8	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,3	2,2	2,4	0	0	3,3	3
	50-74 ans	0,7	0,9	0,5	1,4	0	0,7	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,4	3,8	6,7	0	0	10	25
	55-59 ans	16,9	12,5	22,6	15,4	14,3	11,1	25
	60-64 ans	9,1	10,9	7,5	8,3	0	11,8	10,3
	65-69 ans	11,1	10,5	11,7	0	6,7	14,6	13,3
	70-74 ans	10,3	13	7,3	0	0	20	9,1
	50-74 ans	10,7	10,7	10,7	4,1	3	14,1	14,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	26,9	3,3	31,3	4,5	20	0
	55-59 ans	18,3	30	3,2	23,1	0	33,3	4,2
	60-64 ans	13,1	13	13,2	8,3	14,3	14,7	12,8
	65-69 ans	13,7	19,3	8,3	12,5	0	22	11,1
	70-74 ans	14,9	17,4	12,2	25	12,5	13,3	12,1
	50-74 ans	14,7	20,5	8,8	20,5	6,1	20,4	10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	7,5	6,5	23,1	14,3	0	4,2
	60-64 ans	7,1	10,9	3,8	16,7	14,3	8,8	0
	65-69 ans	6	10,5	1,7	25	6,7	4,9	0
	70-74 ans	10,3	15,2	4,9	31,3	0	6,7	6,1
	50-74 ans	6,5	9,8	3,3	19,2	6,1	4,9	2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	0	3,3	0	4,5	0	0
	55-59 ans	1,4	2,5	0	0	0	3,7	0
	60-64 ans	1	2,2	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	1,7	0	3,3	0	0	0	4,4
	70-74 ans	2,3	4,3	0	12,5	0	0	0
	50-74 ans	1,6	1,9	1,4	2,7	1,5	1,4	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,6	3,8	3,3	0	4,5	10	0
	55-59 ans	1,4	2,5	0	0	0	3,7	0
	60-64 ans	3	4,3	1,9	8,3	0	2,9	2,6
	65-69 ans	1,7	0	3,3	0	6,7	0	2,2
	70-74 ans	2,3	4,3	0	6,3	0	3,3	0
	50-74 ans	2,3	2,8	1,9	2,7	3	2,8	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,9	1,9	6,1	1,1	5,6	3
	55-59 ans	6,6	10,4	3,7	10,7	2	10,3	4,3
	60-64 ans	4,7	5,3	4,2	3,4	3,3	6,1	4,5
	65-69 ans	7,4	9,6	5,6	4,3	2,3	11,4	6,4
	70-74 ans	7,1	10,4	4,6	12,2	3,3	9,8	4,9
	50-74 ans	5,9	8,2	4,1	6,7	2,2	8,9	4,8
	50-74 ans **	5,8	8	3,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,2	0,6	6,1	1,1	3,8	0
	55-59 ans	3,4	7,3	0,5	6,4	0	7,7	0,6
	60-64 ans	2,8	2,9	2,7	1,7	3,3	3,4	2,5
	65-69 ans	4,1	6,2	2,3	4,3	0	6,8	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 58 - Nièvre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,2	5,9	2,9	12,2	3,3	3,9	2,8
	50-74 ans	3,4	5,4	1,9	5,6	1,4	5,3	2
	50-74 ans **	3,5	5,5	1,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,2	0,6	6,1	1,1	3,8	0
	55-59 ans	3,2	6,7	0,5	6,4	0	6,8	0,6
	60-64 ans	2,1	2,9	1,5	1,7	1,7	3,4	1,5
	65-69 ans	3,8	5,6	2,3	4,3	0	6,1	2,9
	70-74 ans	3,9	5,9	2,3	12,2	0	3,9	2,8
	50-74 ans	3,1	5,1	1,5	5,6	0,7	4,9	1,7
	50-74 ans **	3,2	5,2	1,3
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,2	0,6	6,1	1,1	3,8	0
	55-59 ans	3,2	6,7	0,5	6,4	0	6,8	0,6
	60-64 ans	2,6	2,9	2,3	1,7	1,7	3,4	2,5
	65-69 ans	4,1	6,2	2,3	4,3	0	6,8	2,9
	70-74 ans	3,9	5,9	2,3	12,2	0	3,9	2,8
	50-74 ans	3,3	5,3	1,7	5,6	0,7	5,1	2
	50-74 ans **	3,3	5,3	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,3	1,8	0,9	6,4	2	0	0,6
	60-64 ans	1,5	2,4	0,8	3,4	3,3	2	0
	65-69 ans	1,8	3,4	0,5	8,7	2,3	1,5	0
	70-74 ans	2,9	5,2	1,1	15,2	0	2	1,4
	50-74 ans	1,5	2,6	0,7	5,2	1,4	1,3	0,4
	50-74 ans **	3,3	2,2	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009