Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4217	1879	2338	1244	1504		834
	55-59 ans	4257	1797	2460	701	905	635 1096 1334 1533 1047 5645 48 66 63 90 73 340 32 47 45 74 56 254 16 19 18 16 17 86 619 1077 1316	1555
	60-64 ans	5226	2231	2995	897	1068		1927
	65-69 ans	4876	2279	2597	746	771		1826
	70-74 ans	2934	1384	1550	337	361	1047	1189
	50-74 ans	21510	9570	11940	3925	4609	5645	7331
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	297	156	141	108	91	48	50
	55-59 ans	267	132	135	66	61		74
	60-64 ans	326	142	184	79	75		109
	65-69 ans	329	146	183	56	68		115
	70-74 ans	237	107	130	34	38		92
	50-74 ans	1456	683	773	343	333		440
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un	30-74 alls	1430	003	113	343	333	340	440
test NA	50-54 ans	166	81	85	49	51	32	34
	55-59 ans	179	84	95	37	34	47	61
	60-64 ans	220	93	127	48	47	45	80
	65-69 ans	232	105	127	31	39	74	88
	70-74 ans	158	70	88	14	20	56	68
	50-74 ans	955	433	522	179	191	254	331
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	131	75	56	59	40	16	16
	55-59 ans	88	48	40	29	27	19	13
	60-64 ans	106	49	57	31	28	18	29
	65-69 ans	97	41	56	25	29	16	27
	70-74 ans	79	37	42	20	18	17	24
	50-74 ans	501	250	251	164	142	86	109
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4086	1804	2282	1185	1464	619	818
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans	4169	1749	2420	672	878	1077	1542
	60-64 ans	5120	2182	2938	866	1040	1316	1898
	65-69 ans	4779	2238	2541	721	742	1517	1799
	70-74 ans	2855	1347	1508	317	343	1030	1165

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	21009	9320	11689	3761	4467	5559	7222
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	102	60	42	44	31	16	11
	55-59 ans	101	39	62	18	32	21	30
	60-64 ans	153	79	74	33	36	46	38
	65-69 ans	132	76	56	30	17	46	39
	70-74 ans	85	43	42	11	16	32	26
	50-74 ans	573	297	276	136	132	161	144
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	102	60	42	44	31	16	11
	55-59 ans	100	39	61	18	31	21	30
	60-64 ans	153	79	74	33	36	46	38
	65-69 ans	130	75	55	30	17	45	38
	70-74 ans	85	43	42	11	16	32	26
	50-74 ans	570	296	274	136	131	160	143
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	94	55	39	39	29	16	10
	55-59 ans	91	35	56	16	27	19	29
	60-64 ans	142	74	68	33	34	41	34
	65-69 ans	119	67	52	26	17	41	35
	70-74 ans	77	39	38	11	12	28	26
	50-74 ans	523	270	253	125	119	145	134
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	91	53	38	39	28	14	10
, and the second	55-59 ans	85	33	52	15	25	18	27
	60-64 ans	135	69	66	29	34	40	32
	65-69 ans	108	61	47	24	15	37	32
	70-74 ans	66	33	33	10	10	23	23
	50-74 ans	485	249	236	117	112	132	124
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	Hommes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 41 40 28 144 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	93	55	38	39	28	16	10
u autres examens)	55-59 ans	91	35	56	16	27		29
	60-64 ans 65-69 ans	141 118	74	67	33	34 17		33
			66	52	26			35
	70-74 ans	76	39	37	11	11		26
	50-74 ans	519	269	250	125	117	144	133
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50.54							4.0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93	54	39	39	29	15	10
	55-59 ans	89	34	55	16	26	18	29
	60-64 ans	138	71	67	32	34	39	33
	65-69 ans	118	67	51	26	16	41	35
	70-74 ans	75	38	37	10	11	28	26
	50-74 ans	513	264	249	123	116	141	133
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	94	55	39	39	29	16	10
	55-59 ans	92	35	57	16	28	19	29
	60-64 ans	142	74	68	33	34	41	34
	65-69 ans	121	68	53	26	17	42	36
	70-74 ans	77	39	38	11	12	28	26
	50-74 ans	526	271	255	125	120	146	135
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51	26	25	19	18	7	7
	55-59 ans	47	14	33	6	17	8	16
	60-64 ans	60	23	37	11	15	12	22
	65-69 ans	54	23	31	13	11	10	20
	70-74 ans	32	12	20	2	8	10	12
	50-74 ans	244	98	146	51	69	47	77
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	0 50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	7	2	5	2	2	0	3
	60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	36	20	16	9	9	11	7

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
superieure ou egaie à 10 mm	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	10	4	7	1	3	3
,.,	55-59 ans	7	4	3	4	1	0	2
	60-64 ans	17	9	8	3	5	6	3
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	11	6	5	3	1	3	4
	50-74 ans	63	39	24	19	9	20	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	9	0	7	0	2	0
	55-59 ans	15	8	7	1	4	7	3
	60-64 ans	34	21	13	9	10	12	3
	65-69 ans	27	18	9	6	2	12	7
	70-74 ans	12	8	4	3	0	5	4
	50-74 ans	97	64	33	26	16	38	17
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
	50-74 ans	31	18	13	7	6	11	7

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	8	4	4	1	4	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou			_					
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	11	7	4	2	3	5	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	19	4	14	1	5	3
	55-59 ans	22	12	10	5	5	7	5
	60-64 ans	51	30	21	12	15	18	6
	65-69 ans	41	28	13	8	3	20	10
	70-74 ans	24	15	9	6	1	9	8
	50-74 ans	161	104	57	45	25	59	32
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	9	9	0	7	0	2	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	8	7	1	4	7	3
	60-64 ans	34	21	13	9	10	12	3
	65-69 ans	27	18	9	6	2	12	7
	70-74 ans	12	8	4	3	0	5	4
	50-74 ans	97	64	33	26	16	38	17
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	7	0	5	0	2	0
	55-59 ans	12	6	6	1	4	5	2
	60-64 ans	30	19	11	7	9	12	2
	65-69 ans	24	15	9	3	2	12	7
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	84	54	30	19	15	35	15
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans	7 12 34	7 6 20	0 6	5 1 8	0 4 11	2 5 12	0 2 3
	65-69 ans	25	16	9	4	2	12	7
	70-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
	50-74 ans	89	, 56	33	21	17	35	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
7420 Nombre de personnes dyant un editori detecte	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	10	6	4	2	2	4	2
	70-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
	50-74 ans	31	18	13	7	6	11	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	10	6	4	2	2	Hommes 3 4 3 11 0 1 1 3 1 6 0 0 2 1 2 5 0 0 0 1 0 2 3 0 0	2
	70-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
	50-74 ans	31	18	13	7	6	11	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	19	10	9	4	3	6	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	12	8	4	3	3	5	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
connu	50-54 ans 55-59 ans		-					
		0	0	0	0	0		0
	60-64 ans	2	2	0	1	0		0
	65-69 ans	2	1	1	1	1		0
	70-74 ans	4	3	1	1	0		1
	50-74 ans	8	6	2	3	1		1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	-	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0		0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	2	2	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
The Tremer's de percentace processiant and cancer de clade (Trim)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
A30° Nombre de personnes presentant dir cancer de stade (TNW) 4	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
700- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pri est connu	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	9	5	4	2	2	3	2
	03-08 alls	J	J	7	_	_	J	

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	24	15	9	6	5	9	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	6	6	3	2	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépis	age initial	Dépistages subséquents	
•	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	8,3	6	8,7	6,1	7,6	6
F-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	55-59 ans	6.3	7,3	5,5	9,4	6.7	6	4,8
	60-64 ans	6,2	6,4	6,1	8,8	7	4,7	5,7
	65-69 ans	6,7	6,4	7	7,5	8,8	5,9	6,3
	70-74 ans	8,1	7,7	8,4	10,1	10,5	7	7,7
	50-74 ans	6,8	7,1	6,5	8,7	7,2	6	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysabl	е	•	,					
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	4	2,4	4,7	2,7	2,5	1,9
our la portodo ovalado) (70)	55-59 ans	2,1	2,7	1,6	4,1	3	1,7	0,8
	60-64 ans	2	2,2	1,9	3,5	2,6	1,3	1,5
	65-69 ans	2	1,8	2,2	3,4	3,8	1	1,5
	70-74 ans	2,7	2,7	2,7	5,9	5	1,6	2
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	4,2	3,1	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite		_,0	_,0	_,.	-,-	0,1	1,0	1,0
un test NA	50-54 ans	55.9	51,9	60.3	45,4	56	66,7	68
un test IVA	55-59 ans	67	63,6	70,4	,	55,7	71,2	82,4
	60-64 ans	67,5	65,5	69	56,1 60,8	62,7	71,4	73,4
	65-69 ans	70,5	71,9	69.4	55,4	57,4	82,2	76,5
	70-74 ans	66,7	65,4	67,7	41,2	52,6	76,7	73,9
	50-74 ans	65,6	63,4	67,7 67,5	52,2	5 7,4	76,7 74,7	75,9 75,2
	30-74 alls	05,0	03,4	67,5	32,2	37,4	14,1	13,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,3	1,8	3,7	2,1	2,6	1,3
	55-59 ans	2,4	2,2	2,6	2,7	3,6	1,9	1,9
	60-64 ans	3	3,6	2,5	3,8	3,5	3,5	2
	65-69 ans	2,8	3,4	2,2	4,2	2,3	3	2,2
	70-74 ans	3	3,2	2,8	3,5	4,7	3,1	2,2
	50-74 ans	2,7	3,2	2,4	3,6	3	2,9	2
	50-74 ans **	2,7	3,1	2,4			•	•
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
•	55-59 ans	99	100	98,4	100	96.9	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,5	98,7	98,2	100	100	97,8	97,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,7	99,3	100	99,2	99,4	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi		i i	· ·	,			· ·	
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	91,7	92,9	88,6	93,5	100	90,9
ios portocimos originatos a la obrodopioj	55-59 ans	91	89,7	91,8	88,9	87,1	90,5	96,7
	60-64 ans	92,8	93,7	91,9	100	94,4	89,1	89,5
	65-69 ans	91,5	89.3	94,5	86,7	100	91,1	92,1
	03-03 alls	31,3	03,3	Ð - 1,∪	00,1	100	31,1	3Z, I

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	90,6	90,7	90,5	100	75	87,5	100
	50-74 ans	91,8	91,2	92,3	91,9	90,8	90,6	93,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	96,4	97,4	100	96,6	87.5	100
20. Touroumago do porosimos ajam ou ano osiscoopio complete	55-59 ans	93,4	94,3	92,9	93.8	92,6	94,7	93,1
	60-64 ans	95,1	93,2	97,1	87,9	100	97,6	94,1
	65-69 ans	90,8	91	90,4	92,3	88,2	90,2	91,4
	70-74 ans	85,7	84,6	86,8	90,9	83,3	82,1	88,5
	50-74 ans	92,7	92,2	93,3	93,6	94,1	91	92,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
203- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73	70	78	63	88	86	49
	55-59 ans	86	92	82	92	89	92	76
	60-64 ans	74	86	62	84	64	87	59
	65-69 ans	76	78	74	97	64	67	78
	70-74 ans	70	55	86	44	101	59	79
	50-74 ans	76	77	75	78	79	76	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53.5 (41-77)	52 (39-88)	57 (44-76)	53 (38-87)	62 (47-77)	51 (42-96.5)	43 (36-62)
	55-59 ans	64.5 (40-98)	75 (45-94)	59 (37-115)	52.5 (30.5-84.5)		86 (56-105)	55 (37-98)
	60-64 ans	51 (35-81)	52 (35-82)	50.5 (36-76.5)	56 (34-100)	49 (38-84)	50 (37-77)	55 (35-76)
	65-69 ans	58 (42-87)	58 (35-84)	57.5 (45-91)	76 (49-104)	63 (44-80)	51 (31-72)	56 (46-101)
	70-74 ans	50 (35-79)	48 (35-65)	55.5 (36-88)	37 (29-50)	51 (43-149.5)	52 (36-71)	56.5 (34-82)
	50-74 ans	55 (38-85)	55 (38-84)	56.5 (38-86)	55.5 (36-88)	58.5 (42-86)	54 (38-82)	55.5 (37-86)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,9	3,3	2,4	4,5	3,2	0	0
	55-59 ans	1	2,6	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	2,6	1,3	4,1	0	2,8	2,2	5,3
	65-69 ans	2,3	1,3	3,6	0	0	2,2	5,1
	70-74 ans	1,2	2,3	0	0	0	3,1	0
	50-74 ans	2,1	2	2,2	2,2	1,5	1,9	2,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	98,2	100	100	100	93,8	100
· · ·	55-59 ans	97,8	97,1	98,2	100	96,3	94,7	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	97,2	95,9	98,5	97	100	95,1	97,1
	65-69 ans	99,2	100	98,1	100	94,1	100	100
	70-74 ans	97,4	97,4	97,4	90,9	91,7	100	100
	50-74 ans	98,1	97,8	98,4	98,4	97,5	97,2	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est normal	50-54 ans	54,3	47,3	64,1	48,7	62,1	43,8	70
	55-59 ans	51.1	40	57.9	37,5	60.7	42,1	55,2
	60-64 ans	42,3	31,1	54,4	33,3	44,1	29,3	64,7
	65-69 ans	44.6	33.8	58,5	50	64.7	23,8	55,6
	70-74 ans	41,6	30,8	52,6	18,2	66,7	35,7	46,2
	50-74 ans	46,4	36,2	57,3	40,8	57,5	32,2	57
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)		-,	,	,-	- ,-	,,	,	
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	5,5	10,3	5,1	13,8	6,3	0
	55-59 ans	7,6	5,7	8,8	12,5	7,1	0	10,3
	60-64 ans	6.3	6,8	5,9	6,1	5,9	7,3	5,9
	65-69 ans	5,8	8,8	1,9	7,7	0	9,5	2,8
	70-74 ans	7,8	10,3	5,3	9,1	8,3	10,7	3,8
	50-74 ans	6,8	7,4	6,3	7,2	7,5	7,5	5,2
204 Pourcentage de nergennes quant qui un exemen disappetie (celegennie qui autre)	30-74 ans	0,0	7,7	0,0	1,2	7,5	1,5	J,L
2004- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50.54	4.4	4.0	0		0	0.0	0
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	1,8	0	0	0	6,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,5	0	2,9	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	5,1	0	0	0	7,1	0
	50-74 ans	0,8	1,1	0,4	0	0,8	2,1	0
205- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,9	18,2	10,3	17,9	3,4	18,8	30
	55-59 ans	7,6	11,4	5,3	25	3,6	0	6,9
	60-64 ans	12	12,2	11,8	9,1	14,7	14,6	8,8
	65-69 ans	11,6	14,7	7,5	7,7	5,9	19	8,3
	70-74 ans	14,3	15,4	13,2	27,3	8,3	10,7	15,4
	50-74 ans	12	14,4	9,4	15,2	7,5	13,7	11,1
006- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)					·		·	·
nyant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9.6	16,4	0	17,9	0	12,5	0
ayant detecte ad monts un adenome avance	55-59 ans	16,3	22,9	12,3	6,3	14,3	36,8	10,3
	60-64 ans	23,9	28,4	19,1	27,3	29,4	29,3	8,8
	65-69 ans	22,3	26,5	17	23,1	11.8	28,6	19,4
	70-74 ans	15,6	20,5	10,5	27,3	0	17,9	15,4
	50-74 ans	18,4	23,6	12,9	20.8	13,3	26	12,6
DOZ. Dourcentore de nercennes quest qu'un exemen diagnestic (lei	30-14 all5	10,4	23,0	12,3	20,0	13,3	20	12,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50 54	0.4	0	E 4	0	0.0		0
ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	0	5,1	0	6,9	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 11 - Aude

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,4	8,6	3,5	12,5	3,6	5,3	3,4
	60-64 ans	3,5	6,8	0	6,1	0	7,3	0
	65-69 ans	8,3	8,8	7,5	7,7	11,8	9,5	5,6
	70-74 ans	11,7	10,3	13,2	9,1	8,3	10,7	15,4
	50-74 ans	5,9	6,6	5,1	5,6	5	7,5	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)		2.4	4.0	2.6	2.6	2.4	0	0
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	1,8	2,6	2,6	3,4	0	0
	55-59 ans	2,2	2,9	1,8	0	0	5,3	3,4
	60-64 ans	1,4	1,4	1,5	3	0	0	2,9
	65-69 ans	1,7	1,5	1,9	0	0	2,4	2,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	1,5	1,6	1,6	0,8	1,4	2,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0.4	2.6	0	0.0	0	0.0	0
		2,1	3,6	0	2,6	0	6,3	0
	55-59 ans	4,3	2,9	5,3	0	3,6	5,3	6,9
	60-64 ans	2,1	2,7	1,5	6,1	0	0	2,9
	65-69 ans	1,7	2,9	0	3,8	0	2,4	0
	70-74 ans	1,3	2,6	0	0	0	3,6	0
	50-74 ans	2,3	3	1,6	3,2	0,8	2,7	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,8	0	0	0	6,3	0
	55-59 ans	2,2	2,9	1,8	0	3,6	5,3	0
	60-64 ans	3,5	5,4	1,5	3	0	7,3	2,9
	65-69 ans	0,8	0	1,9	0	5,9	0	0
	70-74 ans	2,6	2,6	2,6	9,1	8,3	0	0
	50-74 ans	2,1	2,6	1,6	1,6	2,5	3,4	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	10,5	1,8	11,8	0,7	8,1	3,7
	55-59 ans	5,3	6,9	4,1	7,4	5,7	6,5	3,2
	60-64 ans	10	13,7	7,1	13,9	14,4	13,7	3,2
	65-69 ans	8,6	12,5	5,1	11,1	4	13,2	5,6
	70-74 ans	8,4	11,1	6	18,9	2,9	8,7	6,9
	50-74 ans	7,7	11,2	4,9	12	5,6	10,6	4,4
	50-74 ans **	7.5	10.7	4.6				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000			-,	,-				
personnes dépistées	50-54 ans	2,2	5	0	5,9	0	3,2	0
	55-59 ans	3,6	4,6	2,9	1,5	4,6	6,5	1,9
	60-64 ans	6,6	9,6	4,4	10,4	9,6	9,1	1,6
	65-69 ans	5,6	8	3,5	8.3	2,7	7,9	3,9

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,2	5,9	2,7	9,5	0	4,9	3,4
	50-74 ans	4,6	6,9	2,8	6,9	3,6	6,8	2,4
	50-74 ans **	4,4	6,5	2,6				-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1.7	3.9	0	4,2	0	3,2	0
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	1,5	4,6	4,6	1,3
	60-64 ans	5,9	8,7	3,7	8,1	8,7	9.1	1,1
	65-69 ans	5	6,7	3,5	4,2	2,7	7,9	3,9
	70-74 ans	3,9	5,2	2,7	9,5	0	3,9	3,4
	50-74 ans	4	5,8	2,6	5,1	3,4	6.3	2,1
	50-74 ans **	3.8	5,4	2,3				
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3,9	0	4,2	0	3,2	0
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	1,5	4,6	4,6	1,3
	60-64 ans	6,6	9,2	4,8	9,2	10,6	9,1	1,6
	65-69 ans	5,2	7,1	3,5	5,5	2,7	7,9	3,9
	70-74 ans	3,9	5,2	2,7	9,5	0	3,9	3,4
	50-74 ans	4,2	6	2,8	5,6	3,8	6,3	2,2
	50-74 ans **	4	5,6	2,5				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0,9	0	1,4	0	0
	55-59 ans	1,2	1,7	0,8	3	1,1	0,9	0,6
	60-64 ans	1	2,3	0	2,3	0	2,3	0
	65-69 ans	2,1	2,7	1,6	2,8	2,7	2,6	1,1
	70-74 ans	3,2	3	3,3	3,2	2,9	2,9	3,4
	50-74 ans	1,5	1,9	1,1	1,9	1,3	2	1
	50-74 ans **	4	1,7	1,2				