

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1042	459	583	283	327	176	256
	55-59 ans	917	407	510	121	121	286	389
	60-64 ans	1068	518	550	130	102	388	448
	65-69 ans	854	379	475	87	92	292	383
	70-74 ans	617	280	337	55	70	225	267
	<b>50-74 ans</b>	<b>4498</b>	<b>2043</b>	<b>2455</b>	<b>676</b>	<b>712</b>	<b>1367</b>	<b>1743</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	56	27	29	15	24	12	5
	55-59 ans	50	23	27	12	13	11	14
	60-64 ans	47	20	27	7	5	13	22
	65-69 ans	51	24	27	6	11	18	16
	70-74 ans	42	22	20	9	10	13	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>246</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	37	18	19	7	16	11	3
	55-59 ans	31	15	16	5	7	10	9
	60-64 ans	29	12	17	3	1	9	16
	65-69 ans	37	18	19	3	6	15	13
	70-74 ans	28	15	13	7	4	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>50</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	19	9	10	8	8	1	2
	55-59 ans	19	8	11	7	6	1	5
	60-64 ans	18	8	10	4	4	4	6
	65-69 ans	14	6	8	3	5	3	3
	70-74 ans	14	7	7	2	6	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1023	450	573	275	319	175	254
	55-59 ans	898	399	499	114	115	285	384
	60-64 ans	1050	510	540	126	98	384	442
	65-69 ans	840	373	467	84	87	289	380
	70-74 ans	603	273	330	53	64	220	266

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>4414</b>	<b>2005</b>	<b>2409</b>	<b>652</b>	<b>683</b>	<b>1353</b>	<b>1726</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	28	10	18	7	13	3	5
	55-59 ans	17	13	4	1	1	12	3
	60-64 ans	28	14	14	3	6	11	8
	65-69 ans	17	7	10	3	2	4	8
	70-74 ans	18	11	7	1	3	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>28</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	28	10	18	7	13	3	5
	55-59 ans	17	13	4	1	1	12	3
	60-64 ans	28	14	14	3	6	11	8
	65-69 ans	17	7	10	3	2	4	8
	70-74 ans	18	11	7	1	3	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>28</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	13	7	6	5	4	2	2
	55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
	60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
	65-69 ans	13	4	9	1	1	3	8
	70-74 ans	12	6	6	0	2	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
	55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
	60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
	65-69 ans	12	4	8	1	1	3	7
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	12	6	6	5	4	1	2
	55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
	60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
	65-69 ans	13	4	9	1	1	3	8
	70-74 ans	11	5	6	0	2	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
		55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
		60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
		65-69 ans	12	4	8	1	1	3	7
		70-74 ans	11	5	6	0	2	5	4
		<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	13	7	6	5	4	2	2
		55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
		60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
		65-69 ans	13	4	9	1	1	3	8
		70-74 ans	12	6	6	0	2	6	4
		<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
		55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
		60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
		65-69 ans	7	3	4	1	1	2	3
		70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	2	7	1	4	1	3
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,9	5	5,3	7,3	6,8	2
	55-59 ans	5,5	5,7	5,3	9,9	10,7	3,8	3,6
	60-64 ans	4,4	3,9	4,9	5,4	4,9	3,4	4,9
	65-69 ans	6	6,3	5,7	6,9	12	6,2	4,2
	70-74 ans	6,8	7,9	5,9	16,4	14,3	5,8	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2	1,7	2,8	2,4	0,6	0,8
	55-59 ans	2,1	2	2,2	5,8	5	0,3	1,3
	60-64 ans	1,7	1,5	1,8	3,1	3,9	1	1,3
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	3,4	5,4	1	0,8
	70-74 ans	2,3	2,5	2,1	3,6	8,6	2,2	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,1	66,7	65,5	46,7	66,7	91,7	60
	55-59 ans	62	65,2	59,3	41,7	53,8	90,9	64,3
	60-64 ans	61,7	60	63	42,9	20	69,2	72,7
	65-69 ans	72,5	75	70,4	50	54,5	83,3	81,3
	70-74 ans	66,7	68,2	65	77,8	40	61,5	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>65,9</b>	<b>67,2</b>	<b>64,6</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>79,1</b>	<b>74,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	2,2	3,1	2,5	4,1	1,7	2
	55-59 ans	1,9	3,3	0,8	0,9	0,9	4,2	0,8
	60-64 ans	2,7	2,7	2,6	2,4	6,1	2,9	1,8
	65-69 ans	2	1,9	2,1	3,6	2,3	1,4	2,1
	70-74 ans	3	4	2,1	1,9	4,7	4,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	46,4	70	33,3	71,4	30,8	66,7	40
	55-59 ans	64,7	69,2	50	0	0	75	66,7
	60-64 ans	42,9	50	35,7	66,7	33,3	45,5	37,5
	65-69 ans	76,5	57,1	90	33,3	50	75	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	66,7	54,5	85,7	0	66,7	60	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>56,5</b>	<b>60</b>	<b>52,8</b>	<b>53,3</b>	<b>36</b>	<b>62,5</b>	<b>67,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,6	71,4	100	80	100	50	100
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	92,3	100	88,9	100	100	100	87,5
	70-74 ans	75	66,7	83,3	0	50	66,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,2</b>	<b>87,9</b>	<b>92,9</b>	<b>87,5</b>	<b>88,9</b>	<b>88</b>	<b>94,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	2
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0.5 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-2)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	70-74 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49	53	45	48	41	65	53
	55-59 ans	58	60	49	.	.	60	49
	60-64 ans	91	101	77	177	53	71	94
	65-69 ans	55	40	62	12	147	49	51
	70-74 ans	58	70	45	.	18	70	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>58</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	44 (33-57)	47 (40-57)	38 (28-61)	47 (43-53)	30 (21.5-60.5)	64.5 (33-96)	52.5 (44-61)
	55-59 ans	41 (32-81)	41 (32-81)	49 (34-64)			41 (32-81)	49 (34-64)
	60-64 ans	56.5 (36-123)	39 (34-190)	70 (43-73)	177 (39-315)	52.5 (32-73)	38 (34-77)	70 (43-169)
	65-69 ans	42 (24-69)	25.5 (18-62)	63 (26-69)	12 (12-12)	147 (147-147)	27 (24-97)	52.5 (24.5-66.5)
	70-74 ans	66 (28-78)	76.5 (66-85)	56 (18-58)		18 (18-18)	76.5 (66-85)	57 (35.5-67)
	<b>50-74 ans</b>	<b>50 (32-76.5)</b>	<b>47 (33-81)</b>	<b>56 (28-70)</b>	<b>45 (39.5-55)</b>	<b>32 (23-81)</b>	<b>66 (32-85)</b>	<b>58 (34-69)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	32,1	20	38,9	14,3	30,8	33,3	60
	55-59 ans	29,4	23,1	50	100	100	16,7	33,3
	60-64 ans	42,9	42,9	42,9	33,3	33,3	45,5	50
	65-69 ans	17,6	28,6	10	66,7	50	0	0
	70-74 ans	22,2	27,3	14,3	100	33,3	20	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,6</b>	<b>29,1</b>	<b>32,1</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>28,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	92,3	85,7	100	80	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	92,3	100	88,9	100	100	100	87,5
	70-74 ans	91,7	83,3	100	0	100	83,3	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,1</b>	<b>93,9</b>	<b>96,4</b>	<b>87,5</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>94,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	84,6	71,4	100	80	100	50	100
	55-59 ans	81,8	77,8	100	0	0	77,8	100
	60-64 ans	66,7	57,1	80	50	100	60	66,7
	65-69 ans	53,8	75	44,4	100	100	66,7	37,5
	70-74 ans	33,3	0	66,7	0	50	0	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>63,9</b>	<b>57,6</b>	<b>71,4</b>	<b>75</b>	<b>88,9</b>	<b>52</b>	<b>63,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	14,3	0	0	0	50	0
	55-59 ans	9,1	11,1	0	0	0	11,1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7,7	0	11,1	0	0	0	12,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>6,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	15,4	25	11,1	0	0	33,3	12,5
	70-74 ans	33,3	50	16,7	0	0	50	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>10,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,1	11,1	0	0	0	11,1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7,7	0	11,1	0	0	0	12,5
	70-74 ans	16,7	16,7	16,7	0	50	16,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>8</b>	<b>5,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	25	28,6	20	50	0	20	33,3
	65-69 ans	7,7	0	11,1	0	0	0	12,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7,7	14,3	0	20	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7,7	0	11,1	0	0	0	12,5
	70-74 ans	16,7	33,3	0	0	0	33,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>9,1</b>	<b>3,6</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	0	0	3,5	2,6
	70-74 ans	6,6	11	3	0	0	13,6	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	0	0	3,5	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 48 - Lozère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6,6	11	3	0	0	13,6	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	2,7	0	0	0	3,5	0
	70-74 ans	6,6	11	3	0	0	13,6	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	2,7	0	0	0	3,5	0
	70-74 ans	6,6	11	3	0	0	13,6	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2,5	0	0	0	3,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	0	2,1	0	0	0	2,6
	70-74 ans	3,3	3,7	3	0	15,6	4,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009