

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17755	8542	9213	6116	6505	2426	2708
	55-59 ans	13923	6114	7809	2293	2909	3821	4900
	60-64 ans	15604	6611	8993	2186	2920	4425	6073
	65-69 ans	13409	5741	7668	1734	2216	4007	5452
	70-74 ans	10358	4382	5976	1131	1533	3251	4443
	50-74 ans	71049	31390	39659	13460	16083	17930	23576
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1636	785	851	593	638	192	213
	55-59 ans	1332	597	735	288	339	309	396
	60-64 ans	1436	621	815	273	329	348	486
	65-69 ans	1180	532	648	218	255	314	393
	70-74 ans	953	443	510	159	177	284	333
	50-74 ans	6537	2978	3559	1531	1738	1447	1821
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	970	463	507	325	352	138	155
	55-59 ans	812	363	449	148	180	215	269
	60-64 ans	941	399	542	140	180	259	362
	65-69 ans	808	372	436	128	141	244	295
	70-74 ans	614	289	325	81	89	208	236
	50-74 ans	4145	1886	2259	822	942	1064	1317
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	666	322	344	268	286	54	58
	55-59 ans	520	234	286	140	159	94	127
	60-64 ans	495	222	273	133	149	89	124
	65-69 ans	372	160	212	90	114	70	98
	70-74 ans	339	154	185	78	88	76	97
	50-74 ans	2392	1092	1300	709	796	383	504
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17089	8220	8869	5848	6219	2372	2650
	55-59 ans	13403	5880	7523	2153	2750	3727	4773
	60-64 ans	15109	6389	8720	2053	2771	4336	5949
	65-69 ans	13037	5581	7456	1644	2102	3937	5354
	70-74 ans	10019	4228	5791	1053	1445	3175	4346
	50-74 ans	68657	30298	38359	12751	15287	17547	23072
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	219	124	95	94	74	30	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	178	99	79	42	34	57	45
	60-64 ans	220	111	109	47	31	64	78
	65-69 ans	212	117	95	43	34	74	61
	70-74 ans	177	72	105	24	39	48	66
	50-74 ans	1006	523	483	250	212	273	271
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	217	122	95	92	74	30	21
	55-59 ans	176	97	79	40	34	57	45
	60-64 ans	218	110	108	47	30	63	78
	65-69 ans	209	114	95	43	34	71	61
	70-74 ans	177	72	105	24	39	48	66
	50-74 ans	997	515	482	246	211	269	271
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	135	68	67	47	51	21	16
	55-59 ans	123	66	57	21	24	45	33
	60-64 ans	160	80	80	31	22	49	58
	65-69 ans	145	73	72	21	19	52	53
	70-74 ans	131	51	80	15	29	36	51
	50-74 ans	694	338	356	135	145	203	211
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	120	60	60	41	45	19	15
	55-59 ans	106	56	50	18	20	38	30
	60-64 ans	137	66	71	26	21	40	50
	65-69 ans	126	66	60	20	17	46	43
	70-74 ans	104	40	64	9	22	31	42
	50-74 ans	593	288	305	114	125	174	180
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	134	68	66	47	50	21	16
	55-59 ans	123	66	57	21	24	45	33
	60-64 ans	158	78	80	31	22	47	58
	65-69 ans	143	73	70	21	19	52	51
	70-74 ans	131	51	80	15	29	36	51
	50-74 ans	689	336	353	135	144	201	209
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	135	68	67	47	51	21	16
	55-59 ans	123	66	57	21	24	45	33
	60-64 ans	159	80	79	31	22	49	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	144	73	71	21	18	52	53
	70-74 ans	131	51	80	15	29	36	51
	50-74 ans	692	338	354	135	144	203	210
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	135	68	67	47	51	21	16
	55-59 ans	123	66	57	21	24	45	33
	60-64 ans	161	80	81	31	22	49	59
	65-69 ans	145	73	72	21	19	52	53
	70-74 ans	131	51	80	15	29	36	51
	50-74 ans	695	338	357	135	145	203	212
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	77	33	44	26	34	7	10
	55-59 ans	52	21	31	4	10	17	21
	60-64 ans	86	33	53	14	15	19	38
	65-69 ans	63	21	42	5	10	16	32
	70-74 ans	63	19	44	6	13	13	31
	50-74 ans	341	127	214	55	82	72	132
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	6	2	4	0	2	2	2
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	30	15	15	6	6	9	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	8	1	5	1	3	0
	55-59 ans	18	10	8	3	3	7	5
	60-64 ans	22	13	9	3	2	10	7
	65-69 ans	23	17	6	7	2	10	4
	70-74 ans	22	10	12	3	3	7	9
	50-74 ans	94	58	36	21	11	37	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	13	10	7	8	6	2
	55-59 ans	27	21	6	8	3	13	3
	60-64 ans	26	18	8	6	4	12	4
	65-69 ans	18	11	7	3	2	8	5
	70-74 ans	21	11	10	3	4	8	6
	50-74 ans	115	74	41	27	21	47	20
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	4	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	15	10	5	3	0	7	5
	70-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
	50-74 ans	38	23	15	6	8	17	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	10	6	4	3	1	3	3
	70-74 ans	7	4	3	2	2	2	1
	50-74 ans	41	26	15	16	6	10	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	3	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	21	11	12	9	9	2
	55-59 ans	45	31	14	11	6	20	8
	60-64 ans	48	31	17	9	6	22	11
	65-69 ans	41	28	13	10	4	18	9
	70-74 ans	43	21	22	6	7	15	15
	50-74 ans	209	132	77	48	32	84	45
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	13	10	7	8	6	2
	55-59 ans	27	21	6	8	3	13	3
	60-64 ans	26	18	8	6	4	12	4
	65-69 ans	18	11	7	3	2	8	5
	70-74 ans	21	11	10	3	4	8	6
	50-74 ans	115	74	41	27	21	47	20
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	12	5	7	4	5	1
	55-59 ans	21	18	3	7	0	11	3
	60-64 ans	23	16	7	5	4	11	3
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	20	11	9	3	4	8	5
	50-74 ans	97	67	30	24	13	43	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	13	6	8	4	5	2
	55-59 ans	25	19	6	7	2	12	4
	60-64 ans	25	17	8	5	4	12	4
	65-69 ans	21	15	6	4	1	11	5
	70-74 ans	23	12	11	3	4	9	7
	50-74 ans	113	76	37	27	15	49	22
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	4	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	15	10	5	3	0	7	5
	70-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
	50-74 ans	38	23	15	6	8	17	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	4	3	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	15	10	5	3	0	7	5
	70-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
	50-74 ans	38	23	15	6	8	17	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	4	3	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	11	8	3	3	0	5	3
	70-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
	50-74 ans	33	20	13	6	8	14	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	59	39	20	33	18	6	2
	55-59 ans	35	23	12	14	6	9	6
	60-64 ans	35	18	17	8	5	10	12
	65-69 ans	36	20	16	15	12	5	4
	70-74 ans	24	11	13	5	5	6	8
	50-74 ans	189	111	78	75	46	36	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,2	9,2	9,2	9,7	9,8	7,9	7,9
	55-59 ans	9,6	9,8	9,4	12,6	11,7	8,1	8,1
	60-64 ans	9,2	9,4	9,1	12,5	11,3	7,9	8
	65-69 ans	8,8	9,3	8,5	12,6	11,5	7,8	7,2
	70-74 ans	9,2	10,1	8,5	14,1	11,5	8,7	7,5
	50-74 ans	9,2	9,5	9	11,4	10,8	8,1	7,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,8	3,8	3,7	4,4	4,4	2,2	2,1
	55-59 ans	3,7	3,8	3,7	6,1	5,5	2,5	2,6
	60-64 ans	3,2	3,4	3	6,1	5,1	2	2
	65-69 ans	2,8	2,8	2,8	5,2	5,1	1,7	1,8
	70-74 ans	3,3	3,5	3,1	6,9	5,7	2,3	2,2
	50-74 ans	3,4	3,5	3,3	5,3	4,9	2,1	2,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,3	59	59,6	54,8	55,2	71,9	72,8
	55-59 ans	61	60,8	61,1	51,4	53,1	69,6	67,9
	60-64 ans	65,5	64,3	66,5	51,3	54,7	74,4	74,5
	65-69 ans	68,5	69,9	67,3	58,7	55,3	77,7	75,1
	70-74 ans	64,4	65,2	63,7	50,9	50,3	73,2	70,9
	50-74 ans	63,4	63,3	63,5	53,7	54,2	73,5	72,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,6	1,2	1,3	0,8
	55-59 ans	1,3	1,7	1,1	2	1,2	1,5	0,9
	60-64 ans	1,5	1,7	1,3	2,3	1,1	1,5	1,3
	65-69 ans	1,6	2,1	1,3	2,6	1,6	1,9	1,1
	70-74 ans	1,8	1,7	1,8	2,3	2,7	1,5	1,5
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	2	1,4	1,6	1,2
50-74 ans **	1,5	1,7	1,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,4	100	97,9	100	100	100
	55-59 ans	98,9	98	100	95,2	100	100	100
	60-64 ans	99,1	99,1	99,1	100	96,8	98,4	100
	65-69 ans	98,6	97,4	100	100	100	95,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,1	98,5	99,8	98,4	99,5	98,5	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	62,2	55,7	70,5	51,1	68,9	70	76,2
	55-59 ans	69,9	68	72,2	52,5	70,6	78,9	73,3
	60-64 ans	73,4	72,7	74,1	66	73,3	77,8	74,4
	65-69 ans	69,4	64	75,8	48,8	55,9	73,2	86,9
	70-74 ans	74	70,8	76,2	62,5	74,4	75	77,3
	50-74 ans	69,6	65,6	73,9	54,9	68,7	75,5	77,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,9	88,2	89,6	87,2	88,2	90,5	93,8
	55-59 ans	86,2	84,8	87,7	85,7	83,3	84,4	90,9
	60-64 ans	85,6	82,5	88,8	83,9	95,5	81,6	86,2
	65-69 ans	86,9	90,4	83,3	95,2	89,5	88,5	81,1
	70-74 ans	79,4	78,4	80	60	75,9	86,1	82,4
	50-74 ans	85,4	85,2	85,7	84,4	86,2	85,7	85,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	6
	55-59 ans	6	6	6	6	6	5	6
	60-64 ans	6	6	6	6	6	6	6
	65-69 ans	6	6	6	6	6	6	6
	70-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-8)	5 (2-7)
	55-59 ans	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-7)	5 (2-7)
	60-64 ans	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-7)
	65-69 ans	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (2-7)
	70-74 ans	5 (2-8)	5 (3-8)	5 (2-7)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (2-7)
	50-74 ans	5 (2-7)	5 (3-8)	5 (2-7)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (2-8)	5 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	70	63	74	64	62	60
	55-59 ans	62	65	59	53	58	71	60
	60-64 ans	66	70	61	65	66	74	59
	65-69 ans	63	64	63	57	61	66	63
	70-74 ans	70	73	68	86	74	67	65
	50-74 ans	66	68	63	67	65	69	62
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	48 (33-79)	45.5 (34-77)	59 (32-83)	44 (36-66)	60 (32-91)	47 (29-78)	50.5 (32.5-71)
	55-59 ans	50 (32-79)	57 (35-84)	47 (28.5-74.5)	49 (32-61)	44.5 (27.5-73.5)	65 (35-109.5)	48 (32-76)
	60-64 ans	49 (34-79)	49 (33-92)	49 (35-77)	48 (35-64)	48.5 (35-83)	51 (33-95.5)	49 (35-74)
	65-69 ans	47 (32-77)	49 (34-77)	46.5 (31-75.5)	43 (24-69)	52 (39-83)	51 (35.5-82)	46 (30-73)
	70-74 ans	49 (31-77)	50 (34-93)	48.5 (30-77)	45 (37-107)	48 (29-80.5)	50.5 (31.5-85)	48.5 (31-77)
	50-74 ans	49 (32-78)	49 (34-84)	48.5 (31-77)	45.5 (34-68)	50 (31-82.5)	53 (34-89)	48 (31-75)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	26,9	31,5	21,1	35,1	24,3	20	9,5
	55-59 ans	19,7	23,2	15,2	33,3	17,6	15,8	13,3
	60-64 ans	15,9	16,2	15,6	17	16,1	15,6	15,4
	65-69 ans	17	17,1	16,8	34,9	35,3	6,8	6,6
	70-74 ans	13,6	15,3	12,4	20,8	12,8	12,5	12,1
	50-74 ans	18,8	21,2	16,1	30	21,7	13,2	11,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,3
	65-69 ans	99,3	100	98,6	100	94,7	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	99,3	100	99,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57	48,5	65,7	55,3	66,7	33,3	62,5
	55-59 ans	42,3	31,8	54,4	19	41,7	37,8	63,6
	60-64 ans	53,4	41,3	65,4	45,2	68,2	38,8	64,4
	65-69 ans	43,4	28,8	58,3	23,8	52,6	30,8	60,4
	70-74 ans	48,1	37,3	55	40	44,8	36,1	60,8
	50-74 ans	49,1	37,6	59,9	40,7	56,6	35,5	62,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	7,4	3	6,4	0	9,5	12,5
	55-59 ans	4,9	4,5	5,3	4,8	8,3	4,4	3
	60-64 ans	3,1	2,5	3,7	3,2	0	2	5,1
	65-69 ans	4,1	2,7	5,6	0	10,5	3,8	3,8
	70-74 ans	4,6	5,9	3,8	6,7	6,9	5,6	2
	50-74 ans	4,3	4,4	4,2	4,4	4,1	4,4	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	2,5	0	6,5	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	5,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0,3	1,5	0,7	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,7	11,8	1,5	10,6	2	14,3	0
	55-59 ans	14,6	15,2	14	14,3	12,5	15,6	15,2
	60-64 ans	13,7	16,3	11,1	9,7	9,1	20,4	11,9
	65-69 ans	15,9	23,3	8,3	33,3	10,5	19,2	7,5
	70-74 ans	16,8	19,6	15	20	10,3	19,4	17,6
	50-74 ans	13,5	17,2	10,1	15,6	7,6	18,2	11,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	19,1	14,9	14,9	15,7	28,6	12,5
	55-59 ans	22	31,8	10,5	38,1	12,5	28,9	9,1
	60-64 ans	16,1	22,5	9,9	19,4	18,2	24,5	6,8
	65-69 ans	12,4	15,1	9,7	14,3	10,5	15,4	9,4
	70-74 ans	16	21,6	12,5	20	13,8	22,2	11,8
	50-74 ans	16,5	21,9	11,5	20	14,5	23,2	9,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	1,5	3	2,1	3,9	0	0
	55-59 ans	5,7	4,5	7	0	16,7	6,7	0
	60-64 ans	3,7	6,3	1,2	6,5	0	6,1	1,7
	65-69 ans	10,3	13,7	6,9	14,3	0	13,5	9,4
	70-74 ans	5,3	7,8	3,8	0	6,9	11,1	2
	50-74 ans	5,5	6,8	4,2	4,4	5,5	8,4	3,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,1	10,3	6	10,6	5,9	9,5	6,3
	55-59 ans	6,5	9,1	3,5	19	0	4,4	6,1
	60-64 ans	3,1	3,8	2,5	6,5	0	2	3,4
	65-69 ans	6,9	8,2	5,6	14,3	5,3	5,8	5,7
	70-74 ans	5,3	7,8	3,8	13,3	6,9	5,6	2
	50-74 ans	5,9	7,7	4,2	11,9	4,1	4,9	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,5	0	4,5	0	1,7
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	5,3	0	0
	70-74 ans	0,8	0	1,3	0	3,4	0	0
	50-74 ans	0,6	0	1,1	0	2,1	0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,6	1,2	2,1	1,4	3,8	0,8
	55-59 ans	3,4	5,3	1,9	5,1	2,2	5,4	1,7
	60-64 ans	3,2	4,9	1,9	4,4	2,2	5,1	1,8
	65-69 ans	3,1	5	1,7	6,1	1,9	4,6	1,7
	70-74 ans	4,3	5	3,8	5,7	4,8	4,7	3,5
	50-74 ans	3	4,4	2	3,8	2,1	4,8	2
50-74 ans **	3,2	4,4	2	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,2	1,3	2,5	0,8
	55-59 ans	2	3,6	0,8	3,7	1,1	3,5	0,6
	60-64 ans	1,7	2,8	0,9	2,9	1,4	2,8	0,7
	65-69 ans	1,4	2	0,9	1,8	1	2	0,9
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,8	2,8	2,5	1,4
	50-74 ans	1,7	2,4	1,1	2,1	1,4	2,7	0,9
50-74 ans **	1,8	2,5	1,1	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,5	0,6	1,2	0,6	2,1	0,4
	55-59 ans	1,6	3,1	0,4	3,3	0	3	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 75 - Paris

Date de réalisation du présent document = 29/03/2016

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,5	2,5	0,8	2,4	1,4	2,5	0,5
	65-69 ans	1,2	1,8	0,8	1,2	0,5	2	0,9
	70-74 ans	2	2,6	1,6	2,8	2,8	2,5	1,2
	50-74 ans	1,4	2,2	0,8	1,9	0,9	2,5	0,7
	50-74 ans **	1,5	2,3	0,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,1	0,8
	55-59 ans	1,9	3,2	0,8	3,3	0,7	3,2	0,8
	60-64 ans	1,7	2,7	0,9	2,4	1,4	2,8	0,7
	65-69 ans	1,6	2,7	0,8	2,4	0,5	2,8	0,9
	70-74 ans	2,3	2,8	1,9	2,8	2,8	2,8	1,6
	50-74 ans	1,6	2,5	1	2,1	1	2,8	1
	50-74 ans **	1,7	2,6	1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	0	1,5	0,8	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0,1	1	0	0,7	0,2
	65-69 ans	1,2	1,8	0,7	1,8	0	1,8	0,9
	70-74 ans	0,7	0,9	0,5	0	1,4	1,3	0,2
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	0,5	0,5	1	0,3
	50-74 ans **	1,7	0,7	0,4