

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour les 2 départements[†]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	23	13	10	10	7	3	3
	55-59 ans	36	21	15	9	2	12	13
	60-64 ans	57	40	17	7	3	33	14
	65-69 ans	50	33	17	11	3	22	14
	70-74 ans	73	50	23	9	5	41	18
	50-74 ans	239	157	82	46	20	111	62
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	22	12	10	9	7	3	3
	55-59 ans	35	20	15	9	2	11	13
	60-64 ans	52	38	14	7	2	31	12
	65-69 ans	48	31	17	11	3	20	14
	70-74 ans	72	50	22	9	5	41	17
	50-74 ans	229	151	78	45	19	106	59
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	16	9	7	6	5	3	2
	55-59 ans	26	14	12	8	1	6	11
	60-64 ans	35	24	11	4	2	20	9
	65-69 ans	36	26	10	9	2	17	8
	70-74 ans	61	43	18	8	4	35	14
	50-74 ans	174	116	58	35	14	81	44
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	17	14	3	3	0	11	3
	65-69 ans	12	5	7	2	1	3	6
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	55	35	20	10	5	25	15
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	12	8	4	6	1	2	3
	60-64 ans	15	12	3	2	0	10	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour les 2 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14	11	3	3	1	8	2
	70-74 ans	29	19	10	3	3	16	7
	50-74 ans	79	53	26	16	9	37	17
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	10	6	4	1	2	5	2
	65-69 ans	9	5	4	3	1	2	3
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	38	24	14	8	3	16	11
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	8	3	5	2	0	1	5
	60-64 ans	8	5	3	1	0	4	3
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	18	14	4	2	1	12	3
	50-74 ans	42	27	15	7	1	20	14
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	7	0	2	0	5	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	15	12	3	4	1	8	2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[‡] Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour les 2 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	4,3	7,7	0	10	0	0	0
	55-59 ans	2,8	4,8	0	0	0	8,3	0
	60-64 ans	8,8	5	17,6	0	33,3	6,1	14,3
	65-69 ans	4	6,1	0	0	0	9,1	0
	70-74 ans	1,4	0	4,3	0	0	0	5,6
	50-74 ans	4,2	3,8	4,9	2,2	5	4,5	4,8
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	27,3	25	30	33,3	28,6	0	33,3
	55-59 ans	25,7	30	20	11,1	50	45,5	15,4
	60-64 ans	32,7	36,8	21,4	42,9	0	35,5	25
	65-69 ans	25	16,1	41,2	18,2	33,3	15	42,9
	70-74 ans	15,3	14	18,2	11,1	20	14,6	17,6
	50-74 ans	24	23,2	25,6	22,2	26,3	23,6	25,4
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	72,7	75	70	66,7	71,4	100	66,7
	55-59 ans	74,3	70	80	88,9	50	54,5	84,6
	60-64 ans	67,3	63,2	78,6	57,1	100	64,5	75
	65-69 ans	75	83,9	58,8	81,8	66,7	85	57,1
	70-74 ans	84,7	86	81,8	88,9	80	85,4	82,4
	50-74 ans	76	76,8	74,4	77,8	73,7	76,4	74,6
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	56,3	33,3	85,7	33,3	80	33,3	100
	55-59 ans	46,2	57,1	33,3	75	100	33,3	27,3
	60-64 ans	42,9	50	27,3	50	0	50	33,3
	65-69 ans	38,9	42,3	30	33,3	50	47,1	25
	70-74 ans	47,5	44,2	55,6	37,5	75	45,7	50
	50-74 ans	45,4	45,7	44,8	45,7	64,3	45,7	38,6
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,5	22,2	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	23,1	21,4	25	0	0	50	27,3
	60-64 ans	28,6	25	36,4	25	100	25	22,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour les 2 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25	19,2	40	33,3	50	11,8	37,5
	70-74 ans	18	18,6	16,7	25	0	17,1	21,4
	50-74 ans	21,8	20,7	24,1	22,9	21,4	19,8	25
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,5	22,2	0	16,7	0	33,3	0
	55-59 ans	30,8	21,4	41,7	25	0	16,7	45,5
	60-64 ans	22,9	20,8	27,3	25	0	20	33,3
	65-69 ans	16,7	11,5	30	11,1	0	11,8	37,5
	70-74 ans	29,5	32,6	22,2	25	25	34,3	21,4
	50-74 ans	24,1	23,3	25,9	20	7,1	24,7	31,8
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	18,8	22,2	14,3	16,7	20	33,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,7	4,2	9,1	0	0	5	11,1
	65-69 ans	19,4	26,9	0	22,2	0	29,4	0
	70-74 ans	4,9	4,7	5,6	12,5	0	2,9	7,1
	50-74 ans	8,6	10,3	5,2	11,4	7,1	9,9	4,5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire