

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	542	293	249	171	128	122	121
	55-59 ans	450	240	210	38	26	202	184
	60-64 ans	580	290	290	42	37	248	253
	65-69 ans	461	243	218	26	21	217	197
	70-74 ans	434	199	235	23	19	176	216
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 467</b>	<b>1 265</b>	<b>1 202</b>	<b>300</b>	<b>231</b>	<b>965</b>	<b>971</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	542	293	249	171	128	122	121
	55-59 ans	450	240	210	38	26	202	184
	60-64 ans	582	290	292	42	38	248	254
	65-69 ans	462	244	218	26	21	218	197
	70-74 ans	440	203	237	24	19	179	218
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 476</b>	<b>1 270</b>	<b>1 206</b>	<b>301</b>	<b>232</b>	<b>969</b>	<b>974</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	266	119	147	74	74	45	73
	55-59 ans	220	100	120	24	13	76	107
	60-64 ans	273	102	171	11	20	91	151
	65-69 ans	227	91	136	10	15	81	121
	70-74 ans	198	71	127	10	10	61	117
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 184</b>	<b>483</b>	<b>701</b>	<b>129</b>	<b>132</b>	<b>354</b>	<b>569</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	66	40	26	26	12	14	14
	55-59 ans	49	21	28	5	1	16	27
	60-64 ans	58	28	30	0	6	28	24
	65-69 ans	44	28	16	4	2	24	14
	70-74 ans	37	12	25	0	3	12	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>254</b>	<b>129</b>	<b>125</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>94</b>	<b>101</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	90	59	31	24	14	35	17
	55-59 ans	75	49	26	4	6	45	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98	52	46	6	4	46	42
	65-69 ans	72	42	30	2	2	40	28
	70-74 ans	72	39	33	3	1	36	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>407</b>	<b>241</b>	<b>166</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>202</b>	<b>139</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	91	60	31	37	19	23	12
	55-59 ans	78	53	25	4	4	49	21
	60-64 ans	103	76	27	16	5	60	22
	65-69 ans	81	58	23	4	0	54	23
	70-74 ans	83	51	32	9	2	42	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>298</b>	<b>138</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>228</b>	<b>108</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	4	9	2	6	2	3
	55-59 ans	22	16	6	1	1	15	5
	60-64 ans	34	24	10	7	1	17	9
	65-69 ans	29	21	8	5	1	16	7
	70-74 ans	43	25	18	2	2	23	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>90</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>40</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	181	119	62	61	33	58	29
	55-59 ans	153	102	51	8	10	94	41
	60-64 ans	201	128	73	22	9	106	64
	65-69 ans	153	100	53	6	2	94	51
	70-74 ans	155	90	65	12	3	78	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>843</b>	<b>539</b>	<b>304</b>	<b>109</b>	<b>57</b>	<b>430</b>	<b>247</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	91	60	31	37	19	23	12
	55-59 ans	78	53	25	4	4	49	21
	60-64 ans	103	76	27	16	5	60	22
	65-69 ans	81	58	23	4	0	54	23
	70-74 ans	83	51	32	9	2	42	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>298</b>	<b>138</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>228</b>	<b>108</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	69	49	20	28	13	21	7
	55-59 ans	55	38	17	4	2	34	15
	60-64 ans	79	60	19	12	3	48	16
	65-69 ans	62	46	16	2	0	44	16
	70-74 ans	61	38	23	5	1	33	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>326</b>	<b>231</b>	<b>95</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>180</b>	<b>76</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	4	9	2	6	2	3
	55-59 ans	22	16	6	1	1	15	5
	60-64 ans	34	24	10	7	1	17	9
	65-69 ans	29	21	8	5	1	16	7
	70-74 ans	44	26	18	3	2	23	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>91</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>40</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	100,0	99,3	100,0	97,4	100,0	99,6
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,3	99,0	99,6	100,0	100,0	98,9	99,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	40,6	59,0	43,3	57,8	36,9	60,3
	55-59 ans	48,9	41,7	57,1	63,2	50,0	37,6	58,2
	60-64 ans	46,9	35,2	58,6	26,2	52,6	36,7	59,4
	65-69 ans	49,1	37,3	62,4	38,5	71,4	37,2	61,4
	70-74 ans	45,0	35,0	53,6	41,7	52,6	34,1	53,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,8</b>	<b>38,0</b>	<b>58,1</b>	<b>42,9</b>	<b>56,9</b>	<b>36,5</b>	<b>58,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,2	13,7	10,4	15,2	9,4	11,5	11,6
	55-59 ans	10,9	8,8	13,3	13,2	3,8	7,9	14,7
	60-64 ans	10,0	9,7	10,3	0,0	15,8	11,3	9,4
	65-69 ans	9,5	11,5	7,3	15,4	9,5	11,0	7,1
	70-74 ans	8,4	5,9	10,5	0,0	15,8	6,7	10,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,4</b>	<b>11,6</b>	<b>10,3</b>	<b>9,7</b>	<b>10,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,0	0,8	1,8	0,8	0,0	0,8
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	60-64 ans	1,0	1,4	0,7	2,4	0,0	1,2	0,8
	65-69 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	4,8	0,0	0,5
	70-74 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,6	20,1	12,4	14,0	10,9	28,7	14,0
	55-59 ans	16,7	20,4	12,4	10,5	23,1	22,3	10,9
	60-64 ans	16,8	17,9	15,8	14,3	10,5	18,5	16,5
	65-69 ans	15,6	17,2	13,8	7,7	9,5	18,3	14,2
	70-74 ans	16,4	19,2	13,9	12,5	5,3	20,1	14,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>19,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,0</b>	<b>11,6</b>	<b>20,8</b>	<b>14,3</b>



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,0	3,8	8,4	4,0	9,7	3,7
	55-59 ans	5,7	8,6	3,5	5,0	6,0	9,1	3,1
	60-64 ans	6,5	9,2	4,3	12,2	4,8	8,7	4,2
	65-69 ans	6,6	9,7	4,1	6,4	2,0	10,0	4,3
	70-74 ans	7,9	10,7	5,9	15,9	3,4	10,2	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>9,3</b>	<b>4,2</b>	<b>8,8</b>	<b>4,1</b>	<b>9,5</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,6</b>	<b>9,3</b>	<b>4,2</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,5	1,9	5,1	2,3	3,9	1,5
	55-59 ans	2,9	4,5	1,7	2,5	2,4	4,8	1,6
	60-64 ans	3,3	5,4	1,6	8,9	2,7	4,9	1,5
	65-69 ans	3,5	5,6	1,8	4,3	0,0	5,7	1,9
	70-74 ans	4,3	6,1	2,9	11,9	2,2	5,5	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>1,9</b>	<b>5,7</b>	<b>2,2</b>	<b>5,0</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,7	1,2	3,9	1,6	3,5	0,9
	55-59 ans	2,1	3,2	1,2	2,5	1,2	3,3	1,1
	60-64 ans	2,6	4,3	1,1	6,7	1,6	4,0	1,1
	65-69 ans	2,7	4,5	1,2	2,1	0,0	4,7	1,4
	70-74 ans	3,1	4,5	2,1	6,6	1,1	4,3	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>4,1</b>	<b>1,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,6	0,3	0,7	0,3	0,4
	55-59 ans	0,8	1,3	0,4	0,6	0,6	1,5	0,4
	60-64 ans	1,1	1,7	0,6	3,9	0,5	1,4	0,6
	65-69 ans	1,3	2,0	0,6	5,4	1,0	1,7	0,6
	70-74 ans	2,3	3,1	1,6	4,0	2,2	3,0	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	.	.	.	.

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)