

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	55 310	25 283	30 027	15 950	17 923	9 333	12 104
	55-59 ans	52 143	23 061	29 082	6 557	7 595	16 504	21 487
	60-64 ans	58 616	26 173	32 443	6 542	7 673	19 631	24 770
	65-69 ans	43 965	20 124	23 841	4 526	5 075	15 598	18 766
	70-74 ans	35 396	15 966	19 430	3 126	3 717	12 840	15 713
	<b>50-74 ans</b>	<b>245 430</b>	<b>110 607</b>	<b>134 823</b>	<b>36 701</b>	<b>41 983</b>	<b>73 906</b>	<b>92 840</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 651	1 716	1 935	1 136	1 299	580	636
	55-59 ans	3 289	1 492	1 797	511	573	981	1 224
	60-64 ans	3 795	1 653	2 142	530	631	1 123	1 511
	65-69 ans	2 983	1 350	1 633	398	440	952	1 193
	70-74 ans	2 797	1 190	1 607	327	382	863	1 225
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 515</b>	<b>7 401</b>	<b>9 114</b>	<b>2 902</b>	<b>3 325</b>	<b>4 499</b>	<b>5 789</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 493	1 190	1 303	739	829	451	474
	55-59 ans	2 402	1 098	1 304	332	361	766	943
	60-64 ans	2 876	1 271	1 605	353	399	918	1 206
	65-69 ans	2 240	1 004	1 236	238	282	766	954
	70-74 ans	2 086	902	1 184	208	244	694	940
	<b>50-74 ans</b>	<b>12 097</b>	<b>5 465</b>	<b>6 632</b>	<b>1 870</b>	<b>2 115</b>	<b>3 595</b>	<b>4 517</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 158	526	632	397	470	129	162
	55-59 ans	887	394	493	179	212	215	281
	60-64 ans	919	382	537	177	232	205	305
	65-69 ans	743	346	397	160	158	186	239
	70-74 ans	711	288	423	119	138	169	285
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 418</b>	<b>1 936</b>	<b>2 482</b>	<b>1 032</b>	<b>1 210</b>	<b>904</b>	<b>1 272</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	54 152	24 757	29 395	15 553	17 453	9 204	11 942
	55-59 ans	51 256	22 667	28 589	6 378	7 383	16 289	21 206
	60-64 ans	57 697	25 791	31 906	6 365	7 441	19 426	24 465
	65-69 ans	43 222	19 778	23 444	4 366	4 917	15 412	18 527
	70-74 ans	34 685	15 678	19 007	3 007	3 579	12 671	15 428
	<b>50-74 ans</b>	<b>241 012</b>	<b>108 671</b>	<b>132 341</b>	<b>35 669</b>	<b>40 773</b>	<b>73 002</b>	<b>91 568</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 144	605	539	389	346	216	193
	55-59 ans	1 166	627	539	193	163	434	376
	60-64 ans	1 384	735	649	214	191	521	458

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 128	611	517	166	124	445	393
	70-74 ans	988	519	469	130	100	389	369
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 810</b>	<b>3 097</b>	<b>2 713</b>	<b>1 092</b>	<b>924</b>	<b>2 005</b>	<b>1 789</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 139	603	536	388	344	215	192
	55-59 ans	1 165	627	538	193	163	434	375
	60-64 ans	1 378	732	646	213	191	519	455
	65-69 ans	1 120	605	515	165	123	440	392
	70-74 ans	978	512	466	127	100	385	366
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 780</b>	<b>3 079</b>	<b>2 701</b>	<b>1 086</b>	<b>921</b>	<b>1 993</b>	<b>1 780</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 030	546	484	346	302	200	182
	55-59 ans	1 077	582	495	173	148	409	347
	60-64 ans	1 259	656	603	184	179	472	424
	65-69 ans	1 033	559	474	152	109	407	365
	70-74 ans	885	468	417	115	86	353	331
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 284</b>	<b>2 811</b>	<b>2 473</b>	<b>970</b>	<b>824</b>	<b>1 841</b>	<b>1 649</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 021	541	480	341	299	200	181
	55-59 ans	1 060	577	483	171	145	406	338
	60-64 ans	1 235	646	589	180	172	466	417
	65-69 ans	1 011	547	464	148	104	399	360
	70-74 ans	852	456	396	112	79	344	317
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 179</b>	<b>2 767</b>	<b>2 412</b>	<b>952</b>	<b>799</b>	<b>1 815</b>	<b>1 613</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 028	544	484	344	302	200	182
	55-59 ans	1 072	580	492	173	148	407	344
	60-64 ans	1 250	654	596	184	177	470	419
	65-69 ans	1 023	552	471	150	108	402	363
	70-74 ans	868	459	409	115	82	344	327
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 241</b>	<b>2 789</b>	<b>2 452</b>	<b>966</b>	<b>817</b>	<b>1 823</b>	<b>1 635</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	9	2	7	0	2	2	5
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	17	9	8	0	4	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>14</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,8	6,4	7,1	7,2	6,2	5,3
	55-59 ans	6,3	6,5	6,2	7,8	7,5	5,9	5,7
	60-64 ans	6,5	6,3	6,6	8,1	8,2	5,7	6,1
	65-69 ans	6,8	6,7	6,8	8,8	8,7	6,1	6,4
	70-74 ans	7,9	7,5	8,3	10,5	10,3	6,7	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,5	2,6	1,4	1,3
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	2,7	2,8	1,3	1,3
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	2,7	3,0	1,0	1,2
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	3,5	3,1	1,2	1,3
	70-74 ans	2,0	1,8	2,2	3,8	3,7	1,3	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,3	69,3	67,3	65,1	63,8	77,8	74,5
	55-59 ans	73,0	73,6	72,6	65,0	63,0	78,1	77,0
	60-64 ans	75,8	76,9	74,9	66,6	63,2	81,7	79,8
	65-69 ans	75,1	74,4	75,7	59,8	64,1	80,5	80,0
	70-74 ans	74,6	75,8	73,7	63,6	63,9	80,4	76,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,2</b>	<b>73,8</b>	<b>72,8</b>	<b>64,4</b>	<b>63,6</b>	<b>79,9</b>	<b>78,0</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,5	2,0	2,3	1,6
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	3,0	2,2	2,7	1,8
	60-64 ans	2,4	2,8	2,0	3,4	2,6	2,7	1,9
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	3,8	2,5	2,9	2,1
	70-74 ans	2,8	3,3	2,5	4,3	2,8	3,1	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,7	99,4	99,7	99,4	99,5	99,5
	55-59 ans	99,9	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7
	60-64 ans	99,6	99,6	99,5	99,5	100,0	99,6	99,3
	65-69 ans	99,3	99,0	99,6	99,4	99,2	98,9	99,7
	70-74 ans	99,0	98,7	99,4	97,7	100,0	99,0	99,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,4	90,5	90,3	89,2	87,8	93,0	94,8
	55-59 ans	92,4	92,8	92,0	89,6	90,8	94,2	92,5
	60-64 ans	91,4	89,6	93,3	86,4	93,7	90,9	93,2
	65-69 ans	92,2	92,4	92,0	92,1	88,6	92,5	93,1
	70-74 ans	90,5	91,4	89,5	90,6	86,0	91,7	90,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,4</b>	<b>91,3</b>	<b>91,6</b>	<b>89,3</b>	<b>89,5</b>	<b>92,4</b>	<b>92,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	99,1	99,2	98,6	99,0	100,0	99,5
	55-59 ans	98,4	99,1	97,6	98,8	98,0	99,3	97,4
	60-64 ans	98,1	98,5	97,7	97,8	96,1	98,7	98,3
	65-69 ans	97,9	97,9	97,9	97,4	95,4	98,0	98,6
	70-74 ans	96,3	97,4	95,0	97,4	91,9	97,5	95,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,0</b>	<b>98,4</b>	<b>97,5</b>	<b>98,1</b>	<b>97,0</b>	<b>98,6</b>	<b>97,8</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)