

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 028	544	484	345	302	199	182
	55-59 ans	1 077	582	495	173	148	409	347
	60-64 ans	1 256	656	600	184	178	472	422
	65-69 ans	1 029	556	473	151	109	405	364
	70-74 ans	882	467	415	115	85	352	330
	50-74 ans	5 272	2 805	2 467	968	822	1 837	1 645
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 031	546	485	346	302	200	183
	55-59 ans	1 077	582	495	173	148	409	347
	60-64 ans	1 262	656	606	184	179	472	427
	65-69 ans	1 037	562	475	153	109	409	366
	70-74 ans	893	474	419	117	86	357	333
	50-74 ans	5 300	2 820	2 480	973	824	1 847	1 656
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	521	241	280	148	167	93	113
	55-59 ans	490	213	277	53	78	160	199
	60-64 ans	541	210	331	55	96	155	235
	65-69 ans	427	173	254	40	53	133	201
	70-74 ans	353	135	218	41	53	94	165
	50-74 ans	2 332	972	1 360	337	447	635	913
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	85	50	35	31	26	19	9
	55-59 ans	85	51	34	21	16	30	18
	60-64 ans	92	60	32	19	10	41	22
	65-69 ans	71	43	28	13	12	30	16
	70-74 ans	49	16	33	3	4	13	29
	50-74 ans	382	220	162	87	68	133	94
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	19	11	8	3	1	8	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	151	92	59	54	36	38	23
	55-59 ans	188	116	72	34	22	82	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	228	143	85	33	25	110	60
	65-69 ans	170	104	66	31	16	73	50
	70-74 ans	161	104	57	20	9	84	48
	50-74 ans	898	559	339	172	108	387	231
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	153	93	60	60	46	33	14
	55-59 ans	178	125	53	41	22	84	31
	60-64 ans	217	138	79	45	21	93	58
	65-69 ans	210	144	66	35	13	109	53
	70-74 ans	192	136	56	28	9	108	47
	50-74 ans	950	636	314	209	111	427	203
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	44	26	18	23	13	3	5
	55-59 ans	61	39	22	14	4	25	18
	60-64 ans	86	55	31	19	13	36	18
	65-69 ans	92	62	30	23	9	39	21
	70-74 ans	88	58	30	16	7	42	23
	50-74 ans	371	240	131	95	46	145	85
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	23	8	15	7	6	1	9
	55-59 ans	21	10	11	2	3	8	8
	60-64 ans	30	11	19	3	7	8	12
	65-69 ans	22	14	8	5	2	9	6
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	109	52	57	18	18	34	39
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	17	10	7	7	4	3	3
	55-59 ans	10	5	5	3	0	2	5
	60-64 ans	20	12	8	5	2	7	6
	65-69 ans	14	9	5	4	1	5	4
	70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
	50-74 ans	67	40	27	21	8	19	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	304	185	119	114	82	71	37
	55-59 ans	366	241	125	75	44	166	81
	60-64 ans	445	281	164	78	46	203	118
	65-69 ans	380	248	132	66	29	182	103
	70-74 ans	353	240	113	48	18	192	95
	50-74 ans	1 848	1 195	653	381	219	814	434
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	153	93	60	60	46	33	14
	55-59 ans	178	125	53	41	22	84	31
	60-64 ans	217	138	79	45	21	93	58
	65-69 ans	210	144	66	35	13	109	53
	70-74 ans	192	136	56	28	9	108	47
	50-74 ans	950	636	314	209	111	427	203
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	121	75	46	50	37	25	9
	55-59 ans	139	100	39	32	17	68	22
	60-64 ans	160	109	51	36	14	73	37
	65-69 ans	160	110	50	30	10	80	40
	70-74 ans	135	99	36	19	8	80	28
	50-74 ans	715	493	222	167	86	326	136
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	44	26	18	23	13	3	5
	55-59 ans	62	40	22	14	4	26	18
	60-64 ans	87	56	31	20	13	36	18
	65-69 ans	92	62	30	23	9	39	21
	70-74 ans	88	58	30	16	7	42	23
	50-74 ans	373	242	131	96	46	146	85

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	99,6	100,0	99,7	100,0	99,5	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	99,4	100,0	99,5
	65-69 ans	99,6	99,5	99,8	99,3	100,0	99,5	99,7
	70-74 ans	99,7	99,8	99,5	100,0	98,8	99,7	99,7
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,5	44,1	57,7	42,8	55,3	46,5	61,7
	55-59 ans	45,5	36,6	56,0	30,6	52,7	39,1	57,3
	60-64 ans	42,9	32,0	54,6	29,9	53,6	32,8	55,0
	65-69 ans	41,2	30,8	53,5	26,1	48,6	32,5	54,9
	70-74 ans	39,5	28,5	52,0	35,0	61,6	26,3	49,5
	50-74 ans	44,0	34,5	54,8	34,6	54,2	34,4	55,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	9,2	7,2	9,0	8,6	9,5	4,9
	55-59 ans	7,9	8,8	6,9	12,1	10,8	7,3	5,2
	60-64 ans	7,3	9,1	5,3	10,3	5,6	8,7	5,2
	65-69 ans	6,8	7,7	5,9	8,5	11,0	7,3	4,4
	70-74 ans	5,5	3,4	7,9	2,6	4,7	3,6	8,7
	50-74 ans	7,2	7,8	6,5	8,9	8,3	7,2	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5
	55-59 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	65-69 ans	0,5	0,5	0,4	0,7	0,0	0,5	0,5
	70-74 ans	0,4	0,2	0,7	0,9	0,0	0,0	0,9
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	16,8	12,2	15,6	11,9	19,0	12,6
	55-59 ans	17,5	19,9	14,5	19,7	14,9	20,0	14,4
	60-64 ans	18,1	21,8	14,0	17,9	14,0	23,3	14,1
	65-69 ans	16,4	18,5	13,9	20,3	14,7	17,8	13,7
	70-74 ans	18,0	21,9	13,6	17,1	10,5	23,5	14,4
	50-74 ans	16,9	19,8	13,7	17,7	13,1	21,0	13,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14,8	17,0	12,4	17,3	15,2	16,5	7,7
	55-59 ans	16,5	21,5	10,7	23,7	14,9	20,5	8,9
	60-64 ans	17,2	21,0	13,0	24,5	11,7	19,7	13,6
	65-69 ans	20,3	25,6	13,9	22,9	11,9	26,7	14,5
	70-74 ans	21,5	28,7	13,4	23,9	10,5	30,3	14,1
	50-74 ans	17,9	22,6	12,7	21,5	13,5	23,1	12,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,8	3,7	6,6	4,3	1,5	2,7
	55-59 ans	5,7	6,7	4,4	8,1	2,7	6,1	5,2
	60-64 ans	6,8	8,4	5,1	10,3	7,3	7,6	4,2
	65-69 ans	8,9	11,0	6,3	15,0	8,3	9,5	5,7
	70-74 ans	9,9	12,2	7,2	13,7	8,1	11,8	6,9
	50-74 ans	7,0	8,5	5,3	9,8	5,6	7,9	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	1,5	3,1	2,0	2,0	0,5	4,9
	55-59 ans	1,9	1,7	2,2	1,2	2,0	2,0	2,3
	60-64 ans	2,4	1,7	3,1	1,6	3,9	1,7	2,8
	65-69 ans	2,1	2,5	1,7	3,3	1,8	2,2	1,6
	70-74 ans	1,5	1,9	1,0	0,9	0,0	2,2	1,2
	50-74 ans	2,1	1,8	2,3	1,8	2,2	1,8	2,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	2,0	1,3	1,5	1,6
	55-59 ans	0,9	0,9	1,0	1,7	0,0	0,5	1,4
	60-64 ans	1,6	1,8	1,3	2,7	1,1	1,5	1,4
	65-69 ans	1,4	1,6	1,1	2,6	0,9	1,2	1,1
	70-74 ans	0,7	0,8	0,5	1,7	1,2	0,6	0,3
	50-74 ans	1,3	1,4	1,1	2,2	1,0	1,0	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	65-69 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées		70-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
		50-74 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
		50-54 ans	5,6	7,5	4,0	7,3	4,7	7,7	3,1
		55-59 ans	7,1	10,6	4,4	11,8	6,0	10,2	3,8
		60-64 ans	7,7	10,9	5,1	12,3	6,2	10,4	4,8
		65-69 ans	8,8	12,5	5,6	15,1	5,9	11,8	5,6
		70-74 ans	10,2	15,3	5,9	16,0	5,0	15,2	6,2
		50-74 ans	7,7	11,0	4,9	10,7	5,4	11,2	4,7
	50-74 ans **	7,7	10,8	4,9	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	2,8	3,8	2,0	3,9	2,6	3,6	1,2
		55-59 ans	3,5	5,5	1,9	6,4	3,0	5,2	1,5
		60-64 ans	3,8	5,4	2,5	7,1	2,8	4,8	2,4
		65-69 ans	4,9	7,3	2,8	8,0	2,6	7,1	2,9
		70-74 ans	5,5	8,7	2,9	9,3	2,5	8,5	3,0
		50-74 ans	3,9	5,9	2,4	5,9	2,7	5,8	2,2
		50-74 ans **	4,0	5,7	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	2,2	3,0	1,6	3,2	2,1	2,7	0,8
		55-59 ans	2,7	4,4	1,4	5,0	2,3	4,2	1,0
		60-64 ans	2,8	4,2	1,6	5,7	1,9	3,8	1,5
		65-69 ans	3,7	5,6	2,1	6,9	2,0	5,2	2,2
		70-74 ans	3,9	6,3	1,9	6,3	2,2	6,3	1,8
		50-74 ans	3,0	4,5	1,7	4,7	2,1	4,5	1,5
		50-74 ans **	3,0	4,4	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,5	0,7	0,3	0,4
		55-59 ans	1,2	1,8	0,8	2,2	0,5	1,6	0,8
		60-64 ans	1,5	2,2	1,0	3,1	1,7	1,9	0,7
		65-69 ans	2,1	3,1	1,3	5,3	1,8	2,5	1,1
		70-74 ans	2,5	3,7	1,6	5,3	2,0	3,3	1,5
		50-74 ans	1,5	2,2	1,0	2,7	1,1	2,0	0,9
		50-74 ans **	1,5	2,1	1,0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)