

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour 1 département[†]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
	50-74 ans	26	17	9	4	3	13	6
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	23	14	9	3	3	11	6
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	14	9	5	2	1	7	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

‡ Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 1 département †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	23,1	30	0	50	0	25	0
	50-74 ans	11,5	17,6	0	25	0	15,4	0
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	33,3	0	100	0	100	0	0
	60-64 ans	20	33,3	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	50	0	66,7	0	100	0	50
	70-74 ans	40	42,9	33,3	0	0	50	33,3
	50-74 ans	39,1	35,7	44,4	33,3	66,7	36,4	33,3
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	66,7	100	0	0	0	100	0
	60-64 ans	80	66,7	100	0	100	66,7	100
	65-69 ans	50	100	33,3	100	0	0	50
	70-74 ans	60	57,1	66,7	100	0	50	66,7
	50-74 ans	60,9	64,3	55,6	66,7	33,3	63,6	66,7
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	50	0	0	0	50	0
	60-64 ans	25	50	0	0	0	50	0
	65-69 ans	50	0	100	0	0	0	100
	70-74 ans	16,7	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	28,6	22,2	40	0	0	28,6	50
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	25	0	50	0	100	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 1 département ‡. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	50	100	0	100	0	0	0
	70-74 ans	33,3	25	50	100	0	0	50
	50-74 ans	28,6	22,2	40	100	100	0	25
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	25	50	0	0	0	50	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	33,3	50	0	0	0	66,7	0
	50-74 ans	21,4	33,3	0	0	0	42,9	0
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	50	0	0	0	50	0
	60-64 ans	25	0	50	0	0	0	100
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	16,7	25	0	0	0	33,3	0
	50-74 ans	21,4	22,2	20	0	0	28,6	25

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

‡ Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire