

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 189	2 713	4 476	2 245	3 371	468	1 105
	55-59 ans	6 406	2 185	4 221	1 023	1 368	1 162	2 853
	60-64 ans	6 426	2 235	4 191	1 068	1 301	1 167	2 890
	65-69 ans	4 681	1 652	3 029	729	777	923	2 252
	70-74 ans	3 943	1 443	2 500	600	774	843	1 726
	50-74 ans	28 645	10 228	18 417	5 665	7 591	4 563	10 826
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	689	325	364	274	302	51	62
	55-59 ans	648	266	382	139	131	127	251
	60-64 ans	655	272	383	154	130	118	253
	65-69 ans	553	201	352	107	113	94	239
	70-74 ans	613	245	368	123	133	122	235
	50-74 ans	3 158	1 309	1 849	797	809	512	1 040
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	287	122	165	98	134	24	31
	55-59 ans	285	96	189	40	54	56	135
	60-64 ans	306	117	189	56	48	61	141
	65-69 ans	257	82	175	41	44	41	131
	70-74 ans	257	98	159	32	42	66	117
	50-74 ans	1 392	515	877	267	322	248	555
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	402	203	199	176	168	27	31
	55-59 ans	363	170	193	99	77	71	116
	60-64 ans	349	155	194	98	82	57	112
	65-69 ans	296	119	177	66	69	53	108
	70-74 ans	356	147	209	91	91	56	118
	50-74 ans	1 766	794	972	530	487	264	485
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 787	2 510	4 277	2 069	3 203	441	1 074
	55-59 ans	6 043	2 015	4 028	924	1 291	1 091	2 737
	60-64 ans	6 077	2 080	3 997	970	1 219	1 110	2 778
	65-69 ans	4 385	1 533	2 852	663	708	870	2 144
	70-74 ans	3 587	1 296	2 291	509	683	787	1 608
	50-74 ans	26 879	9 434	17 445	5 135	7 104	4 299	10 341
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	110	41	69	38	50	3	19
	55-59 ans	119	49	70	31	24	18	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	133	46	87	15	28	31	59
	65-69 ans	101	39	62	18	17	21	45
	70-74 ans	74	34	40	14	13	20	27
	50-74 ans	537	209	328	116	132	93	196
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	110	41	69	38	50	3	19
	55-59 ans	118	48	70	31	24	17	46
	60-64 ans	133	46	87	15	28	31	59
	65-69 ans	101	39	62	18	17	21	45
	70-74 ans	72	32	40	14	13	18	27
	50-74 ans	534	206	328	116	132	90	196
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	27	62	25	44	2	18
	55-59 ans	100	39	61	26	19	13	42
	60-64 ans	118	41	77	14	24	27	53
	65-69 ans	86	29	57	10	15	19	42
	70-74 ans	56	23	33	8	10	15	23
	50-74 ans	449	159	290	83	112	76	178
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	80	24	56	22	39	2	17
	55-59 ans	84	34	50	22	16	12	34
	60-64 ans	104	37	67	11	23	26	44
	65-69 ans	76	25	51	7	11	18	40
	70-74 ans	52	22	30	7	9	15	21
	50-74 ans	396	142	254	69	98	73	156
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	88	27	61	25	43	2	18
	55-59 ans	99	39	60	26	18	13	42
	60-64 ans	118	41	77	14	24	27	53
	65-69 ans	86	29	57	10	15	19	42
	70-74 ans	56	23	33	8	10	15	23
	50-74 ans	447	159	288	83	110	76	178
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,6	12,0	8,1	12,2	9,0	10,9	5,6
	55-59 ans	10,1	12,2	9,0	13,6	9,6	10,9	8,8
	60-64 ans	10,2	12,2	9,1	14,4	10,0	10,1	8,8
	65-69 ans	11,8	12,2	11,6	14,7	14,5	10,2	10,6
	70-74 ans	15,5	17,0	14,7	20,5	17,2	14,5	13,6
	50-74 ans	11,0	12,8	10,0	14,1	10,7	11,2	9,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,6	7,5	4,4	7,8	5,0	5,8	2,8
	55-59 ans	5,7	7,8	4,6	9,7	5,6	6,1	4,1
	60-64 ans	5,4	6,9	4,6	9,2	6,3	4,9	3,9
	65-69 ans	6,3	7,2	5,8	9,1	8,9	5,7	4,8
	70-74 ans	9,0	10,2	8,4	15,2	11,8	6,6	6,8
	50-74 ans	6,2	7,8	5,3	9,4	6,4	5,8	4,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	41,7	37,5	45,3	35,8	44,4	47,1	50,0
	55-59 ans	44,0	36,1	49,5	28,8	41,2	44,1	53,8
	60-64 ans	46,7	43,0	49,3	36,4	36,9	51,7	55,7
	65-69 ans	46,5	40,8	49,7	38,3	38,9	43,6	54,8
	70-74 ans	41,9	40,0	43,2	26,0	31,6	54,1	49,8
	50-74 ans	44,1	39,3	47,4	33,5	39,8	48,4	53,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	0,7	1,8
	55-59 ans	2,0	2,4	1,7	3,4	1,9	1,6	1,7
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	1,5	2,3	2,8	2,1
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	2,7	2,4	2,4	2,1
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	2,8	1,9	2,5	1,7
	50-74 ans	2,0	2,2	1,9	2,3	1,9	2,2	1,9
50-74 ans **	2,0	2,2	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	98,0	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	97,3	94,1	100,0	100,0	100,0	90,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,4	98,6	100,0	100,0	100,0	96,8	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,9	65,9	89,9	65,8	88,0	66,7	94,7
	55-59 ans	84,7	81,3	87,1	83,9	79,2	76,5	91,3
	60-64 ans	88,7	89,1	88,5	93,3	85,7	87,1	89,8
	65-69 ans	85,1	74,4	91,9	55,6	88,2	90,5	93,3
	70-74 ans	77,8	71,9	82,5	57,1	76,9	83,3	85,2
	50-74 ans	84,1	77,2	88,4	71,6	84,8	84,4	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,9	88,9	90,3	88,0	88,6	100,0	94,4
	55-59 ans	84,0	87,2	82,0	84,6	84,2	92,3	81,0
	60-64 ans	88,1	90,2	87,0	78,6	95,8	96,3	83,0
	65-69 ans	88,4	86,2	89,5	70,0	73,3	94,7	95,2
	70-74 ans	92,9	95,7	90,9	87,5	90,0	100,0	91,3
	50-74 ans	88,2	89,3	87,6	83,1	87,5	96,1	87,6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)