

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	598	307	291	233	192	74	99
	55-59 ans	646	363	283	180	139	183	144
	60-64 ans	825	411	414	177	177	234	237
	65-69 ans	728	381	347	166	119	215	228
	70-74 ans	668	322	346	141	120	181	226
	50-74 ans	3 465	1 784	1 681	897	747	887	934
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	604	309	295	235	195	74	100
	55-59 ans	650	364	286	181	141	183	145
	60-64 ans	835	416	419	180	177	236	242
	65-69 ans	734	386	348	167	120	219	228
	70-74 ans	679	329	350	143	123	186	227
	50-74 ans	3 502	1 804	1 698	906	756	898	942
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	358	169	189	131	123	38	66
	55-59 ans	309	145	164	70	84	75	80
	60-64 ans	379	146	233	62	101	84	132
	65-69 ans	329	133	196	49	73	84	123
	70-74 ans	301	105	196	49	62	56	134
	50-74 ans	1 676	698	978	361	443	337	535
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	29	17	12	13	9	4	3
	55-59 ans	33	20	13	9	6	11	7
	60-64 ans	34	19	15	6	3	13	12
	65-69 ans	43	25	18	8	5	17	13
	70-74 ans	29	14	15	6	5	8	10
	50-74 ans	168	95	73	42	28	53	45
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	9	2	7	1	4	1	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	19	19	15	8	4	11
	55-59 ans	68	38	30	15	11	23	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	82	42	40	16	11	26	29
	65-69 ans	69	38	31	16	5	22	26
	70-74 ans	74	38	36	14	13	24	23
	50-74 ans	331	175	156	76	48	99	108
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	96	57	39	38	28	19	11
	55-59 ans	120	90	30	48	15	42	15
	60-64 ans	168	112	56	47	30	65	26
	65-69 ans	144	88	56	38	16	50	40
	70-74 ans	128	84	44	23	18	61	26
	50-74 ans	656	431	225	194	107	237	118
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	19	10	9	8	4	2	5
	55-59 ans	40	25	15	14	10	11	5
	60-64 ans	63	39	24	18	11	21	13
	65-69 ans	77	56	21	30	6	26	15
	70-74 ans	75	50	25	28	8	22	17
	50-74 ans	274	180	94	98	39	82	55
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	1	1	3	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	18	9	9	2	4	7	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	41	24	17	21	15	3	2
	55-59 ans	53	32	21	19	11	13	10
	60-64 ans	68	37	31	20	14	17	17
	65-69 ans	59	37	22	22	13	15	9
	70-74 ans	53	32	21	20	11	12	10
	50-74 ans	274	162	112	102	64	60	48
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	3	1	1	3
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	50-74 ans	22	11	11	8	6	3	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	145	83	62	60	40	23	22
	55-59 ans	207	139	68	70	33	69	35
	60-64 ans	268	165	103	68	46	97	57
	65-69 ans	236	140	96	64	26	76	70
	70-74 ans	223	135	88	48	35	87	53
	50-74 ans	1 079	662	417	310	180	352	237
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	96	57	39	38	28	19	11
	55-59 ans	120	90	30	48	15	42	15
	60-64 ans	168	112	56	47	30	65	26
	65-69 ans	144	88	56	38	16	50	40
	70-74 ans	128	84	44	23	18	61	26
	50-74 ans	656	431	225	194	107	237	118
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	77	46	31	31	23	15	8
	55-59 ans	83	65	18	36	6	29	12
	60-64 ans	113	82	31	33	16	49	15
	65-69 ans	103	65	38	28	10	37	28
	70-74 ans	82	57	25	16	11	41	14
	50-74 ans	458	315	143	144	66	171	77
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	19	10	9	8	4	2	5
	55-59 ans	40	25	15	14	10	11	5
	60-64 ans	63	39	24	18	11	21	13
	65-69 ans	77	56	21	30	6	26	15
	70-74 ans	76	51	25	29	8	22	17
	50-74 ans	275	181	94	99	39	82	55

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,4	99,0	99,1	98,5	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,7	99,0	99,4	98,6	100,0	99,3
	60-64 ans	99,3	99,0	99,5	98,9	100,0	99,2	99,2
	65-69 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	70-74 ans	99,3	99,4	99,1	99,3	98,4	99,5	99,6
	50-74 ans	99,4	99,4	99,3	99,3	99,1	99,4	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,3	54,7	64,1	55,7	63,1	51,4	66,0
	55-59 ans	47,5	39,8	57,3	38,7	59,6	41,0	55,2
	60-64 ans	45,4	35,1	55,6	34,4	57,1	35,6	54,5
	65-69 ans	44,8	34,5	56,3	29,3	60,8	38,4	53,9
	70-74 ans	44,3	31,9	56,0	34,3	50,4	30,1	59,0
	50-74 ans	47,9	38,7	57,6	39,8	58,6	37,5	56,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	5,5	4,1	5,5	4,6	5,4	3,0
	55-59 ans	5,1	5,5	4,5	5,0	4,3	6,0	4,8
	60-64 ans	4,1	4,6	3,6	3,3	1,7	5,5	5,0
	65-69 ans	5,9	6,5	5,2	4,8	4,2	7,8	5,7
	70-74 ans	4,3	4,3	4,3	4,2	4,1	4,3	4,4
	50-74 ans	4,8	5,3	4,3	4,6	3,7	5,9	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	1,0
	55-59 ans	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7
	60-64 ans	0,6	0,5	0,7	0,6	1,1	0,4	0,4
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,3	6,1	6,4	6,4	4,1	5,4	11,0
	55-59 ans	10,5	10,4	10,5	8,3	7,8	12,6	13,1
	60-64 ans	9,8	10,1	9,5	8,9	6,2	11,0	12,0
	65-69 ans	9,4	9,8	8,9	9,6	4,2	10,0	11,4
	70-74 ans	10,9	11,6	10,3	9,8	10,6	12,9	10,1
	50-74 ans	9,5	9,7	9,2	8,4	6,3	11,0	11,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,9	18,4	13,2	16,2	14,4	25,7	11,0
	55-59 ans	18,5	24,7	10,5	26,5	10,6	23,0	10,3
	60-64 ans	20,1	26,9	13,4	26,1	16,9	27,5	10,7
	65-69 ans	19,6	22,8	16,1	22,8	13,3	22,8	17,5
	70-74 ans	18,9	25,5	12,6	16,1	14,6	32,8	11,5
	50-74 ans	18,7	23,9	13,3	21,4	14,2	26,4	12,5
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	3,2	3,1	3,4	2,1	2,7
55-59 ans		6,2	6,9	5,2	7,7	7,1	6,0	3,4
60-64 ans		7,5	9,4	5,7	10,0	6,2	8,9	5,4
65-69 ans		10,5	14,5	6,0	18,0	5,0	11,9	6,6
70-74 ans		11,0	15,2	7,1	19,6	6,5	11,8	7,5
50-74 ans		7,8	10,0	5,5	10,8	5,2	9,1	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	0,8	1,3	0,3	0,4	0,5	4,1
	55-59 ans	0,5	0,5	0,3	0,0	0,7	1,1	0,0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,0	0,4	0,8
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,8	0,5	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,1	0,0	0,8	0,0	1,3
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,8	0,5
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,8	7,8	5,8	8,9	7,7	4,1
55-59 ans		8,2	8,8	7,3	10,5	7,8	7,1	6,9
60-64 ans		8,1	8,9	7,4	11,1	7,9	7,2	7,0
65-69 ans		8,0	9,6	6,3	13,2	10,8	6,8	3,9
70-74 ans		7,8	9,7	6,0	14,0	8,9	6,5	4,4
50-74 ans		7,8	9,0	6,6	11,3	8,5	6,7	5,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0,9	1,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,3	1,0	0,6	1,4	0,0	0,7
	60-64 ans	1,0	1,0	1,0	1,7	0,6	0,4	1,2
	65-69 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	0,6	0,6	0,6	1,4	0,8	0,0	0,4
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,9	0,8	0,3	0,5
	50-54 ans	2,8	3,5	2,3	3,2	2,0	4,3	2,9
	55-59 ans	4,6	6,8	2,8	6,7	3,2	6,9	2,5
	60-64 ans	5,1	6,9	3,6	6,2	4,1	7,6	3,3
	65-69 ans	6,1	7,9	4,6	8,7	3,6	7,3	5,2
	70-74 ans	6,9	9,0	5,1	8,6	6,1	9,3	4,6
	50-74 ans	4,9	6,6	3,5	5,9	3,3	7,4	3,7
50-74 ans **	4,9	6,5	3,5	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,4	1,4	2,1	1,4	3,5	1,5
	55-59 ans	2,7	4,4	1,2	4,6	1,5	4,2	1,1
	60-64 ans	3,2	4,7	2,0	4,3	2,7	5,1	1,5
	65-69 ans	3,8	5,0	2,7	5,2	2,2	4,8	2,9
	70-74 ans	4,0	5,6	2,5	4,1	3,1	6,5	2,2
	50-74 ans	3,0	4,3	1,9	3,7	2,0	5,0	1,8
	50-74 ans **	3,0	4,2	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,9	1,1	1,7	1,2	2,8	1,1
	55-59 ans	1,9	3,2	0,7	3,4	0,6	2,9	0,9
	60-64 ans	2,2	3,5	1,1	3,0	1,4	3,9	0,9
	65-69 ans	2,7	3,7	1,8	3,8	1,4	3,6	2,1
	70-74 ans	2,5	3,8	1,4	2,9	1,9	4,4	1,2
	50-74 ans	2,1	3,1	1,2	2,7	1,2	3,6	1,2
	50-74 ans **	2,1	3,1	1,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,7
	55-59 ans	0,9	1,2	0,6	1,3	1,0	1,1	0,4
	60-64 ans	1,2	1,6	0,8	1,6	1,0	1,7	0,8
	65-69 ans	2,0	3,2	1,0	4,1	0,8	2,5	1,1
	70-74 ans	2,4	3,4	1,4	5,2	1,4	2,4	1,5
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	1,9	0,7	1,7	0,9
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)