

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	20	11	9	4	3	7	6
	65-69 ans	24	16	8	9	3	7	5
	70-74 ans	22	16	6	10	1	6	5
	50-74 ans	77	51	26	28	9	23	17
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	7	2	5	0	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	15	7	8	2	3	5	5
	65-69 ans	22	14	8	7	3	7	5
	70-74 ans	21	16	5	10	1	6	4
	50-74 ans	68	44	24	23	9	21	15
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	19	12	7	7	3	5	4
	70-74 ans	15	12	3	8	1	4	2
	50-74 ans	54	34	20	19	8	15	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	14	10	4	4	1	6	3
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	17	11	6	6	3	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	20	11	9	4	3	7	6
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	8	5	3	4	1	1	2
	70-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
	50-74 ans	15	11	4	8	1	3	3
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Pour les départements (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Vaucluse) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	20	0	25	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	25	36,4	11,1	50	0	28,6	16,7
	65-69 ans	8,3	12,5	0	22,2	0	0	0
	70-74 ans	4,5	0	16,7	0	0	0	20
	50-74 ans	11,7	13,7	7,7	17,9	0	8,7	11,8
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	20	25	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	40	66,7	0	100	0	50	0
	60-64 ans	13,3	14,3	12,5	0	33,3	20	0
	65-69 ans	13,6	14,3	12,5	0	0	28,6	20
	70-74 ans	28,6	25	40	20	0	33,3	50
	50-74 ans	20,6	22,7	16,7	17,4	11,1	28,6	20
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	80	75	100	66,7	0	100	100
	55-59 ans	60	33,3	100	0	100	50	0
	60-64 ans	86,7	85,7	87,5	100	66,7	80	100
	65-69 ans	86,4	85,7	87,5	100	100	71,4	80
	70-74 ans	71,4	75	60	80	100	66,7	50
	50-74 ans	79,4	77,3	83,3	82,6	88,9	71,4	80
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	66,7	0	50	0	100	0
	55-59 ans	66,7	100	50	0	50	100	0
	60-64 ans	30,8	33,3	28,6	50	50	25	20
	65-69 ans	26,3	16,7	42,9	14,3	33,3	20	50
	70-74 ans	26,7	33,3	0	37,5	0	25	0
	50-74 ans	31,5	32,4	30	31,6	37,5	33,3	25
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	33,3	100	50	0	0	100
	55-59 ans	33,3	0	50	0	50	0	0
	60-64 ans	53,8	50	57,1	50	50	50	60

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 ‡. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26,3	33,3	14,3	14,3	33,3	60	0
	70-74 ans	33,3	25	66,7	12,5	0	50	100
	50-74 ans	37	32,4	45	21,1	37,5	46,7	50
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	15,4	16,7	14,3	0	0	25	20
	65-69 ans	42,1	41,7	42,9	57,1	33,3	20	50
	70-74 ans	33,3	41,7	0	50	0	25	0
	50-74 ans	27,8	32,4	20	42,1	12,5	20	25
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5,3	8,3	0	14,3	0	0	0
	70-74 ans	6,7	0	33,3	0	100	0	0
	50-74 ans	3,7	2,9	5	5,3	12,5	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Pour les départements (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Vaucluse) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire