

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 79 034 | 35 882 | 43 152 | 23 000 | 26 853 | 12 882 | 16 299 |
| | 55-59 ans | 72 499 | 31 373 | 41 126 | 8 564 | 10 497 | 22 809 | 30 629 |
| | 60-64 ans | 85 590 | 37 417 | 48 173 | 9 147 | 10 739 | 28 270 | 37 434 |
| | 65-69 ans | 70 394 | 31 276 | 39 118 | 6 445 | 7 560 | 24 831 | 31 558 |
| | 70-74 ans | 57 041 | 25 381 | 31 660 | 4 599 | 5 772 | 20 782 | 25 888 |
| | 50-74 ans | 364 558 | 161 329 | 203 229 | 51 755 | 61 421 | 109 574 | 141 808 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 3 511 | 1 611 | 1 900 | 1 266 | 1 488 | 345 | 412 |
| | 55-59 ans | 3 215 | 1 499 | 1 716 | 861 | 879 | 638 | 837 |
| | 60-64 ans | 3 671 | 1 682 | 1 989 | 835 | 935 | 847 | 1 054 |
| | 65-69 ans | 3 080 | 1 325 | 1 755 | 656 | 806 | 669 | 949 |
| | 70-74 ans | 3 098 | 1 319 | 1 779 | 571 | 746 | 748 | 1 033 |
| | 50-74 ans | 16 575 | 7 436 | 9 139 | 4 189 | 4 854 | 3 247 | 4 285 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 1 631 | 771 | 860 | 523 | 576 | 248 | 284 |
| | 55-59 ans | 1 603 | 754 | 849 | 286 | 267 | 468 | 582 |
| | 60-64 ans | 2 009 | 932 | 1 077 | 314 | 299 | 618 | 778 |
| | 65-69 ans | 1 746 | 729 | 1 017 | 240 | 300 | 489 | 717 |
| | 70-74 ans | 1 785 | 762 | 1 023 | 200 | 264 | 562 | 759 |
| | 50-74 ans | 8 774 | 3 948 | 4 826 | 1 563 | 1 706 | 2 385 | 3 120 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 1 880 | 840 | 1 040 | 743 | 912 | 97 | 128 |
| | 55-59 ans | 1 612 | 745 | 867 | 575 | 612 | 170 | 255 |
| | 60-64 ans | 1 662 | 750 | 912 | 521 | 636 | 229 | 276 |
| | 65-69 ans | 1 334 | 596 | 738 | 416 | 506 | 180 | 232 |
| | 70-74 ans | 1 313 | 557 | 756 | 371 | 482 | 186 | 274 |
| | 50-74 ans | 7 801 | 3 488 | 4 313 | 2 626 | 3 148 | 862 | 1 165 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 77 154 | 35 042 | 42 112 | 22 257 | 25 941 | 12 785 | 16 171 |
| | 55-59 ans | 70 887 | 30 628 | 40 259 | 7 989 | 9 885 | 22 639 | 30 374 |
| | 60-64 ans | 83 928 | 36 667 | 47 261 | 8 626 | 10 103 | 28 041 | 37 158 |
| | 65-69 ans | 69 060 | 30 680 | 38 380 | 6 029 | 7 054 | 24 651 | 31 326 |
| | 70-74 ans | 55 728 | 24 824 | 30 904 | 4 228 | 5 290 | 20 596 | 25 614 |
| | 50-74 ans | 356 757 | 157 841 | 198 916 | 49 129 | 58 273 | 108 712 | 140 643 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 1 560 | 775 | 785 | 522 | 509 | 253 | 276 |
| | 55-59 ans | 1 598 | 792 | 806 | 284 | 245 | 508 | 561 |
| | 60-64 ans | 2 159 | 1 030 | 1 129 | 310 | 327 | 720 | 802 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1 942 | 928 | 1 014 | 236 | 225 | 692 | 789 |
| | 70-74 ans | 1 817 | 887 | 930 | 201 | 190 | 686 | 740 |
| | 50-74 ans | 9 076 | 4 412 | 4 664 | 1 553 | 1 496 | 2 859 | 3 168 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 1 547 | 771 | 776 | 521 | 502 | 250 | 274 |
| | 55-59 ans | 1 576 | 783 | 793 | 280 | 241 | 503 | 552 |
| | 60-64 ans | 2 123 | 1 018 | 1 105 | 303 | 318 | 715 | 787 |
| | 65-69 ans | 1 913 | 916 | 997 | 233 | 221 | 683 | 776 |
| | 70-74 ans | 1 767 | 865 | 902 | 195 | 180 | 670 | 722 |
| | 50-74 ans | 8 926 | 4 353 | 4 573 | 1 532 | 1 462 | 2 821 | 3 111 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 1 345 | 664 | 681 | 436 | 428 | 228 | 253 |
| | 55-59 ans | 1 384 | 683 | 701 | 221 | 200 | 462 | 501 |
| | 60-64 ans | 1 893 | 914 | 979 | 260 | 270 | 654 | 709 |
| | 65-69 ans | 1 708 | 808 | 900 | 187 | 195 | 621 | 705 |
| | 70-74 ans | 1 566 | 767 | 799 | 163 | 152 | 604 | 647 |
| | 50-74 ans | 7 896 | 3 836 | 4 060 | 1 267 | 1 245 | 2 569 | 2 815 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 1 240 | 616 | 624 | 400 | 391 | 216 | 233 |
| | 55-59 ans | 1 257 | 628 | 629 | 198 | 180 | 430 | 449 |
| | 60-64 ans | 1 738 | 845 | 893 | 237 | 241 | 608 | 652 |
| | 65-69 ans | 1 561 | 739 | 822 | 164 | 176 | 575 | 646 |
| | 70-74 ans | 1 400 | 678 | 722 | 138 | 130 | 540 | 592 |
| | 50-74 ans | 7 196 | 3 506 | 3 690 | 1 137 | 1 118 | 2 369 | 2 572 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 50-74 ans | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 1 340 | 661 | 679 | 435 | 426 | 226 | 253 |
| | 55-59 ans | 1 379 | 682 | 697 | 220 | 199 | 462 | 498 |
| | 60-64 ans | 1 883 | 911 | 972 | 259 | 269 | 652 | 703 |
| | 65-69 ans | 1 692 | 800 | 892 | 184 | 193 | 616 | 699 |
| | 70-74 ans | 1 552 | 762 | 790 | 162 | 150 | 600 | 640 |
| | 50-74 ans | 7 846 | 3 816 | 4 030 | 1 260 | 1 237 | 2 556 | 2 793 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | 65-69 ans | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | 50-74 ans | 50 | 20 | 30 | 7 | 8 | 13 | 22 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | 65-69 ans | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 70-74 ans | 16 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| | 50-74 ans | 44 | 17 | 27 | 4 | 7 | 13 | 20 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 2,7 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 10,1 | 8,4 | 2,8 | 2,7 |
| | 60-64 ans | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 9,1 | 8,7 | 3,0 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 10,2 | 10,7 | 2,7 | 3,0 |
| | 70-74 ans | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 12,4 | 12,9 | 3,6 | 4,0 |
| | 50-74 ans | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 8,1 | 7,9 | 3,0 | 3,0 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 0,8 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 6,7 | 5,8 | 0,7 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 5,7 | 5,9 | 0,8 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 6,5 | 6,7 | 0,7 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 8,1 | 8,4 | 0,9 | 1,1 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 5,1 | 5,1 | 0,8 | 0,8 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 46,5 | 47,9 | 45,3 | 41,3 | 38,7 | 71,9 | 68,9 |
| | 55-59 ans | 49,9 | 50,3 | 49,5 | 33,2 | 30,4 | 73,4 | 69,5 |
| | 60-64 ans | 54,7 | 55,4 | 54,1 | 37,6 | 32,0 | 73,0 | 73,8 |
| | 65-69 ans | 56,7 | 55,0 | 57,9 | 36,6 | 37,2 | 73,1 | 75,6 |
| | 70-74 ans | 57,6 | 57,8 | 57,5 | 35,0 | 35,4 | 75,1 | 73,5 |
| | 50-74 ans | 52,9 | 53,1 | 52,8 | 37,3 | 35,1 | 73,5 | 72,8 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 3,6 | 2,5 | 2,2 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,6 | 3,2 | 2,6 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 4,8 | 3,6 | 3,3 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 |
| 50-74 ans ** | 2,5 | 2,7 | 2,3 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,2 | 99,5 | 98,9 | 99,8 | 98,6 | 98,8 | 99,3 |
| | 55-59 ans | 98,6 | 98,9 | 98,4 | 98,6 | 98,4 | 99,0 | 98,4 |
| | 60-64 ans | 98,3 | 98,8 | 97,9 | 97,7 | 97,2 | 99,3 | 98,1 |
| | 65-69 ans | 98,5 | 98,7 | 98,3 | 98,7 | 98,2 | 98,7 | 98,4 |
| | 70-74 ans | 97,2 | 97,5 | 97,0 | 97,0 | 94,7 | 97,7 | 97,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 98,3 | 98,7 | 98,0 | 98,6 | 97,7 | 98,7 | 98,2 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 86,9 | 86,1 | 87,8 | 83,7 | 85,3 | 91,2 | 92,3 |
| | 55-59 ans | 87,8 | 87,2 | 88,4 | 78,9 | 83,0 | 91,8 | 90,8 |
| | 60-64 ans | 89,2 | 89,8 | 88,6 | 85,8 | 84,9 | 91,5 | 90,1 |
| | 65-69 ans | 89,3 | 88,2 | 90,3 | 80,3 | 88,2 | 90,9 | 90,9 |
| | 70-74 ans | 88,6 | 88,7 | 88,6 | 83,6 | 84,4 | 90,1 | 89,6 |
| | 50-74 ans | 88,5 | 88,1 | 88,8 | 82,7 | 85,2 | 91,1 | 90,5 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 92,2 | 92,8 | 91,6 | 91,7 | 91,4 | 94,7 | 92,1 |
| | 55-59 ans | 90,8 | 91,9 | 89,7 | 89,6 | 90,0 | 93,1 | 89,6 |
| | 60-64 ans | 91,8 | 92,5 | 91,2 | 91,2 | 89,3 | 93,0 | 92,0 |
| | 65-69 ans | 91,4 | 91,5 | 91,3 | 87,7 | 90,3 | 92,6 | 91,6 |
| | 70-74 ans | 89,4 | 88,4 | 90,4 | 84,7 | 85,5 | 89,4 | 91,5 |
| | 50-74 ans | 91,1 | 91,4 | 90,9 | 89,7 | 89,8 | 92,2 | 91,4 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)