

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 436	798	638	482	372	316	266
	55-59 ans	1 405	761	644	172	131	589	513
	60-64 ans	1 789	968	821	235	174	733	647
	65-69 ans	1 324	682	642	129	113	553	529
	70-74 ans	1 251	632	619	116	99	516	520
	50-74 ans	7 205	3 841	3 364	1 134	889	2 707	2 475
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 442	800	642	483	375	317	267
	55-59 ans	1 419	769	650	173	134	596	516
	60-64 ans	1 799	975	824	238	175	737	649
	65-69 ans	1 337	686	651	129	117	557	534
	70-74 ans	1 271	638	633	118	103	520	530
	50-74 ans	7 268	3 868	3 400	1 141	904	2 727	2 496
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	710	347	363	219	222	128	141
	55-59 ans	592	263	329	54	59	209	270
	60-64 ans	732	302	430	71	80	231	350
	65-69 ans	491	188	303	39	50	149	253
	70-74 ans	480	173	307	30	55	143	252
	50-74 ans	3 005	1 273	1 732	413	466	860	1 266
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	164	92	72	48	34	44	38
	55-59 ans	156	80	76	17	12	63	64
	60-64 ans	188	98	90	23	24	75	66
	65-69 ans	122	64	58	13	10	51	48
	70-74 ans	87	39	48	4	4	35	44
	50-74 ans	717	373	344	105	84	268	260
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	17	7	10	2	8	5	2
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	12	8	4	3	0	5	4
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	50-74 ans	51	24	27	7	12	17	15
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	201	126	75	74	43	52	32
	55-59 ans	241	146	95	29	27	117	68
	60-64 ans	325	217	108	48	29	169	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	220	128	92	24	12	104	80
	70-74 ans	226	126	100	28	11	98	89
	50-74 ans	1 213	743	470	203	122	540	348
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	229	152	77	91	46	61	31
	55-59 ans	254	176	78	39	20	137	58
	60-64 ans	344	229	115	61	24	168	91
	65-69 ans	307	193	114	32	24	161	90
	70-74 ans	283	182	101	26	18	156	83
	50-74 ans	1 417	932	485	249	132	683	353
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	44	28	16	18	10	10	6
	55-59 ans	92	56	36	19	7	37	29
	60-64 ans	116	77	39	22	6	55	33
	65-69 ans	115	71	44	17	10	54	34
	70-74 ans	123	83	40	23	7	60	33
	50-74 ans	490	315	175	99	40	216	135
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	43	23	20	15	8	8	12
	55-59 ans	44	27	17	9	4	18	13
	60-64 ans	53	33	20	7	6	26	14
	65-69 ans	41	23	18	2	7	21	11
	70-74 ans	28	15	13	1	3	14	10
	50-74 ans	209	121	88	34	28	87	60
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19	17	2	9	1	8	1
	55-59 ans	15	9	6	5	1	4	5
	60-64 ans	19	9	10	2	3	7	7
	65-69 ans	19	10	9	2	0	8	9
	70-74 ans	24	12	12	4	1	8	11
	50-74 ans	96	57	39	22	6	35	33
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	8	5	3	0	1	5	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	2	6	0	3	2	3
	70-74 ans	11	3	8	0	2	3	6
	50-74 ans	34	12	22	1	9	11	13
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	430	278	152	165	89	113	63
	55-59 ans	495	322	173	68	47	254	126
	60-64 ans	669	446	223	109	53	337	170
	65-69 ans	527	321	206	56	36	265	170
	70-74 ans	509	308	201	54	29	254	172
	50-74 ans	2 630	1 675	955	452	254	1 223	701
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	229	152	77	91	46	61	31
	55-59 ans	254	176	78	39	20	137	58
	60-64 ans	344	229	115	61	24	168	91
	65-69 ans	307	193	114	32	24	161	90
	70-74 ans	283	182	101	26	18	156	83
	50-74 ans	1 417	932	485	249	132	683	353
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	188	126	62	79	37	47	25
	55-59 ans	212	148	64	36	17	112	47
	60-64 ans	291	197	94	56	19	141	75
	65-69 ans	258	163	95	30	22	133	73
	70-74 ans	234	154	80	19	14	135	66
	50-74 ans	1 183	788	395	220	109	568	286
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	44	28	16	18	10	10	6
	55-59 ans	92	56	36	19	7	37	29
	60-64 ans	116	77	39	22	6	55	33
	65-69 ans	115	71	44	17	10	54	34
	70-74 ans	123	83	40	23	7	60	33
	50-74 ans	490	315	175	99	40	216	135

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,9	99,9	99,8	100,0	99,7	99,7	100,0
	55-59 ans	99,2	99,1	99,2	99,4	98,5	99,0	99,4
	60-64 ans	99,7	99,7	99,8	99,6	99,4	99,7	99,8
	65-69 ans	99,5	99,9	99,2	100,0	97,4	99,8	99,6
	70-74 ans	98,7	99,2	98,3	99,1	97,1	99,2	98,5
	50-74 ans	99,4	99,6	99,3	99,7	98,9	99,5	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,2	43,4	56,5	45,3	59,2	40,4	52,8
	55-59 ans	41,7	34,2	50,6	31,2	44,0	35,1	52,3
	60-64 ans	40,7	31,0	52,2	29,8	45,7	31,3	53,9
	65-69 ans	36,7	27,4	46,5	30,2	42,7	26,8	47,4
	70-74 ans	37,8	27,1	48,5	25,4	53,4	27,5	47,5
	50-74 ans	41,3	32,9	50,9	36,2	51,5	31,5	50,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,4	11,5	11,2	9,9	9,1	13,9	14,2
	55-59 ans	11,0	10,4	11,7	9,8	9,0	10,6	12,4
	60-64 ans	10,5	10,1	10,9	9,7	13,7	10,2	10,2
	65-69 ans	9,1	9,3	8,9	10,1	8,5	9,2	9,0
	70-74 ans	6,8	6,1	7,6	3,4	3,9	6,7	8,3
	50-74 ans	9,9	9,6	10,1	9,2	9,3	9,8	10,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	0,9	1,6	0,4	2,1	1,6	0,7
	55-59 ans	0,6	0,5	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	1,3	0,0	0,7	0,6
	65-69 ans	0,6	0,4	0,8	0,0	0,9	0,5	0,7
	70-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,8	1,9	0,2	0,2
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,6	1,3	0,6	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	15,8	11,7	15,3	11,5	16,4	12,0
	55-59 ans	17,0	19,0	14,6	16,8	20,1	19,6	13,2
	60-64 ans	18,1	22,3	13,1	20,2	16,6	22,9	12,2
	65-69 ans	16,5	18,7	14,1	18,6	10,3	18,7	15,0
	70-74 ans	17,8	19,7	15,8	23,7	10,7	18,8	16,8
	50-74 ans	16,7	19,2	13,8	17,8	13,5	19,8	13,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,9	19,0	12,0	18,8	12,3	19,2	11,6	
	55-59 ans	17,9	22,9	12,0	22,5	14,9	23,0	11,2	
	60-64 ans	19,1	23,5	14,0	25,6	13,7	22,8	14,0	
	65-69 ans	23,0	28,1	17,5	24,8	20,5	28,9	16,9	
	70-74 ans	22,3	28,5	16,0	22,0	17,5	30,0	15,7	
	50-74 ans	19,5	24,1	14,3	21,8	14,6	25,0	14,1	
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	3,5	2,5	3,7	2,7	3,2	2,2
	55-59 ans	6,5	7,3	5,5	11,0	5,2	6,2	5,6	
	60-64 ans	6,4	7,9	4,7	9,2	3,4	7,5	5,1	
	65-69 ans	8,6	10,3	6,8	13,2	8,5	9,7	6,4	
	70-74 ans	9,7	13,0	6,3	19,5	6,8	11,5	6,2	
	50-74 ans	6,7	8,1	5,1	8,7	4,4	7,9	5,4	
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,0	2,9	3,1	3,1	2,1	2,5	4,5	
	55-59 ans	3,1	3,5	2,6	5,2	3,0	3,0	2,5	
	60-64 ans	2,9	3,4	2,4	2,9	3,4	3,5	2,2	
	65-69 ans	3,1	3,4	2,8	1,6	6,0	3,8	2,1	
	70-74 ans	2,2	2,4	2,1	0,8	2,9	2,7	1,9	
		50-74 ans	2,9	3,1	2,6	3,0	3,1	3,2	2,4
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,1	0,3	1,9	0,3	2,5	0,4
55-59 ans		1,1	1,2	0,9	2,9	0,7	0,7	1,0	
60-64 ans		1,1	0,9	1,2	0,8	1,7	0,9	1,1	
65-69 ans		1,4	1,5	1,4	1,6	0,0	1,4	1,7	
70-74 ans		1,9	1,9	1,9	3,4	1,0	1,5	2,1	
		50-74 ans	1,3	1,5	1,1	1,9	0,7	1,3	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,4
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	0,0	0,7	0,8	0,4	
	60-64 ans	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,1	0,2	
	65-69 ans	0,6	0,3	0,9	0,0	2,6	0,4	0,6	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,9	0,5	1,3	0,0	1,9	0,6	1,1
	50-74 ans	0,5	0,3	0,6	0,1	1,0	0,4	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	7,9	3,7	8,1	3,9	7,6	3,4
	55-59 ans	7,3	10,6	4,6	10,4	6,7	10,6	4,1
	60-64 ans	8,3	12,4	5,0	16,2	7,3	11,6	4,6
	65-69 ans	9,7	13,0	6,9	14,3	8,4	12,8	6,6
	70-74 ans	10,8	14,8	7,7	18,7	8,5	14,2	7,6
	50-74 ans	8,1	11,4	5,3	11,2	5,7	11,5	5,2
	50-74 ans **	8,1	11,2	5,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	4,3	1,9	4,5	2,0	4,1	1,7
	55-59 ans	3,7	5,8	2,1	6,0	2,8	5,7	1,9
	60-64 ans	4,3	6,4	2,6	9,1	3,3	5,8	2,5
	65-69 ans	5,6	7,8	3,8	8,2	5,6	7,8	3,5
	70-74 ans	6,0	8,7	3,9	9,0	5,3	8,7	3,7
	50-74 ans	4,3	6,3	2,7	6,1	3,0	6,4	2,6
	50-74 ans **	4,4	6,2	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,5	3,9	1,6	3,2	1,4
	55-59 ans	3,1	4,9	1,7	5,5	2,4	4,7	1,5
	60-64 ans	3,6	5,5	2,1	8,3	2,6	4,8	2,0
	65-69 ans	4,7	6,6	3,2	7,7	5,2	6,4	2,8
	70-74 ans	5,0	7,4	3,1	6,6	4,1	7,5	2,9
	50-74 ans	3,6	5,4	2,2	5,4	2,4	5,3	2,1
	50-74 ans **	3,7	5,3	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0,4	0,7	0,3
	55-59 ans	1,4	1,8	1,0	2,9	1,0	1,5	0,9
	60-64 ans	1,4	2,1	0,9	3,3	0,8	1,9	0,9
	65-69 ans	2,1	2,9	1,5	4,3	2,3	2,6	1,3
	70-74 ans	2,6	4,0	1,5	8,0	2,0	3,3	1,5
	50-74 ans	1,5	2,1	1,0	2,4	0,9	2,0	1,0
	50-74 ans **	1,5	2,1	1,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)