

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 683	926	757	605	454	321	303
	55-59 ans	1 787	910	877	295	225	615	652
	60-64 ans	2 260	1 131	1 129	337	295	794	834
	65-69 ans	1 888	954	934	227	183	727	751
	70-74 ans	1 578	776	802	167	136	609	666
	50-74 ans	9 196	4 697	4 499	1 631	1 293	3 066	3 206
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 716	942	774	617	463	325	311
	55-59 ans	1 811	920	891	299	230	621	661
	60-64 ans	2 296	1 143	1 153	343	302	800	851
	65-69 ans	1 921	973	948	233	188	740	760
	70-74 ans	1 631	800	831	173	147	627	684
	50-74 ans	9 375	4 778	4 597	1 665	1 330	3 113	3 267
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	938	435	503	288	294	147	209
	55-59 ans	897	378	519	117	137	261	382
	60-64 ans	1 082	429	653	123	164	306	489
	65-69 ans	851	327	524	77	104	250	420
	70-74 ans	689	262	427	58	71	204	356
	50-74 ans	4 457	1 831	2 626	663	770	1 168	1 856
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	153	88	65	58	36	30	29
	55-59 ans	150	81	69	27	12	54	57
	60-64 ans	161	80	81	21	18	59	63
	65-69 ans	129	63	66	14	9	49	57
	70-74 ans	101	45	56	7	5	38	51
	50-74 ans	694	357	337	127	80	230	257
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	12	8	4	6	4	2	0
	55-59 ans	8	3	5	2	2	1	3
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	35	20	15	10	7	10	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	209	135	74	83	43	52	31
	55-59 ans	240	143	97	44	24	99	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	336	196	140	62	31	134	109
	65-69 ans	298	176	122	44	21	132	101
	70-74 ans	274	150	124	21	19	129	105
	50-74 ans	1 357	800	557	254	138	546	419
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	233	169	64	115	39	54	25
	55-59 ans	304	197	107	71	25	126	82
	60-64 ans	427	270	157	85	39	185	118
	65-69 ans	338	230	108	51	26	179	82
	70-74 ans	314	201	113	45	17	156	96
	50-74 ans	1 616	1 067	549	367	146	700	403
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	60	38	22	25	19	13	3
	55-59 ans	102	64	38	26	14	38	24
	60-64 ans	145	102	43	30	20	72	23
	65-69 ans	174	121	53	33	13	88	40
	70-74 ans	164	101	63	32	17	69	46
	50-74 ans	645	426	219	146	83	280	136
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	17	8	9	5	8	3	1
	55-59 ans	11	5	6	1	2	4	4
	60-64 ans	13	6	7	1	3	5	4
	65-69 ans	21	5	16	0	3	5	13
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	50-74 ans	70	27	43	7	17	20	26
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	30	21	9	16	6	5	3
	55-59 ans	28	16	12	4	2	12	10
	60-64 ans	42	20	22	4	7	16	15
	65-69 ans	33	16	17	4	2	12	15
	70-74 ans	22	9	13	3	1	6	12
	50-74 ans	155	82	73	31	18	51	55
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	20	11	9	9	6	2	3
	55-59 ans	22	9	13	2	5	7	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	8	16	6	6	2	10
	65-69 ans	12	5	7	2	2	3	5
	70-74 ans	31	13	18	2	10	11	8
	50-74 ans	109	46	63	21	29	25	34
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	447	309	138	202	82	107	56
	55-59 ans	548	342	206	115	50	227	156
	60-64 ans	768	469	299	148	70	321	229
	65-69 ans	646	410	236	97	47	313	189
	70-74 ans	592	352	240	66	37	286	203
	50-74 ans	3 001	1 882	1 119	628	286	1 254	833
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	233	169	64	115	39	54	25
	55-59 ans	304	197	107	71	25	126	82
	60-64 ans	427	270	157	85	39	185	118
	65-69 ans	338	230	108	51	26	179	82
	70-74 ans	314	201	113	45	17	156	96
	50-74 ans	1 616	1 067	549	367	146	700	403
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	164	113	51	74	31	39	20
	55-59 ans	200	134	66	49	16	85	50
	60-64 ans	283	192	91	64	24	128	67
	65-69 ans	219	156	63	41	20	115	43
	70-74 ans	200	123	77	31	15	92	62
	50-74 ans	1 066	718	348	259	106	459	242
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	61	39	22	26	19	13	3
	55-59 ans	102	64	38	26	14	38	24
	60-64 ans	145	102	43	30	20	72	23
	65-69 ans	174	121	53	33	13	88	40
	70-74 ans	164	101	63	32	17	69	46
	50-74 ans	646	427	219	147	83	280	136

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,6	98,6	98,2	98,5	99,4	98,7
	55-59 ans	98,8	99,1	98,5	98,7	98,3	99,4	98,6
	60-64 ans	99,0	99,4	98,6	98,5	98,0	99,7	98,8
	65-69 ans	98,9	98,7	99,2	98,7	98,9	98,6	99,2
	70-74 ans	98,1	98,1	98,0	97,7	93,8	98,2	99,0
	50-74 ans	98,7	98,8	98,6	98,4	97,9	99,1	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,7	46,2	65,0	46,7	63,5	45,2	67,2
	55-59 ans	49,5	41,1	58,2	39,1	59,6	42,0	57,8
	60-64 ans	47,1	37,5	56,6	35,9	54,3	38,3	57,5
	65-69 ans	44,3	33,6	55,3	33,0	55,3	33,8	55,3
	70-74 ans	42,2	32,8	51,4	33,5	48,3	32,5	52,0
	50-74 ans	47,5	38,3	57,1	39,8	57,9	37,5	56,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,9	9,3	8,4	9,4	7,8	9,2	9,3
	55-59 ans	8,3	8,8	7,7	9,0	5,2	8,7	8,6
	60-64 ans	7,0	7,0	7,0	6,1	6,0	7,4	7,4
	65-69 ans	6,7	6,5	7,0	6,0	4,8	6,6	7,5
	70-74 ans	6,2	5,6	6,7	4,0	3,4	6,1	7,5
	50-74 ans	7,4	7,5	7,3	7,6	6,0	7,4	7,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,8	0,5	1,0	0,9	0,6	0,0
	55-59 ans	0,4	0,3	0,6	0,7	0,9	0,2	0,5
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,6	0,3	0,3	0,5
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1
	50-74 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	14,3	9,6	13,5	9,3	16,0	10,0
	55-59 ans	13,3	15,5	10,9	14,7	10,4	15,9	11,0
	60-64 ans	14,6	17,1	12,1	18,1	10,3	16,8	12,8
	65-69 ans	15,5	18,1	12,9	18,9	11,2	17,8	13,3
	70-74 ans	16,8	18,8	14,9	12,1	12,9	20,6	15,4
	50-74 ans	14,5	16,7	12,1	15,3	10,4	17,5	12,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13,6	17,9	8,3	18,6	8,4	16,6	8,0
	55-59 ans	16,8	21,4	12,0	23,7	10,9	20,3	12,4
	60-64 ans	18,6	23,6	13,6	24,8	12,9	23,1	13,9
	65-69 ans	17,6	23,6	11,4	21,9	13,8	24,2	10,8
	70-74 ans	19,3	25,1	13,6	26,0	11,6	24,9	14,0
	50-74 ans	17,2	22,3	11,9	22,0	11,0	22,5	12,3
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,0	2,8	4,1	4,1	4,0
55-59 ans		5,6	7,0	4,3	8,7	6,1	6,1	3,6
60-64 ans		6,3	8,9	3,7	8,7	6,6	9,0	2,7
65-69 ans		9,1	12,4	5,6	14,2	6,9	11,9	5,3
70-74 ans		10,1	12,6	7,6	18,5	11,6	11,0	6,7
50-74 ans		6,9	8,9	4,8	8,8	6,2	9,0	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	1,0	0,8	1,2	0,8	1,7	0,9
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	0,3	0,9	0,6	0,6
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	0,3	1,0	0,6	0,5
	65-69 ans	1,1	0,5	1,7	0,0	1,6	0,7	1,7
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,7	0,5	0,6
	50-74 ans	0,7	0,6	0,9	0,4	1,3	0,6	0,8
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	2,2	1,2	2,6	1,3	1,5
55-59 ans		1,5	1,7	1,3	1,3	0,9	1,9	1,5
60-64 ans		1,8	1,7	1,9	1,2	2,3	2,0	1,8
65-69 ans		1,7	1,6	1,8	1,7	1,1	1,6	2,0
70-74 ans		1,3	1,1	1,6	1,7	0,7	1,0	1,8
50-74 ans		1,7	1,7	1,6	1,9	1,4	1,6	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,5	1,3	0,6
	55-59 ans	1,2	1,0	1,5	0,7	2,2	1,1	1,2
	60-64 ans	1,0	0,7	1,4	1,7	2,0	0,3	1,2
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0,9	1,1	0,4	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subéquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	1,9	1,6	2,2	1,2	6,8	1,8	1,2	
	50-74 ans	1,2	1,0	1,4	1,3	2,2	0,8	1,0	
	50-54 ans	4,1	6,0	2,4	6,0	2,2	6,1	2,5	
	55-59 ans	5,4	7,6	3,6	8,8	3,3	7,1	3,7	
	60-64 ans	6,7	9,1	4,7	11,0	4,8	8,4	4,7	
	65-69 ans	7,5	10,4	5,1	12,0	5,2	10,0	5,0	
	70-74 ans	8,4	11,1	6,2	11,4	5,5	11,1	6,4	
	50-74 ans	6,2	8,6	4,2	8,5	3,5	8,7	4,6	
	50-74 ans **	6,2	8,4	4,2	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,3	1,1	3,4	1,1	3,1	1,1	
	55-59 ans	3,0	4,4	1,9	5,4	1,7	4,0	2,0	
	60-64 ans	3,7	5,2	2,5	6,3	2,7	4,9	2,4	
	65-69 ans	3,9	5,9	2,3	6,3	2,9	5,7	2,2	
	70-74 ans	4,5	6,4	2,9	7,8	2,5	6,0	3,0	
	50-74 ans	3,3	4,9	2,1	5,0	1,8	4,9	2,2	
		50-74 ans **	3,4	4,8	2,0
	D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,2	0,9	2,2	0,8	2,2	0,9
55-59 ans		2,0	3,0	1,2	3,8	1,1	2,7	1,2	
60-64 ans		2,5	3,7	1,4	4,7	1,6	3,4	1,4	
65-69 ans		2,5	4,0	1,3	5,1	2,2	3,7	1,1	
70-74 ans		2,9	3,9	2,0	5,4	2,2	3,6	1,9	
50-74 ans		2,2	3,3	1,3	3,5	1,3	3,2	1,3	
		50-74 ans **	2,2	3,2	1,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,8	0,5	0,7	0,1
	55-59 ans	1,0	1,4	0,7	2,0	0,9	1,2	0,6	
	60-64 ans	1,3	2,0	0,7	2,2	1,4	1,9	0,5	
	65-69 ans	2,0	3,1	1,1	4,1	1,4	2,8	1,1	
	70-74 ans	2,3	3,2	1,6	5,5	2,5	2,7	1,4	
	50-74 ans	1,3	2,0	0,8	2,0	1,0	1,9	0,7	
		50-74 ans **	1,3	1,9	0,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)