

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 8135 | 3690 | 4445 | 2309 | 2621 | 1381 | 1824 |
| | 55-59 ans | 7577 | 3367 | 4210 | 963 | 967 | 2404 | 3243 |
| | 60-64 ans | 8555 | 3900 | 4655 | 985 | 1042 | 2915 | 3613 |
| | 65-69 ans | 6431 | 3003 | 3428 | 638 | 623 | 2365 | 2805 |
| | 70-74 ans | 5591 | 2562 | 3029 | 457 | 525 | 2105 | 2504 |
| | 50-74 ans | 36289 | 16522 | 19767 | 5352 | 5778 | 11170 | 13989 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 552 | 259 | 293 | 169 | 198 | 90 | 95 |
| | 55-59 ans | 467 | 208 | 259 | 72 | 70 | 136 | 189 |
| | 60-64 ans | 579 | 250 | 329 | 77 | 87 | 173 | 242 |
| | 65-69 ans | 458 | 213 | 245 | 63 | 65 | 150 | 180 |
| | 70-74 ans | 486 | 200 | 286 | 54 | 61 | 146 | 225 |
| | 50-74 ans | 2542 | 1130 | 1412 | 435 | 481 | 695 | 931 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 414 | 199 | 215 | 117 | 135 | 82 | 80 |
| | 55-59 ans | 380 | 168 | 212 | 52 | 57 | 116 | 155 |
| | 60-64 ans | 478 | 208 | 270 | 55 | 65 | 153 | 205 |
| | 65-69 ans | 380 | 182 | 198 | 49 | 42 | 133 | 156 |
| | 70-74 ans | 405 | 163 | 242 | 39 | 46 | 124 | 196 |
| | 50-74 ans | 2057 | 920 | 1137 | 312 | 345 | 608 | 792 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 138 | 60 | 78 | 52 | 63 | 8 | 15 |
| | 55-59 ans | 87 | 40 | 47 | 20 | 13 | 20 | 34 |
| | 60-64 ans | 101 | 42 | 59 | 22 | 22 | 20 | 37 |
| | 65-69 ans | 78 | 31 | 47 | 14 | 23 | 17 | 24 |
| | 70-74 ans | 81 | 37 | 44 | 15 | 15 | 22 | 29 |
| | 50-74 ans | 485 | 210 | 275 | 123 | 136 | 87 | 139 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 7997 | 3630 | 4367 | 2257 | 2558 | 1373 | 1809 |
| | 55-59 ans | 7490 | 3327 | 4163 | 943 | 954 | 2384 | 3209 |
| | 60-64 ans | 8454 | 3858 | 4596 | 963 | 1020 | 2895 | 3576 |
| | 65-69 ans | 6353 | 2972 | 3381 | 624 | 600 | 2348 | 2781 |
| | 70-74 ans | 5510 | 2525 | 2985 | 442 | 510 | 2083 | 2475 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 35804 | 16312 | 19492 | 5229 | 5642 | 11083 | 13850 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 189 | 102 | 87 | 68 | 56 | 34 | 31 |
| | 55-59 ans | 213 | 112 | 101 | 35 | 27 | 77 | 74 |
| | 60-64 ans | 235 | 124 | 111 | 36 | 32 | 88 | 79 |
| | 65-69 ans | 205 | 109 | 96 | 33 | 21 | 76 | 75 |
| | 70-74 ans | 181 | 90 | 91 | 24 | 20 | 66 | 71 |
| | 50-74 ans | 1023 | 537 | 486 | 196 | 156 | 341 | 330 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 189 | 102 | 87 | 68 | 56 | 34 | 31 |
| | 55-59 ans | 213 | 112 | 101 | 35 | 27 | 77 | 74 |
| | 60-64 ans | 235 | 124 | 111 | 36 | 32 | 88 | 79 |
| | 65-69 ans | 205 | 109 | 96 | 33 | 21 | 76 | 75 |
| | 70-74 ans | 181 | 90 | 91 | 24 | 20 | 66 | 71 |
| | 50-74 ans | 1023 | 537 | 486 | 196 | 156 | 341 | 330 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 175 | 95 | 80 | 62 | 50 | 33 | 30 |
| | 55-59 ans | 204 | 108 | 96 | 32 | 26 | 76 | 70 |
| | 60-64 ans | 220 | 113 | 107 | 32 | 32 | 81 | 75 |
| | 65-69 ans | 187 | 99 | 88 | 30 | 19 | 69 | 69 |
| | 70-74 ans | 166 | 83 | 83 | 20 | 18 | 63 | 65 |
| | 50-74 ans | 952 | 498 | 454 | 176 | 145 | 322 | 309 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 174 | 95 | 79 | 62 | 50 | 33 | 29 |
| | 55-59 ans | 204 | 108 | 96 | 32 | 26 | 76 | 70 |
| | 60-64 ans | 219 | 112 | 107 | 32 | 32 | 80 | 75 |
| | 65-69 ans | 184 | 96 | 88 | 29 | 19 | 67 | 69 |
| | 70-74 ans | 165 | 82 | 83 | 20 | 18 | 62 | 65 |
| | 50-74 ans | 946 | 493 | 453 | 175 | 145 | 318 | 308 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 175 | 95 | 80 | 62 | 50 | 33 | 30 |
| | 55-59 ans | 204 | 108 | 96 | 32 | 26 | 76 | 70 |
| | 60-64 ans | 220 | 113 | 107 | 32 | 32 | 81 | 75 |
| | 65-69 ans | 184 | 96 | 88 | 29 | 19 | 67 | 69 |
| | 70-74 ans | 165 | 82 | 83 | 20 | 18 | 62 | 65 |
| | 50-74 ans | 948 | 494 | 454 | 175 | 145 | 319 | 309 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 175 | 95 | 80 | 62 | 50 | 33 | 30 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 204 | 108 | 96 | 32 | 26 | 76 | 70 |
| | 60-64 ans | 220 | 113 | 107 | 32 | 32 | 81 | 75 |
| | 65-69 ans | 185 | 97 | 88 | 29 | 19 | 68 | 69 |
| | 70-74 ans | 166 | 83 | 83 | 20 | 18 | 63 | 65 |
| | 50-74 ans | 950 | 496 | 454 | 175 | 145 | 321 | 309 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 175 | 95 | 80 | 62 | 50 | 33 | 30 |
| | 55-59 ans | 204 | 108 | 96 | 32 | 26 | 76 | 70 |
| | 60-64 ans | 220 | 113 | 107 | 32 | 32 | 81 | 75 |
| | 65-69 ans | 189 | 101 | 88 | 31 | 19 | 70 | 69 |
| | 70-74 ans | 166 | 83 | 83 | 20 | 18 | 63 | 65 |
| | 50-74 ans | 954 | 500 | 454 | 177 | 145 | 323 | 309 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 92 | 42 | 50 | 26 | 27 | 16 | 23 |
| | 55-59 ans | 92 | 40 | 52 | 13 | 13 | 27 | 39 |
| | 60-64 ans | 116 | 46 | 70 | 12 | 21 | 34 | 49 |
| | 65-69 ans | 79 | 36 | 43 | 12 | 10 | 24 | 33 |
| | 70-74 ans | 71 | 28 | 43 | 6 | 12 | 22 | 31 |
| | 50-74 ans | 450 | 192 | 258 | 69 | 83 | 123 | 175 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 19 | 13 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| | 55-59 ans | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| | 60-64 ans | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| | 65-69 ans | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| | 70-74 ans | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| | 50-74 ans | 71 | 42 | 29 | 18 | 9 | 24 | 20 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 20 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 28 | 14 | 14 | 2 | 5 | 12 | 9 |
| | 60-64 ans | 25 | 16 | 9 | 5 | 3 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 22 | 9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| | 70-74 ans | 17 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| | 50-74 ans | 112 | 61 | 51 | 19 | 16 | 42 | 35 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 31 | 21 | 10 | 15 | 8 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 43 | 29 | 14 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| | 60-64 ans | 40 | 24 | 16 | 7 | 5 | 17 | 11 |
| | 65-69 ans | 56 | 34 | 22 | 8 | 4 | 26 | 18 |
| | 70-74 ans | 44 | 33 | 11 | 6 | 1 | 27 | 10 |
| | 50-74 ans | 214 | 141 | 73 | 44 | 23 | 97 | 50 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 70 | 47 | 23 | 19 | 6 | 28 | 17 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 22 | 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 51 | 35 | 16 | 23 | 12 | 12 | 4 |
| | 55-59 ans | 71 | 43 | 28 | 10 | 10 | 33 | 18 |
| | 60-64 ans | 65 | 40 | 25 | 12 | 8 | 28 | 17 |
| | 65-69 ans | 78 | 43 | 35 | 9 | 6 | 34 | 29 |
| | 70-74 ans | 61 | 41 | 20 | 9 | 3 | 32 | 17 |
| | 50-74 ans | 326 | 202 | 124 | 63 | 39 | 139 | 85 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 31 | 21 | 10 | 15 | 8 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 43 | 29 | 14 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| | 60-64 ans | 40 | 24 | 16 | 7 | 5 | 17 | 11 |
| | 65-69 ans | 56 | 34 | 22 | 8 | 4 | 26 | 18 |
| | 70-74 ans | 44 | 33 | 11 | 6 | 1 | 27 | 10 |
| | 50-74 ans | 214 | 141 | 73 | 44 | 23 | 97 | 50 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 27 | 18 | 9 | 13 | 7 | 5 | 2 |
| | 55-59 ans | 38 | 25 | 13 | 7 | 5 | 18 | 8 |
| | 60-64 ans | 28 | 17 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 51 | 30 | 21 | 7 | 4 | 23 | 17 |
| | 70-74 ans | 39 | 31 | 8 | 5 | 1 | 26 | 7 |
| | 50-74 ans | 183 | 121 | 62 | 37 | 21 | 84 | 41 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 70 | 47 | 23 | 19 | 6 | 28 | 17 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 70 | 47 | 23 | 19 | 6 | 28 | 17 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 19 | 13 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| | 65-69 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 65 | 44 | 21 | 18 | 6 | 26 | 15 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| | 60-64 ans | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| | 50-74 ans | 44 | 31 | 13 | 11 | 2 | 20 | 11 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 21 | 13 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 15 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| | 65-69 ans | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | 70-74 ans | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| | 50-74 ans | 69 | 47 | 22 | 19 | 6 | 28 | 16 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 50-74 ans | 45 | 23 | 22 | 13 | 8 | 10 | 14 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,8 | 7 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 6,5 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,5 | 7,2 | 5,7 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 6,8 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 5,9 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,9 | 10,4 | 6,3 | 6,4 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 7,8 | 9,4 | 11,8 | 11,6 | 6,9 | 9 |
| | 50-74 ans | 7 | 6,8 | 7,1 | 8,1 | 8,3 | 6,2 | 6,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 0,6 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 0,7 | 1 |
| | 65-69 ans | 1,2 | 1 | 1,4 | 2,2 | 3,7 | 0,7 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 3,3 | 2,9 | 1 | 1,2 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 0,8 | 1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 75 | 76,8 | 73,4 | 69,2 | 68,2 | 91,1 | 84,2 |
| | 55-59 ans | 81,4 | 80,8 | 81,9 | 72,2 | 81,4 | 85,3 | 82 |
| | 60-64 ans | 82,6 | 83,2 | 82,1 | 71,4 | 74,7 | 88,4 | 84,7 |
| | 65-69 ans | 83 | 85,4 | 80,8 | 77,8 | 64,6 | 88,7 | 86,7 |
| | 70-74 ans | 83,3 | 81,5 | 84,6 | 72,2 | 75,4 | 84,9 | 87,1 |
| | 50-74 ans | 80,9 | 81,4 | 80,5 | 71,7 | 71,7 | 87,5 | 85,1 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,4 | 2,8 | 2 | 3 | 2,2 | 2,5 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 3 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 3,7 | 2,8 | 5,3 | 3,5 | 3,2 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,6 | 3 | 5,4 | 3,9 | 3,2 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | 2,4 |
| 50-74 ans ** | 2,9 | 3,3 | 2,5 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 92,6 | 93,1 | 92 | 91,2 | 89,3 | 97,1 | 96,8 |
| | 55-59 ans | 95,8 | 96,4 | 95 | 91,4 | 96,3 | 98,7 | 94,6 |
| | 60-64 ans | 93,6 | 91,1 | 96,4 | 88,9 | 100 | 92 | 94,9 |
| | 65-69 ans | 91,2 | 90,8 | 91,7 | 90,9 | 90,5 | 90,8 | 92 |
| | 70-74 ans | 91,7 | 92,2 | 91,2 | 83,3 | 90 | 95,5 | 91,5 |
| | 50-74 ans | 93,1 | 92,7 | 93,4 | 89,8 | 92,9 | 94,4 | 93,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 99,4 | 100 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 96,7 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,5 | 99,1 | 100 | 100 | 100 | 98,8 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,4 | 97 | 100 | 96,7 | 100 | 97,1 | 100 |
| | 70-74 ans | 99,4 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 98,4 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99 | 99,8 | 99,4 | 100 | 98,8 | 99,7 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 85 | 99 | 68 | 103 | 65 | 91 | 72 |
| | 55-59 ans | 80 | 85 | 73 | 104 | 68 | 77 | 75 |
| | 60-64 ans | 82 | 91 | 72 | 117 | 81 | 80 | 69 |
| | 65-69 ans | 78 | 83 | 71 | 72 | 65 | 88 | 73 |
| | 70-74 ans | 81 | 93 | 69 | 71 | 63 | 100 | 71 |
| | 50-74 ans | 81 | 90 | 71 | 97 | 69 | 86 | 72 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 62 (46-84) | 65 (48-91) | 56.5 (43-75.5) | 66 (48-95) | 54 (40-76) | 65 (50-84) | 57.5 (46-74) |
| | 55-59 ans | 62.5 (46-83) | 64 (44-85.5) | 60.5 (47.5-77.5) | 60.5 (41-93) | 56.5 (47-76) | 66.5 (46-85.5) | 62.5 (49-78) |
| | 60-64 ans | 59.5 (44.5-80.5) | 59 (45-81) | 61 (44-80) | 61.5 (47.5-111.5) | 67 (44-102) | 59 (44-78) | 59 (44-75) |
| | 65-69 ans | 63 (46-83) | 63 (45-83) | 61 (46-82.5) | 56 (45-78) | 60 (41-81) | 66 (46-83) | 62 (48-83) |
| | 70-74 ans | 58.5 (44-83) | 60 (42-85) | 56 (45-77) | 64 (37.5-80.5) | 55.5 (44-70) | 58 (44-86) | 59 (50-77) |
| | 50-74 ans | 61 (45-83) | 62 (45-85) | 59 (46-80) | 62 (45.5-91) | 58 (43-79) | 62 (45-84) | 59 (47-80) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 3,7 | 2 | 5,7 | 2,9 | 7,1 | 0 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 3,6 | 4 | 8,6 | 3,7 | 1,3 | 4,1 |
| | 60-64 ans | 4,3 | 6,5 | 1,8 | 11,1 | 0 | 4,5 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 6,1 | 9,5 | 3,9 | 4 |
| | 70-74 ans | 5,5 | 4,4 | 6,6 | 8,3 | 5 | 3 | 7 |
| | 50-74 ans | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 6,6 | 5,1 | 2,9 | 4,2 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 98,9 | 98 | 100 | 96,7 | 100 | 98,6 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,6 | 100 | 99,4 | 100 | 99,7 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 52,6 | 44,2 | 62,5 | 41,9 | 54 | 48,5 | 76,7 |
| | 55-59 ans | 45,1 | 37 | 54,2 | 40,6 | 50 | 35,5 | 55,7 |
| | 60-64 ans | 52,7 | 40,7 | 65,4 | 37,5 | 65,6 | 42 | 65,3 |
| | 65-69 ans | 41,8 | 35,6 | 48,9 | 38,7 | 52,6 | 34,3 | 47,8 |
| | 70-74 ans | 42,8 | 33,7 | 51,8 | 30 | 66,7 | 34,9 | 47,7 |
| | 50-74 ans | 47,2 | 38,4 | 56,8 | 39 | 57,2 | 38,1 | 56,6 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 10,9 | 13,7 | 7,5 | 14,5 | 10 | 12,1 | 3,3 |
| | 55-59 ans | 8,8 | 10,2 | 7,3 | 9,4 | 3,8 | 10,5 | 8,6 |
| | 60-64 ans | 4,1 | 6,2 | 1,9 | 6,3 | 3,1 | 6,2 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 6,9 | 9,9 | 3,4 | 12,9 | 5,3 | 8,6 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 7,2 | 1,2 | 13,3 | 0 | 5,6 | 1,6 | 15,4 |
| | 50-74 ans | 7,4 | 8,4 | 6,4 | 10,2 | 6,2 | 7,4 | 6,5 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 1,3 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 0,6 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0,9 | 1 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,4 | 14,7 | 7,5 | 12,9 | 8 | 18,2 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 13,7 | 13 | 14,6 | 6,3 | 19,2 | 15,8 | 12,9 |
| | 60-64 ans | 11,4 | 14,2 | 8,4 | 15,6 | 9,4 | 13,6 | 8 |
| | 65-69 ans | 11,6 | 8,9 | 14,8 | 3,2 | 10,5 | 11,4 | 15,9 |
| | 70-74 ans | 10,2 | 9,6 | 10,8 | 15 | 11,1 | 7,9 | 10,8 |
| | 50-74 ans | 11,7 | 12,2 | 11,2 | 10,7 | 11 | 13 | 11,3 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 17,7 | 22,1 | 12,5 | 24,2 | 16 | 18,2 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 21,1 | 26,9 | 14,6 | 25 | 19,2 | 27,6 | 12,9 |
| | 60-64 ans | 18,2 | 21,2 | 15 | 21,9 | 15,6 | 21 | 14,7 |
| | 65-69 ans | 29,6 | 33,7 | 25 | 25,8 | 21,1 | 37,1 | 26,1 |
| | 70-74 ans | 26,5 | 39,8 | 13,3 | 30 | 5,6 | 42,9 | 15,4 |
| | 50-74 ans | 22,4 | 28,2 | 16,1 | 24,9 | 15,9 | 30 | 16,2 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 7,4 | 10,2 | 4,2 | 12,5 | 3,8 | 9,2 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 13,3 | 5,6 | 12,5 | 0 | 13,6 | 8 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 6,9 | 3,4 | 12,9 | 5,3 | 4,3 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 11,4 | 13,3 | 9,6 | 25 | 11,1 | 9,5 | 9,2 |
| | 50-74 ans | 7,3 | 9,4 | 5,1 | 10,7 | 4,1 | 8,7 | 5,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2,3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 2 | 0,9 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 0 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 1,8 | 3,7 | 3,1 | 6,3 | 1,2 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 3 | 3,4 | 3,2 | 5,3 | 2,9 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 1,2 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 1,7 | 4,1 | 1,5 | 2,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0,9 | 1 | 3,1 | 0 | 0 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,9 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 1 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 1 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 0 | 0,3 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 9,6 | 3,7 | 10,2 | 4,7 | 8,7 | 2,2 |
| | 55-59 ans | 9,5 | 12,9 | 6,7 | 10,6 | 10,5 | 13,8 | 5,6 |
| | 60-64 ans | 7,7 | 10,4 | 5,4 | 12,5 | 7,8 | 9,7 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 12,3 | 14,5 | 10,4 | 14,4 | 10 | 14,5 | 10,4 |
| | 70-74 ans | 11,1 | 16,2 | 6,7 | 20,4 | 5,9 | 15,4 | 6,9 |
| | 50-74 ans | 9,1 | 12,4 | 6,4 | 12 | 6,9 | 12,5 | 6,1 |
| | 50-74 ans ** | 9,1 | 12,2 | 6,3 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,9 | 5,8 | 2,3 | 6,6 | 3,1 | 4,4 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 8,7 | 3,4 | 8,5 | 5,2 | 8,8 | 2,8 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 6,2 | 3,5 | 7,3 | 4,9 | 5,9 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 8,8 | 11,4 | 6,5 | 12,8 | 6,7 | 11,1 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 8 | 13,1 | 3,7 | 13,6 | 2 | 13 | 4 |
| | 50-74 ans | 6 | 8,6 | 3,7 | 8,4 | 4,1 | 8,8 | 3,6 |
| | 50-74 ans ** | 5,9 | 8,4 | 3,7 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,4 | 5 | 2,1 | 5,8 | 2,7 | 3,6 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 7,5 | 3,1 | 7,4 | 5,2 | 7,6 | 2,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 3,3 | 4,4 | 2,4 | 5,2 | 3,9 | 4,1 | 2 |
| | 65-69 ans | 8 | 10,1 | 6,2 | 11,2 | 6,7 | 9,8 | 6,1 |
| | 70-74 ans | 7,1 | 12,3 | 2,7 | 11,3 | 2 | 12,5 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 5,1 | 7,4 | 3,2 | 7,1 | 3,7 | 7,6 | 3 |
| | 50-74 ans ** | 5,1 | 7,2 | 3,1 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 3,3 | 1 | 4,2 | 1 | 2,9 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 3,9 | 1,3 | 4,2 | 0 | 3,8 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 2,4 | 0,9 | 6,4 | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 4,4 | 2,7 | 11,3 | 3,9 | 2,9 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 2 | 2,9 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 2,5 | 1,2 |
| | 50-74 ans ** | 1,9 | 2,8 | 1,2 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 0 |
| | 65-69 ans | 10 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 70-74 ans | 10,5 | 9,1 | 12,5 | 20 | 0 | 0 | 16,7 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 6,4 | 8,7 | 5,3 | 0 | 7,1 | 11,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009