Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages Subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel									
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5302	2428	2874	1750	1949	678	925	
	55-59 ans	5452	2467	2985	1309	1359	1158	1626	
	60-64 ans	6414	2904	3510	1216	1214	1688	2296	
	65-69 ans	4509	2109	2400	751	847	1358	1553	
	70-74 ans	4239	1897	2342	708	852	1189	1490	
	50-74 ans	25916	11805	14111	5734	6221	6071	7890	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable									
(NA)	50-54 ans	175	76	99	57	80	19	19	
	55-59 ans	219	97	122	57	67	40	55	
	60-64 ans	286	130	156	66	68	64	88	
	65-69 ans	192	93	99	39	45	54	54	
	70-74 ans	202	94	108	44	48	50	60	
	50-74 ans	1074	490	584	263	308	227	276	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un									
test NA	50-54 ans	126	58	68	41	55	17	13	
	55-59 ans	176	74	102	40	55	34	47	
	60-64 ans	233	104	129	48	52	56	77	
	65-69 ans	152	71	81	22	30	49	51	
	70-74 ans	160	75	85	30	35	45	50	
	50-74 ans	847	382	465	181	227	201	238	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	49	18	31	16	25	2	6	
. ,	55-59 ans	43	23	20	17	12	6	8	
	60-64 ans	53	26	27	18	16	8	11	
	65-69 ans	40	22	18	17	15	5	3	
	70-74 ans	42	19	23	14	13	5	10	
	50-74 ans	227	108	119	82	81	26	38	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5253	2410	2843	1734	1924	676	919	
	55-59 ans	5409	2444	2965	1292	1347	1152	1618	
	60-64 ans	6361	2878	3483	1198	1198	1680	2285	
	65-69 ans	4469	2087	2382	734	832	1353	1550	
	70-74 ans	4197	1878	2319	694	839	1184	1480	
	50-74 ans	25689	11697	13992	5652	6140	6045	7852	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	137	69	68	55	42	14	26	

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ges Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	134	72	62	44	27	28	35	
	60-64 ans	188	104	84	51	22	53	62	
	65-69 ans	133	66	67	28	27	38	40	
	70-74 ans	170	88	82	33	25	55	57	
	50-74 ans	762	399	363	211	143	188	220	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la									
coloscopie	50-54 ans	136	68	68	54	42	14	26	
	55-59 ans	134	72	62	44	27	28	35	
	60-64 ans	185	102	83	49	22	53	61	
	65-69 ans	132	65	67	28	27	37	40	
	70-74 ans	167	86	81	32	24	54	57	
	50-74 ans	754	393	361	207	142	186	219	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	118	58	60	47	35	11	25	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55-59 ans	118	61	57	38	26	23	31	
	60-64 ans	170	95	75	43	19	52	56	
	65-69 ans	120	64	56	27	24	37	32	
	70-74 ans	151	79	72	29	18	50	54	
	50-74 ans	677	357	320	184	122	173	198	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	95	49	46	38	24	11	22	
	55-59 ans	95	49	46	28	20	21	26	
	60-64 ans	137	74	63	32	15	42	48	
	65-69 ans	91	47	44	20	19	27	25	
	70-74 ans	123	64	59	23	16	41	43	
	50-74 ans	541	283	258	141	94	142	164	
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
and complication (not a randomissio, a rotal goneral of a rondocopio)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné	_							
une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus								
de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas								
d'autres examens)	50-54 ans	117	57	60	46	35	11	25
	55-59 ans	117	61	56	38	26	23	30
	60-64 ans	166	93	73	42	18	51	55
	65-69 ans	119	64	55	27	24	37	31
	70-74 ans	149	77	72	29	18	48	54
	50-74 ans	668	352	316	182	121	170	195
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre								
exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre								
que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	3	1	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	113	57	56	46	31	11	25
	55-59 ans	117	60	57	37	26	23	31
	60-64 ans	167	92	75	41	19	51	56
	65-69 ans	115	61	54	24	24	37	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	146	76	70	27	18	49	52
	50-74 ans	658	346	312	175	118	171	194
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	119	59	60	48	35	11	25
	55-59 ans	118	61	57	38	26	23	31
	60-64 ans	171	96	75	44	19	52	56
	65-69 ans	122	65	57	27	25	38	32
	70-74 ans	153	81	72	30	18	51	54
	50-74 ans	683	362	321	187	123	175	198
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	33	40	25	21	8	19
	55-59 ans	66	31	35	18	16	13	19
	60-64 ans	87	46	41	21	6	25	35
	65-69 ans	59	25	34	11	11	14	23
	70-74 ans	68	30	38	9	8	21	30
	50-74 ans	353	165	188	84	62	81	126
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	11	6	5	2	2	4	3
	60-64 ans	15	8	7	2	3	6	4
	65-69 ans	7	5	2	4	2	1	0
	70-74 ans	8	4	4	0	3	4	1
	50-74 ans	48	28	20	12	11	16	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	20	10	10	3	5	7	5
	65-69 ans	18	10	8	3	3	7	5
	70-74 ans	24	12	12	6	4	6	8
	50-74 ans	82	44	38	21	17	23	21
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	11	6	10	3	1	3
	55-59 ans	16	9	7	6	3	3	4
	60-64 ans	32	22	10	13	3	9	7
	65-69 ans	20	14	6	4	4	10	2
	70-74 ans	33	24	9	10	3	14	6
	50-74 ans	118	80	38	43	16	37	22
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	3	1	0	2
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	7	4	3	3	3	1	0
	70-74 ans	9	3	6	1	0	2	6
	50-74 ans	33	16	17	10	6	6	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
adenomateuse, non hyperpiasique)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	30-74 alls	U	U	U	U	U	U	U
autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie,								
résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages S	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	13	9	4	4	2	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	2	1	1	2
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	23	13	10	9	5	4	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	15	11	14	7	1	4
	55-59 ans	27	17	10	11	4	6	6
	60-64 ans	52	32	20	16	8	16	12
	65-69 ans	38	24	14	7	7	17	7
	70-74 ans	57	36	21	16	7	20	14
	50-74 ans	200	124	76	64	33	60	43
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté	50-54 ans	17	11	6	10	3	1	3
	55-59 ans	16	9	7	6	3	3	4
	60-64 ans	32	22	10	13	3	9	7
	65-69 ans	20	14	6	4	4	10	2
	70-74 ans	33	24	9	10	3	14	6
	50-74 ans	118	80	38	43	16	37	22
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	3	1	0	2
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	7	4	3	3	3	1	0
	70-74 ans	9	3	6	1	0	2	6
	50-74 ans	33	16	17	10	6	6	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade								
peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du								
rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	7	4	3	3	3	1	0
	70-74 ans	9	3	6	1	0	2	6

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistage initial Dépistages Subséq			ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	31	15	16	9	6	6	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	11	7	4	5	1	2	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	6	3	3	2	3	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	20	8	12	4	5	4	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM								
connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	11	4	7	2	2	2	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	4	5	2	3	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011			Total		Dépistage initial Dépistages Sub			ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	7	4	3	3	3	1	0
	70-74 ans	7	1	6	0	0	1	6
	50-74 ans	26	12	14	7	5	5	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	8	4	4	3	1	1	3
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	35	21	14	13	7	8	7

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	je initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,1	3,4	3,3	4,1	2,8	2,1
	55-59 ans	4	3,9	4,1	4,4	4,9	3,5	3,4
	60-64 ans	4,5	4,5	4,4	5,4	5,6	4,1 2,8 4,9 3,5	3,8
	65-69 ans		4,4	4,1	5,2	5,3		3,5
	70-74 ans		5	4,6	6,2		4,2	4
	50-74 ans	4,1	4,2	4,1	4,6			3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable					·		,	·
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,7	1,1	0,9	1.3	0.3	0,6
	55-59 ans		0,9	0,7	1,3			0,5
	60-64 ans		0,9	0,8	1,5			0,5
	65-69 ans		1	0,8	2,3			0,2
	70-74 ans		1	1	2			0,7
	50-74 ans	0,9	0,9	0,8	1,4			0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
un test NA	50-54 ans	72	76,3	68,7	71,9	68.8	89.5	68,4
	55-59 ans		76,3	83,6	70,2			85,5
	60-64 ans		80	82,7	72,7			87,5
	65-69 ans	- /-	76,3	81,8	56,4			94,4
	70-74 ans		79,8	78,7	68,2			83,3
	50-74 ans	78,9	78	79,6	68,8			86,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test	30 7 4 alis	10,5	70	7 3,0	00,0	70,7	00,0	00,2
analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,9	2,4	3,2	2.2	2.1	2,8
analysable (70)	55-59 ans	7-	2,9	2,1	3,4			2,2
	60-64 ans		3,6	2,4	4,3			2,7
	65-69 ans	-	3,2	2,8	3,8			2,6
	70-74 ans		4,7	3,5	4,8			3,9
	50-74 ans	3	3,4	2,6	3,7			2,8
	50-74 ans **	2,9	3,3	2,6	3,1	2,3	3,1	2,0
	30-74 alls	2,9	3,3	2,0	•	•	•	•
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,6	100	98,2	100	100	100
boo- Fourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant eligibles à la coloscopie	55-59 ans		100	100	100			100
	60-64 ans 65-69 ans		98,1 98,5	98,8 100	96,1 100			98,4 100
							- ,	
	70-74 ans		97,7	98,8	97			100
DOG Doursentere de nersennes quant eu une colongenie envèc un test medit / serrei les	50-74 ans	99	98,5	99,4	98,1	99,3	98,9	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,8	85,3	88,2	87	83,3	78,6	96,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011 Département : 39 - Jura Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistaç	ge initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88,1	84,7	91,9	86,4	96,3	82,1	88,6
	60-64 ans	91,9	93,1	90,4	87,8	86,4	98,1	91,8
	65-69 ans	90,9	98,5	83,6	96,4	88,9	100	80
	70-74 ans	90,4	91,9	88,9	90,6	75	92,6	94,7
	50-74 ans	89,8	90,8	88,6	88,9	85,9	93	90,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans		84,5	76,7	80,9	68,6	100	88
	55-59 ans		80,3	80,7	73,7	76,9	91,3	83,9
	60-64 ans	80,6	77,9	84	74,4	78,9	80,8	85,7
	65-69 ans	75,8	73,4	78,6	74,1	79,2	73	78,1
	70-74 ans		81	81,9	79,3	88,9		79,6
	50-74 ans		79,3	80,6	76,6	77		82,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	93	99	96	109	80	84
	55-59 ans	97	88	107	92	93	81	119
	60-64 ans	99	106	91	134	69	83	98
	65-69 ans	111	122	99	103	98	135	100
	70-74 ans	105	116	92	161	105	90	88
	50-74 ans	102	106	97	115	97	96	97
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans		11,6	4,4	10,9	7,1	14,3	0
	55-59 ans	6	8,3	3,2	6,8	0	10,7	5,7
	60-64 ans	4,3	3,8	4,8	5,9	4,5	1,9	4,8
	65-69 ans	1,5	0	3	0	3,7	0	2,5
	70-74 ans		3,4	3,7	3	8	3,6	1,8
	50-74 ans	4,6	5,3	3,9	6,2	4,9	4,3	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,8	98,3	93,3	97,9	88,6	100	100
	55-59 ans	99,2	98,4	100	97,4	100	100	100
	60-64 ans	98,2	96,8	100	95,3	100	98,1	100
	65-69 ans	95,8	95,3	96,4	88,9	100	100	93,8
	70-74 ans	96,7	96,2	97,2	93,1	100	98	96,3
	50-74 ans		96,9	97,5	95,1	96,7	98,8	98
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)					·			70
dont le résultat est normal	50-54 ans		55,9	66,7	52,1	60		76
	55-59 ans	55,9	50,8	61,4	47,4	61,5	56,5	61,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011 Département : 39 - Jura Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistag	e initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	50,9	47,9	54,7	47,7	31,6	48,1	62,5
	65-69 ans	48,4	38,5	59,6	40,7	44	36,8	71,9
	70-74 ans	44,4	37	52,8	30	44,4	41,2	55,6
	50-74 ans	51,7	45,6	58,6	44,9	50,4	46,3	63,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	8,5	3,3	8,3	2,9	9,1	4
	55-59 ans	9,3	9,8	8,8	5,3	7,7	17,4	9,7
	60-64 ans	8,8	8,3	9,3	4,5	15,8	11,5	7,1
	65-69 ans	5,7	7,7	3,5	14,8	8	2,6	0
	70-74 ans	5,2	4,9	5,6	0	16,7	7,8	1,9
	50-74 ans	7	7,7	6,2	6,4	8,9	9,1	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,7	0	3,3	0	5,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,8
	65-69 ans	0,8	1,5	0	0	0	2,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,3	0,9	0	1,6	0,6	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,6	6,8	8,3	8,3	11,4	0	4
	55-59 ans	9,3	13,1	5,3	13,2	3,8	13	6,5
	60-64 ans	11,7	10,4	13,3	6,8	26,3	13,5	8,9
	65-69 ans	14,8	15,4	14	11,1	12	18,4	15,6
	70-74 ans	15,7	14,8	16,7	20	22,2	11,8	14,8
	50-74 ans	12	12,2	11,8	11,2	13,8	13,1	10,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	18,6	10	20,8	8,6	9,1	12
	55-59 ans	13,6	14,8	12,3	15,8	11,5	13	12,9
	60-64 ans	18,7	22,9	13,3	29,5	15,8	17,3	12,5
	65-69 ans	16,4	21,5	10,5	14,8	16	26,3	6,3
	70-74 ans	21,6	29,6	12,5	33,3	16,7	27,5	11,1
	50-74 ans	17,3	22,1	11,8	23	13	21,1	11,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté un cancer	50-54 ans	, -	3,4	1,7	4,2	0	0	4
	55-59 ans	5,1	4,9	5,3	7,9	3,8	0	6,5
	60-64 ans		4,2	5,3	2,3	10,5	5,8	3,6
	65-69 ans		6,2	5,3	11,1	12	2,6	0
	70-74 ans	5,9	3,7	8,3	3,3	0	3,9	11,1

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011			Total		Dépistaç	ge initial	Dépistages s	ubséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	4,8	4,4	5,3	5,3	4,9	3,4	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,9 0 2 6 2,9 4 0 0 0 1,9 4 2,6 3,9 1,1 2,3 3,6 1,5 3,3 16,9 3,4 9,9 2,6 1,5 3,2 2,6 3,5 5,4 3,8 7,4 3,6 11,8	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,7	0	0	0	9.1	0
disponistes	55-59 ans		3,3	1,8	5,3	3,8		0
	60-64 ans		1	2,7	2,3			3,6
	65-69 ans		4,6	1,8	0	-		0,0
	70-74 ans		2,5	0	3,3			0
	50-74 ans	1,9	2,5	1,2	2,1	1,6		1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	30-7 4 alis	1,3	2,3	1,2	۷,۱	1,0	2,3	
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	3,4	6,7	4,2	11,4	0	0
dont to resultat est incomina	55-59 ans		1,6	0,7	2,6		-	0
	60-64 ans		3.1	0	4,5	-	•	0
	65-69 ans	4,9	4,6	5,3	7,4	-		6,3
	70-74 ans		4,9	4,2	6.7			5,6
	50-74 ans	3,4	3,6	3,1	4,8	4,1		2,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans		6,2	3,9	8,1	3,6		4,4
Tradix a adenomes detectes pour 1000 personnes depistees	55-59 ans		7	3,4	8,5			3,7
	60-64 ans		11,1	5,7	13,4	6,7		5,3
	65-69 ans	8,5	11,5	5,9	9,5	8,4		4,5
	70-74 ans	13,6	19,2	9,1	23,1	8,3		9,5
	50-74 ans	7,8	10,6	5,4	11,3	5,4		5,5
	50-74 ans **	7,5	10	5,2	11,5	0,4	3,3	3,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans		4,6	2,1	5,8	1,6	1.5	3,3
212 Taax a adonomos avanoss astocios pour 1000 porosimos aspisicos	55-59 ans	3	3,7	2,4	4,6	2,2		2,5
	60-64 ans	5	7,6	2,9	10,9	2,5		3,1
	65-69 ans	-	6,7	2,5	5,4	4,8		1,3
	70-74 ans		12,8	3,9	14,4	3,6		4,1
	50-74 ans	4,6	6,8	2,7	7,6	2,6		2,8
	50-74 ans **	4,5	6,4	2,7	7,0	2,0	0,1	2,0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	1,2	0	0	1,1
Trans do outrooto dototto pour 1000 persoriries depistees	50-5 - ans	0,0	0,0	0,4	1,2	U	U	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011 Département : 39 - Jura Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,1	1,2	1	2,3	0,7	0	1,2
	60-64 ans	1,3	1,4	1,1	0,8	1,7	1,8	0,9
	65-69 ans	1,6	1,9	1,3	4,1	3,6	0,7	0
	70-74 ans	2,1	1,6	2,6	1,4	0	1,7	4,1
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,8	1	1	1,4
	50-74 ans **	1,2	1,3	1,2				
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	25	0	50	0	100	0	0
	60-64 ans	37,5	50	25	100	0	33,3	50
	65-69 ans	14,3	25	0	33,3	0	0	0
	70-74 ans	44,4	66,7	33,3	100	0	50	33,3
	50-74 ans	35,5	46,7	25	55,6	16,7	33,3	30