

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 20845 | 9572 | 11273 | 9015 | 10321 | 557 | 952 |
| | 55-59 ans | 17522 | 7880 | 9642 | 6429 | 7389 | 1451 | 2253 |
| | 60-64 ans | 16292 | 7560 | 8732 | 5334 | 6028 | 2226 | 2704 |
| | 65-69 ans | 9731 | 4381 | 5350 | 2571 | 3407 | 1810 | 1943 |
| | 70-74 ans | 7995 | 3485 | 4510 | 1874 | 2837 | 1611 | 1673 |
| | 50-74 ans | 72385 | 32878 | 39507 | 25223 | 29982 | 7655 | 9525 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 1540 | 709 | 831 | 675 | 767 | 34 | 64 |
| | 55-59 ans | 1516 | 674 | 842 | 565 | 652 | 109 | 190 |
| | 60-64 ans | 1338 | 617 | 721 | 480 | 527 | 137 | 194 |
| | 65-69 ans | 906 | 390 | 516 | 263 | 368 | 127 | 148 |
| | 70-74 ans | 804 | 339 | 465 | 215 | 328 | 124 | 137 |
| | 50-74 ans | 6104 | 2729 | 3375 | 2198 | 2642 | 531 | 733 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 780 | 367 | 413 | 348 | 372 | 19 | 41 |
| | 55-59 ans | 794 | 352 | 442 | 286 | 308 | 66 | 134 |
| | 60-64 ans | 756 | 357 | 399 | 253 | 259 | 104 | 140 |
| | 65-69 ans | 496 | 230 | 266 | 145 | 167 | 85 | 99 |
| | 70-74 ans | 481 | 209 | 272 | 116 | 168 | 93 | 104 |
| | 50-74 ans | 3307 | 1515 | 1792 | 1148 | 1274 | 367 | 518 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 760 | 342 | 418 | 327 | 395 | 15 | 23 |
| | 55-59 ans | 722 | 322 | 400 | 279 | 344 | 43 | 56 |
| | 60-64 ans | 582 | 260 | 322 | 227 | 268 | 33 | 54 |
| | 65-69 ans | 410 | 160 | 250 | 118 | 201 | 42 | 49 |
| | 70-74 ans | 323 | 130 | 193 | 99 | 160 | 31 | 33 |
| | 50-74 ans | 2797 | 1214 | 1583 | 1050 | 1368 | 164 | 215 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 20085 | 9230 | 10855 | 8688 | 9926 | 542 | 929 |
| | 55-59 ans | 16800 | 7558 | 9242 | 6150 | 7045 | 1408 | 2197 |
| | 60-64 ans | 15710 | 7300 | 8410 | 5107 | 5760 | 2193 | 2650 |
| | 65-69 ans | 9321 | 4221 | 5100 | 2453 | 3206 | 1768 | 1894 |
| | 70-74 ans | 7672 | 3355 | 4317 | 1775 | 2677 | 1580 | 1640 |
| | 50-74 ans | 69588 | 31664 | 37924 | 24173 | 28614 | 7491 | 9310 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 593 | 322 | 271 | 305 | 247 | 17 | 24 |
| | 55-59 ans | 556 | 302 | 254 | 245 | 198 | 57 | 56 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 545 | 308 | 237 | 223 | 164 | 85 | 73 |
| | 65-69 ans | 335 | 183 | 152 | 118 | 103 | 65 | 49 |
| | 70-74 ans | 320 | 166 | 154 | 100 | 87 | 66 | 67 |
| | 50-74 ans | 2349 | 1281 | 1068 | 991 | 799 | 290 | 269 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 587 | 319 | 268 | 302 | 244 | 17 | 24 |
| | 55-59 ans | 547 | 296 | 251 | 239 | 196 | 57 | 55 |
| | 60-64 ans | 541 | 307 | 234 | 222 | 161 | 85 | 73 |
| | 65-69 ans | 327 | 179 | 148 | 115 | 101 | 64 | 47 |
| | 70-74 ans | 307 | 161 | 146 | 95 | 83 | 66 | 63 |
| | 50-74 ans | 2309 | 1262 | 1047 | 973 | 785 | 289 | 262 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 529 | 288 | 241 | 272 | 217 | 16 | 24 |
| | 55-59 ans | 484 | 262 | 222 | 210 | 171 | 52 | 51 |
| | 60-64 ans | 486 | 274 | 212 | 192 | 148 | 82 | 64 |
| | 65-69 ans | 299 | 166 | 133 | 105 | 89 | 61 | 44 |
| | 70-74 ans | 284 | 148 | 136 | 86 | 76 | 62 | 60 |
| | 50-74 ans | 2082 | 1138 | 944 | 865 | 701 | 273 | 243 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 448 | 246 | 202 | 233 | 185 | 13 | 17 |
| | 55-59 ans | 396 | 213 | 183 | 169 | 138 | 44 | 45 |
| | 60-64 ans | 400 | 220 | 180 | 152 | 121 | 68 | 59 |
| | 65-69 ans | 238 | 130 | 108 | 81 | 71 | 49 | 37 |
| | 70-74 ans | 229 | 117 | 112 | 66 | 61 | 51 | 51 |
| | 50-74 ans | 1711 | 926 | 785 | 701 | 576 | 225 | 209 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 524 | 286 | 238 | 270 | 214 | 16 | 24 |
| | 55-59 ans | 474 | 258 | 216 | 207 | 166 | 51 | 50 |
| | 60-64 ans | 483 | 273 | 210 | 191 | 146 | 82 | 64 |
| | 65-69 ans | 291 | 162 | 129 | 102 | 87 | 60 | 42 |
| | 70-74 ans | 279 | 145 | 134 | 85 | 75 | 60 | 59 |
| | 50-74 ans | 2051 | 1124 | 927 | 855 | 688 | 269 | 239 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 31 | 14 | 17 | 10 | 13 | 4 | 4 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 16 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 510 | 279 | 231 | 263 | 209 | 16 | 22 |
| | 55-59 ans | 459 | 248 | 211 | 199 | 160 | 49 | 51 |
| | 60-64 ans | 469 | 265 | 204 | 185 | 141 | 80 | 63 |
| | 65-69 ans | 289 | 160 | 129 | 100 | 85 | 60 | 44 |
| | 70-74 ans | 272 | 141 | 131 | 81 | 72 | 60 | 59 |
| | 50-74 ans | 1999 | 1093 | 906 | 828 | 667 | 265 | 239 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 530 | 289 | 241 | 272 | 217 | 17 | 24 |
| | 55-59 ans | 487 | 263 | 224 | 211 | 173 | 52 | 51 |
| | 60-64 ans | 488 | 276 | 212 | 193 | 148 | 83 | 64 |
| | 65-69 ans | 302 | 168 | 134 | 106 | 90 | 62 | 44 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 291 | 152 | 139 | 88 | 79 | 64 | 60 |
| | 50-74 ans | 2098 | 1148 | 950 | 870 | 707 | 278 | 243 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 280 | 135 | 145 | 127 | 133 | 8 | 12 |
| | 55-59 ans | 232 | 110 | 122 | 88 | 94 | 22 | 28 |
| | 60-64 ans | 198 | 85 | 113 | 59 | 81 | 26 | 32 |
| | 65-69 ans | 143 | 60 | 83 | 41 | 52 | 19 | 31 |
| | 70-74 ans | 127 | 54 | 73 | 27 | 39 | 27 | 34 |
| | 50-74 ans | 980 | 444 | 536 | 342 | 399 | 102 | 137 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 37 | 23 | 14 | 22 | 12 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 34 | 20 | 14 | 16 | 11 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 26 | 11 | 15 | 8 | 10 | 3 | 5 |
| | 65-69 ans | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 119 | 66 | 53 | 50 | 38 | 16 | 15 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 73 | 47 | 26 | 40 | 24 | 7 | 2 |
| | 55-59 ans | 64 | 38 | 26 | 30 | 20 | 8 | 6 |
| | 60-64 ans | 81 | 47 | 34 | 31 | 23 | 16 | 11 |
| | 65-69 ans | 46 | 30 | 16 | 16 | 12 | 14 | 4 |
| | 70-74 ans | 47 | 31 | 16 | 16 | 8 | 15 | 8 |
| | 50-74 ans | 311 | 193 | 118 | 133 | 87 | 60 | 31 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 54 | 33 | 21 | 32 | 16 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 66 | 47 | 19 | 40 | 13 | 7 | 6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 91 | 67 | 24 | 46 | 16 | 21 | 8 |
| | 65-69 ans | 56 | 40 | 16 | 28 | 11 | 12 | 5 |
| | 70-74 ans | 53 | 31 | 22 | 22 | 12 | 9 | 10 |
| | 50-74 ans | 320 | 218 | 102 | 168 | 68 | 50 | 34 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 27 | 15 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 39 | 32 | 7 | 24 | 5 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 22 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 |
| | 70-74 ans | 23 | 16 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| | 50-74 ans | 127 | 89 | 38 | 66 | 31 | 23 | 7 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 50 | 37 | 13 | 29 | 10 | 8 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 20 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 27 | 15 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 21 | 14 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 89 | 50 | 39 | 43 | 33 | 7 | 6 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 128 | 81 | 47 | 73 | 40 | 8 | 7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 130 | 85 | 45 | 70 | 33 | 15 | 12 |
| | 60-64 ans | 174 | 114 | 60 | 77 | 40 | 37 | 20 |
| | 65-69 ans | 102 | 70 | 32 | 44 | 23 | 26 | 9 |
| | 70-74 ans | 100 | 62 | 38 | 38 | 20 | 24 | 18 |
| | 50-74 ans | 634 | 412 | 222 | 302 | 156 | 110 | 66 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 54 | 33 | 21 | 32 | 16 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 66 | 47 | 19 | 40 | 13 | 7 | 6 |
| | 60-64 ans | 91 | 67 | 24 | 46 | 16 | 21 | 8 |
| | 65-69 ans | 56 | 40 | 16 | 28 | 11 | 12 | 5 |
| | 70-74 ans | 53 | 31 | 22 | 22 | 12 | 9 | 10 |
| | 50-74 ans | 320 | 218 | 102 | 168 | 68 | 50 | 34 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 27 | 15 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 39 | 32 | 7 | 24 | 5 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 22 | 17 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 |
| | 70-74 ans | 23 | 16 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| | 50-74 ans | 127 | 89 | 38 | 66 | 31 | 23 | 7 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 26 | 14 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 35 | 29 | 6 | 21 | 4 | 8 | 2 |
| | 65-69 ans | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | 70-74 ans | 21 | 14 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 116 | 80 | 36 | 58 | 29 | 22 | 7 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 21 | 16 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 0 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 26 | 22 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| | 70-74 ans | 20 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| | 50-74 ans | 94 | 63 | 31 | 47 | 25 | 16 | 6 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 18 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 14 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 15 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| | 70-74 ans | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 75 | 49 | 26 | 36 | 20 | 13 | 6 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 19 | 14 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 33 | 20 | 13 | 13 | 8 | 7 | 5 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 18 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Effectifs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|----------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 23 | 13 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 29 | 24 | 5 | 17 | 3 | 7 | 2 |
| | 65-69 ans | 17 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| | 70-74 ans | 20 | 13 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| | 50-74 ans | 102 | 69 | 33 | 51 | 27 | 18 | 6 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 49 | 29 | 20 | 29 | 20 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 52 | 28 | 24 | 25 | 20 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 35 | 22 | 13 | 20 | 10 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 17 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 162 | 91 | 71 | 84 | 62 | 7 | 9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 6,1 | 6,7 |
| | 55-59 ans | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 7,5 | 8,4 |
| | 60-64 ans | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 9 | 8,7 | 6,2 | 7,2 |
| | 65-69 ans | 9,3 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 7 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 10,1 | 9,7 | 10,3 | 11,5 | 11,6 | 7,7 | 8,2 |
| | 50-74 ans | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 6,9 | 7,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 2,7 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 3 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 1,5 | 2 |
| | 65-69 ans | 4,2 | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 5,9 | 2,3 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 4 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 5,6 | 1,9 | 2 |
| | 50-74 ans | 3,9 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,6 | 2,1 | 2,3 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 50,6 | 51,8 | 49,7 | 51,6 | 48,5 | 55,9 | 64,1 |
| | 55-59 ans | 52,4 | 52,2 | 52,5 | 50,6 | 47,2 | 60,6 | 70,5 |
| | 60-64 ans | 56,5 | 57,9 | 55,3 | 52,7 | 49,1 | 75,9 | 72,2 |
| | 65-69 ans | 54,7 | 59 | 51,6 | 55,1 | 45,4 | 66,9 | 66,9 |
| | 70-74 ans | 59,8 | 61,7 | 58,5 | 54 | 51,2 | 75 | 75,9 |
| | 50-74 ans | 54,2 | 55,5 | 53,1 | 52,2 | 48,2 | 69,1 | 70,7 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 4 | 2,7 | 4 | 2,8 | 4 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 4,2 | 2,8 | 4,4 | 2,8 | 3,9 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 4,3 | 3 | 4,8 | 3,2 | 3,7 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 4,2 | 4,9 | 3,6 | 5,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 4 | 2,8 | 4,1 | 2,8 | 3,9 | 2,9 |
| 50-74 ans ** | 3,5 | 4,1 | 2,9 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99 | 99,1 | 98,9 | 99 | 98,8 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 98,4 | 98 | 98,8 | 97,6 | 99 | 100 | 98,2 |
| | 60-64 ans | 99,3 | 99,7 | 98,7 | 99,6 | 98,2 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 97,6 | 97,8 | 97,4 | 97,5 | 98,1 | 98,5 | 95,9 |
| | 70-74 ans | 95,9 | 97 | 94,8 | 95 | 95,4 | 100 | 94 |
| | 50-74 ans | 98,3 | 98,5 | 98 | 98,2 | 98,2 | 99,7 | 97,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90,1 | 90,3 | 89,9 | 90,1 | 88,9 | 94,1 | 100 |
| | 55-59 ans | 88,5 | 88,5 | 88,4 | 87,9 | 87,2 | 91,2 | 92,7 |
| | 60-64 ans | 89,8 | 89,3 | 90,6 | 86,5 | 91,9 | 96,5 | 87,7 |
| | 65-69 ans | 91,4 | 92,7 | 89,9 | 91,3 | 88,1 | 95,3 | 93,6 |
| | 70-74 ans | 92,5 | 91,9 | 93,2 | 90,5 | 91,6 | 93,9 | 95,2 |
| | 50-74 ans | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 88,9 | 89,3 | 94,5 | 92,7 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 84,7 | 85,4 | 83,8 | 85,7 | 85,3 | 81,3 | 70,8 |
| | 55-59 ans | 81,8 | 81,3 | 82,4 | 80,5 | 80,7 | 84,6 | 88,2 |
| | 60-64 ans | 82,3 | 80,3 | 84,9 | 79,2 | 81,8 | 82,9 | 92,2 |
| | 65-69 ans | 79,6 | 78,3 | 81,2 | 77,1 | 79,8 | 80,3 | 84,1 |
| | 70-74 ans | 80,6 | 79,1 | 82,4 | 76,7 | 80,3 | 82,3 | 85 |
| | 50-74 ans | 82,2 | 81,4 | 83,2 | 81 | 82,2 | 82,4 | 86 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 79 | 81 | 77 | 84 | 80 | 40 | 51 |
| | 55-59 ans | 73 | 75 | 70 | 76 | 72 | 69 | 63 |
| | 60-64 ans | 74 | 79 | 67 | 79 | 67 | 80 | 69 |
| | 65-69 ans | 74 | 79 | 68 | 88 | 70 | 64 | 64 |
| | 70-74 ans | 75 | 83 | 67 | 90 | 74 | 72 | 59 |
| | 50-74 ans | 75 | 79 | 71 | 82 | 73 | 70 | 63 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 8,3 | 9 | 7,4 | 9,5 | 8,1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 10,1 | 5,3 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 6,4 | 7,1 | 5,5 | 9 | 6,1 | 2,4 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 7,8 | 1,5 | 2 |
| | 70-74 ans | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 3 | 4,6 | 1,5 | 1,5 |
| | 50-74 ans | 6,9 | 7,1 | 6,6 | 8,5 | 7,8 | 2,4 | 3,3 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 96,4 | 96,9 | 95,9 | 96,7 | 96,3 | 100 | 91,7 |
| | 55-59 ans | 94,8 | 94,7 | 95 | 94,8 | 93,6 | 94,2 | 100 |
| | 60-64 ans | 96,5 | 96,7 | 96,2 | 96,4 | 95,3 | 97,6 | 98,4 |
| | 65-69 ans | 96,7 | 96,4 | 97 | 95,2 | 95,5 | 98,4 | 100 |
| | 70-74 ans | 95,8 | 95,3 | 96,3 | 94,2 | 94,7 | 96,8 | 98,3 |
| | 50-74 ans | 96 | 96 | 96 | 95,7 | 95,1 | 97,1 | 98,4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 52,8 | 46,7 | 60,2 | 46,7 | 61,3 | 47,1 | 50 |
| | 55-59 ans | 47,6 | 41,8 | 54,5 | 41,7 | 54,3 | 42,3 | 54,9 |
| | 60-64 ans | 40,6 | 30,8 | 53,3 | 30,6 | 54,7 | 31,3 | 50 |
| | 65-69 ans | 47,4 | 35,7 | 61,9 | 38,7 | 57,8 | 30,6 | 70,5 |
| | 70-74 ans | 43,6 | 35,5 | 52,5 | 30,7 | 49,4 | 42,2 | 56,7 |
| | 50-74 ans | 46,7 | 38,7 | 56,4 | 39,3 | 56,4 | 36,7 | 56,4 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7 | 8 | 5,8 | 8,1 | 5,5 | 5,9 | 8,3 |
| | 55-59 ans | 7 | 7,6 | 6,3 | 7,6 | 6,4 | 7,7 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 4 | 7,1 | 4,1 | 6,8 | 3,6 | 7,8 |
| | 65-69 ans | 4 | 5,4 | 2,2 | 3,8 | 2,2 | 8,1 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 2 | 5 | 0 | 3,8 | 4,7 | 6,7 |
| | 50-74 ans | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 13,8 | 16,3 | 10,8 | 14,7 | 11,1 | 41,2 | 8,3 |
| | 55-59 ans | 13,1 | 14,4 | 11,6 | 14,2 | 11,6 | 15,4 | 11,8 |
| | 60-64 ans | 16,6 | 17 | 16 | 16,1 | 15,5 | 19,3 | 17,2 |
| | 65-69 ans | 15,2 | 17,9 | 11,9 | 15,1 | 13,3 | 22,6 | 9,1 |
| | 70-74 ans | 16,2 | 20,4 | 11,5 | 18,2 | 10,1 | 23,4 | 13,3 |
| | 50-74 ans | 14,8 | 16,8 | 12,4 | 15,3 | 12,3 | 21,6 | 12,8 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 10,2 | 11,4 | 8,7 | 11,8 | 7,4 | 5,9 | 20,8 |
| | 55-59 ans | 13,6 | 17,9 | 8,5 | 19 | 7,5 | 13,5 | 11,8 |
| | 60-64 ans | 18,6 | 24,3 | 11,3 | 23,8 | 10,8 | 25,3 | 12,5 |
| | 65-69 ans | 18,5 | 23,8 | 11,9 | 26,4 | 12,2 | 19,4 | 11,4 |
| | 70-74 ans | 18,2 | 20,4 | 15,8 | 25 | 15,2 | 14,1 | 16,7 |
| | 50-74 ans | 15,3 | 19 | 10,7 | 19,3 | 9,6 | 18 | 14 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 7,8 |
| | 60-64 ans | 8 | 11,6 | 3,3 | 12,4 | 3,4 | 9,6 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 7,3 | 10,1 | 3,7 | 11,3 | 5,6 | 8,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 7,9 | 10,5 | 5 | 10,2 | 7,6 | 10,9 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 6,1 | 7,8 | 4 | 7,6 | 4,4 | 8,3 | 2,9 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0,6 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0,7 | 1,4 | 0 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,3 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 3 | 0,9 | 2,8 | 0,6 | 3,8 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,9 | 3,6 | 1,9 | 3,1 | 1,4 | 4,8 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 5,3 | 0,7 | 8 | 1,3 | 1,6 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 3,2 | 1,4 | 3,3 | 1,4 | 2,9 | 1,2 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4 | 3,2 | 0 | 8,3 |
| | 55-59 ans | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 6,9 | 5,8 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,3 | 5,1 | 3,3 | 5,7 | 4,1 | 3,6 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 2,4 | 3 | 2,8 | 3,3 | 1,6 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 3,9 | 5 | 6,8 | 6,3 | 0 | 3,3 |
| | 50-74 ans | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 2,5 | 2,5 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 6,4 | 8,8 | 4,3 | 8,4 | 4 | 14,8 | 7,5 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 11,2 | 4,9 | 11,4 | 4,7 | 10,7 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 15,6 | 7,1 | 15,1 | 6,9 | 16,9 | 7,5 |
| | 65-69 ans | 10,9 | 16,6 | 6,3 | 17,9 | 7,2 | 14,7 | 4,8 |
| | 70-74 ans | 13 | 18,5 | 8,8 | 21,4 | 7,5 | 15,2 | 11 |
| | 50-74 ans | 9,1 | 13 | 5,9 | 12,5 | 5,5 | 14,7 | 7,1 |
| | 50-74 ans ** | 9,5 | 13,3 | 6 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,7 | 3,6 | 1,9 | 3,7 | 1,6 | 1,8 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 6,2 | 2,1 | 6,5 | 1,8 | 5 | 2,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 95 - Val d'Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

| Indicateurs sur la période 2010-2011 | | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 60-64 ans | 5,8 | 9,2 | 2,9 | 9 | 2,8 | 9,6 | 3 |
| | | 65-69 ans | 6 | 9,5 | 3,1 | 11,4 | 3,4 | 6,8 | 2,6 |
| | | 70-74 ans | 6,9 | 9,2 | 5,1 | 12,4 | 4,5 | 5,7 | 6,1 |
| | | 50-74 ans | 4,6 | 6,9 | 2,7 | 6,9 | 2,4 | 6,7 | 3,7 |
| | | 50-74 ans ** | 4,9 | 7,1 | 2,8 | . | . | . | . |
| D13- | Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1 | 0,6 | 1 | 0,7 | 0 | 0 |
| | | 55-59 ans | 1,6 | 2 | 1,3 | 2 | 1,1 | 2,1 | 1,8 |
| | | 60-64 ans | 2,5 | 4,4 | 0,8 | 4,7 | 0,9 | 3,6 | 0,8 |
| | | 65-69 ans | 2,4 | 4 | 1 | 4,9 | 1,6 | 2,8 | 0 |
| | | 70-74 ans | 3 | 4,8 | 1,6 | 5,1 | 2,2 | 4,4 | 0,6 |
| | | 50-74 ans | 1,8 | 2,8 | 1 | 2,7 | 1,1 | 3,1 | 0,8 |
| | | 50-74 ans ** | 1,9 | 2,9 | 1 | . | . | . | . |
| E01- | Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 28,6 | 37,5 | 16,7 | 37,5 | 16,7 | 0 | 0 |
| | | 55-59 ans | 19,2 | 21,4 | 16,7 | 0 | 12,5 | 100 | 25 |
| | | 60-64 ans | 25,7 | 24,1 | 33,3 | 23,8 | 50 | 25 | 0 |
| | | 65-69 ans | 10 | 13,3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70-74 ans | 4,8 | 7,1 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50-74 ans | 18,1 | 20 | 13,9 | 19 | 13,8 | 22,7 | 14,3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des