

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

		Effectifs sur la période 2009-2010		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6548	3033	3515	1721	1843	1312	1672	
	55-59 ans	6750	3055	3695	395	388	2660	3307	
	60-64 ans	6684	3040	3644	356	364	2684	3280	
	65-69 ans	4497	2011	2486	181	175	1830	2311	
	70-74 ans	5184	2293	2891	148	156	2145	2735	
	50-74 ans	29663	13432	16231	2801	2926	10631	13305	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	269	131	138	79	83	52	55	
	55-59 ans	274	127	147	25	20	102	127	
	60-64 ans	252	113	139	20	17	93	122	
	65-69 ans	191	85	106	6	7	79	99	
	70-74 ans	268	116	152	12	12	104	140	
	50-74 ans	1254	572	682	142	139	430	543	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	163	85	78	47	45	38	33	
	55-59 ans	178	78	100	11	10	67	90	
	60-64 ans	165	84	81	14	8	70	73	
	65-69 ans	127	53	74	0	5	53	69	
	70-74 ans	180	88	92	8	7	80	85	
	50-74 ans	813	388	425	80	75	308	350	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	106	46	60	32	38	14	22	
	55-59 ans	96	49	47	14	10	35	37	
	60-64 ans	87	29	58	6	9	23	49	
	65-69 ans	64	32	32	6	2	26	30	
	70-74 ans	88	28	60	4	5	24	55	
	50-74 ans	441	184	257	62	64	122	193	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6442	2987	3455	1689	1805	1298	1650	
	55-59 ans	6654	3006	3648	381	378	2625	3270	
	60-64 ans	6597	3011	3586	350	355	2661	3231	
	65-69 ans	4433	1979	2454	175	173	1804	2281	
	70-74 ans	5096	2265	2831	144	151	2121	2680	
	50-74 ans	29222	13248	15974	2739	2862	10509	13112	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	168	91	77	55	39	36	38	
	55-59 ans	175	95	80	22	12	73	68	
	60-64 ans	164	81	83	17	8	64	75	
	65-69 ans	117	61	56	8	3	53	53	
	70-74 ans	157	82	75	5	8	77	67	
	50-74 ans	781	410	371	107	70	303	301	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	168	91	77	55	39	36	38	
	55-59 ans	175	95	80	22	12	73	68	
	60-64 ans	164	81	83	17	8	64	75	
	65-69 ans	117	61	56	8	3	53	53	
	70-74 ans	157	82	75	5	8	77	67	
	50-74 ans	781	410	371	107	70	303	301	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	163	86	77	50	39	36	38	
	55-59 ans	170	91	79	21	11	70	68	
	60-64 ans	159	80	79	17	7	63	72	
	65-69 ans	113	59	54	8	3	51	51	
	70-74 ans	149	80	69	5	5	75	64	
	50-74 ans	754	396	358	101	65	295	293	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	160	85	75	49	38	36	37	
	55-59 ans	168	90	78	20	11	70	67	
	60-64 ans	155	77	78	16	7	61	71	
	65-69 ans	110	57	53	8	3	49	50	
	70-74 ans	138	74	64	5	3	69	61	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	731	383	348	98	62	285	286
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	162	86	76	50	39	36	37
	55-59 ans	170	91	79	21	11	70	68
	60-64 ans	158	80	78	17	7	63	71
	65-69 ans	111	57	54	8	3	49	51
	70-74 ans	145	78	67	5	4	73	63
	50-74 ans	746	392	354	101	64	291	290
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	162	86	76	50	39	36	37
	55-59 ans	170	91	79	21	11	70	68
	60-64 ans	159	80	79	17	7	63	72
	65-69 ans	112	58	54	8	3	50	51
	70-74 ans	146	78	68	5	4	73	64
	50-74 ans	749	393	356	101	64	292	292
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	163	86	77	50	39	36	38
	55-59 ans	170	91	79	21	11	70	68
	60-64 ans	159	80	79	17	7	63	72
	65-69 ans	113	59	54	8	3	51	51
	70-74 ans	149	80	69	5	5	75	64
	50-74 ans	754	396	358	101	65	295	293
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	93	38	55	19	27	19	28
	55-59 ans	91	45	46	7	7	38	39
	60-64 ans	75	29	46	9	5	20	41
	65-69 ans	51	22	29	3	2	19	27
	70-74 ans	67	35	32	1	2	34	30
	50-74 ans	377	169	208	39	43	130	165
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	11	4	6	3	5	1
	55-59 ans	19	11	8	2	1	9	7
	60-64 ans	18	10	8	0	0	10	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	69	42	27	8	4	34	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	13	3	7	3	6	0
	55-59 ans	17	9	8	3	0	6	8
	60-64 ans	11	6	5	0	1	6	4
	65-69 ans	15	9	6	0	1	9	5
	70-74 ans	26	13	13	1	1	12	12
	50-74 ans	85	50	35	11	6	39	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	21	9	16	3	5	6
	55-59 ans	33	21	12	8	2	13	10
	60-64 ans	41	26	15	4	1	22	14
	65-69 ans	27	17	10	4	0	13	10
	70-74 ans	30	17	13	0	1	17	12
	50-74 ans	161	102	59	32	7	70	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	15	7	8	2	1	5	7
	50-74 ans	45	23	22	9	4	14	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	46	34	12	23	6	11	6
	55-59 ans	50	30	20	11	2	19	18
	60-64 ans	52	32	20	4	2	28	18
	65-69 ans	42	26	16	4	1	22	15
	70-74 ans	56	30	26	1	2	29	24
	50-74 ans	246	152	94	43	13	109	81
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	30	21	9	16	3	5	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	33	21	12	8	2	13	10
	60-64 ans	41	26	15	4	1	22	14
	65-69 ans	27	17	10	4	0	13	10
	70-74 ans	30	17	13	0	1	17	12
	50-74 ans	161	102	59	32	7	70	52
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	15	7	8	2	1	5	7
	50-74 ans	45	23	22	9	4	14	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	14	7	7	2	1	5	6
	50-74 ans	44	23	21	9	4	14	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	14	7	7	2	1	5	6
	50-74 ans	44	23	21	9	4	14	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	8	6	2	3	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	13	6	7	2	1	4	6
	50-74 ans	38	19	19	8	4	11	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	13	7	6	4	2	3	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	1	2
	50-74 ans	10	4	6	2	2	2	4	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	2	6	2	3	0	3	3
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3	3
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2	2
	70-74 ans	14	7	7	2	1	5	6	6
	50-74 ans	44	23	21	9	4	14	17	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2	2
	70-74 ans	7	2	5	0	2	2	3	3
	50-74 ans	18	10	8	4	2	6	6	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,3	3,9	4,6	4,5	4	3,3	
	55-59 ans	4,1	4,2	4	6,3	5,2	3,8	3,8	
	60-64 ans	3,8	3,7	3,8	5,6	4,7	3,5	3,7	
	65-69 ans	4,2	4,2	4,3	3,3	4	4,3	4,3	
	70-74 ans	5,2	5,1	5,3	8,1	7,7	4,8	5,1	
	50-74 ans	4,2	4,3	4,2	5,1	4,8	4	4,1	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,5	1,7	1,9	2,1	1,1	1,3	
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	3,5	2,6	1,3	1,1	
	60-64 ans	1,3	1	1,6	1,7	2,5	0,9	1,5	
	65-69 ans	1,4	1,6	1,3	3,3	1,1	1,4	1,3	
	70-74 ans	1,7	1,2	2,1	2,7	3,2	1,1	2	
	50-74 ans	1,5	1,4	1,6	2,2	2,2	1,1	1,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,6	64,9	56,5	59,5	54,2	73,1	60	
	55-59 ans	65	61,4	68	44	50	65,7	70,9	
	60-64 ans	65,5	74,3	58,3	70	47,1	75,3	59,8	
	65-69 ans	66,5	62,4	69,8	0	71,4	67,1	69,7	
	70-74 ans	67,2	75,9	60,5	66,7	58,3	76,9	60,7	
	50-74 ans	64,8	67,8	62,3	56,3	54	71,6	64,5	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3	2,2	3,3	2,2	2,8	2,3	
	55-59 ans	2,6	3,2	2,2	5,8	3,2	2,8	2,1	
	60-64 ans	2,5	2,7	2,3	4,9	2,3	2,4	2,3	
	65-69 ans	2,6	3,1	2,3	4,6	1,7	2,9	2,3	
	70-74 ans	3,1	3,6	2,6	3,5	5,3	3,6	2,5	
	50-74 ans	2,7	3,1	2,3	3,9	2,4	2,9	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	97	94,5	100	90,9	100	100	100	
	55-59 ans	97,1	95,8	98,8	95,5	91,7	95,9	100	
	60-64 ans	97	98,8	95,2	100	87,5	98,4	96	
	65-69 ans	96,6	96,7	96,4	100	100	96,2	96,2	
	70-74 ans	94,9	97,6	92	100	62,5	97,4	95,5	
	50-74 ans	96,5	96,6	96,5	94,4	92,9	97,4	97,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	98,8	97,4	98	97,4	100	97,4	
	55-59 ans	98,8	98,9	98,7	95,2	100	100	98,5	
	60-64 ans	97,5	96,3	98,7	94,1	100	96,8	98,6	
	65-69 ans	97,3	96,6	98,1	100	100	96,1	98	
	70-74 ans	92,6	92,5	92,8	100	60	92	95,3	
	50-74 ans	96,9	96,7	97,2	97	95,4	96,6	97,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	1	1	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	1	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64	58	70	61	83	54	58	
	55-59 ans	63	66	60	88	55	59	61	
	60-64 ans	65	69	62	71	61	68	62	
	65-69 ans	62	59	64	60	29	59	66	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	68	74	62	135	74	70	61
	50-74 ans	65	65	64	72	73	63	62
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,8	3,3	0	5,5	0	0	0
	55-59 ans	1,7	3,2	0	4,5	0	2,7	0
	60-64 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,3
	65-69 ans	3,4	3,3	3,6	0	0	3,8	3,8
	70-74 ans	4,5	2,4	6,7	0	25	2,6	4,5
	50-74 ans	2,3	2,4	2,2	3,7	2,9	2	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	97,4
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,3	100	100	100	98	100
	70-74 ans	98	97,5	98,6	100	80	97,3	100
	50-74 ans	99,3	99,2	99,4	100	98,5	99	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,1	44,2	71,4	38	69,2	52,8	73,7
	55-59 ans	53,5	49,5	58,2	33,3	63,6	54,3	57,4
	60-64 ans	47,2	36,3	58,2	52,9	71,4	31,7	56,9
	65-69 ans	45,1	37,3	53,7	37,5	66,7	37,3	52,9
	70-74 ans	45	43,8	46,4	20	40	45,3	46,9
	50-74 ans	50	42,7	58,1	38,6	66,2	44,1	56,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	12,8	5,2	12	7,7	13,9	2,6
	55-59 ans	11,2	12,1	10,1	9,5	9,1	12,9	10,3
	60-64 ans	11,3	12,5	10,1	0	0	15,9	11,1
	65-69 ans	10,6	11,9	9,3	0	0	13,7	9,8
	70-74 ans	3,4	3,8	2,9	0	0	4	3,1
	50-74 ans	9,2	10,6	7,5	7,9	6,2	11,5	7,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,2	1,1	1,3	0	9,1	1,4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	1,3	1,4	0	0	1,3	1,6
	50-74 ans	0,5	0,5	0,6	0	1,5	0,7	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,8	15,1	3,9	14	7,7	16,7	0
	55-59 ans	10	9,9	10,1	14,3	0	8,6	11,8
	60-64 ans	6,9	7,5	6,3	0	14,3	9,5	5,6
	65-69 ans	13,3	15,3	11,1	0	33,3	17,6	9,8
	70-74 ans	17,4	16,3	18,8	20	20	16	18,8
	50-74 ans	11,3	12,6	9,8	10,9	9,2	13,2	9,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,4	24,4	11,7	32	7,7	13,9	15,8
	55-59 ans	19,4	23,1	15,2	38,1	18,2	18,6	14,7
	60-64 ans	25,8	32,5	19	23,5	14,3	34,9	19,4
	65-69 ans	23,9	28,8	18,5	50	0	25,5	19,6
	70-74 ans	20,1	21,3	18,8	0	20	22,7	18,8
	50-74 ans	21,4	25,8	16,5	31,7	10,8	23,7	17,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	2,3	7,8	4	7,7	0	7,9
	55-59 ans	3,5	3,3	3,8	4,8	0	2,9	4,4
	60-64 ans	6,3	8,8	3,8	17,6	0	6,3	4,2
	65-69 ans	5,3	6,8	3,7	12,5	0	5,9	3,9
	70-74 ans	10,1	8,8	11,6	40	20	6,7	10,9
	50-74 ans	6	5,8	6,1	8,9	6,2	4,7	6,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,2	0	0	0	2,8	0
	55-59 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,5
	60-64 ans	1,3	2,5	0	5,9	0	1,6	0
	65-69 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2
	70-74 ans	2,7	5	0	20	0	4	0
	50-74 ans	1,2	1,8	0,6	2	0	1,7	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	1,3	0	2,5	0	0	0	2,8
	65-69 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,8	0	0	0,3	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	11,4	3,5	13,6	3,3	8,5	3,6
	55-59 ans	7,5	10	5,5	28,9	5,3	7,2	5,5
	60-64 ans	7,9	10,6	5,6	11,4	5,6	10,5	5,6
	65-69 ans	9,5	13,1	6,5	22,9	5,8	12,2	6,6
	70-74 ans	11	13,2	9,2	6,9	13,2	13,7	9
	50-74 ans	8,4	11,5	5,9	15,7	4,5	10,4	6,2
	50-74 ans **	8,4	11,4	5,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7	2,6	9,5	1,7	3,9	3,6
	55-59 ans	5	7	3,3	21	5,3	5	3,1
	60-64 ans	6,2	8,6	4,2	11,4	2,8	8,3	4,3
	65-69 ans	6,1	8,6	4,1	22,9	0	7,2	4,4
	70-74 ans	5,9	7,5	4,6	0	6,6	8	4,5
	50-74 ans	5,5	7,7	3,7	11,7	2,4	6,7	4
	50-74 ans **	5,6	7,7	3,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	1,7	1,2	1,7	0	1,8
	55-59 ans	0,9	1	0,8	2,6	0	0,8	0,9
	60-64 ans	1,5	2,3	0,8	8,6	0	1,5	0,9
	65-69 ans	1,4	2	0,8	5,7	0	1,7	0,9
	70-74 ans	2,9	3,1	2,8	13,9	6,6	2,4	2,6
	50-74 ans	1,5	1,7	1,4	3,3	1,4	1,3	1,4
	50-74 ans **	1,5	1,6	1,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des